



6

B

17

HERMANNI BOERHAAVE

*Phil. & Med. D. Inst. Collegii Pract. Bot. & Chem. Prof.
in Acad. Lugd. Bat. Praes. Coll. Chir. Soc. Reg.
Scient. Lond. & Acad. Reg. Scient. Paris. Sod.*

PRAELECTIONES
ACADEMICAE

IN PROPRIAS

INSTITVTIONES REI MEDICAE


EDIDIT, ET NOTAS ADDIDIT

ALBERTVS HALLER

*M. & Phil. D. Consiliarius Aulicus & Archiater Regius
Med. Anat. Bot. Chir. P. P. O.
Socc. Regg. Brit. & Suec. Sod.*

Tom. V. Pars II.

MENSTRVA, CONCEPTVS.



GOTTINGAE,

APVD ABRAM VANDENHOECK, ACAD. TYPOGR.


MDCCXLIII.

6

B

19

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School



DE MENSTRUIS.

DCLIX.

Latius) * Ut fetum melius et sustineat,
& defendat : deinde extrorsum cedit
os sacrum, atque auget pelvis capaci-
tatem.

Coc-

a Pelvis muliebris a virili satis insigniter dif-
fert: nam ipsae lumborum vertebrae in-
cipiunt magis retrorsum declinare G A L.
de uter. diff. C. BAUHIN. *Theatr.* p.
170. Deinde pelvis ipsa latior est a dextris
ad sinistras, ob ossa Ilium magis ad latera
reflexa, vel patula C. BAUHIN. *Theatr.*
p. 49. RIOLAN. p. 404. MAURICEAU
ad id. p. 209. ALBIN. *osteol.* n. 339.
MONROO *of the bones* p. 332. *seqq.*
VESALIUS l. c. PALFYN l. c. denique
dimidio fere pollice latiora GREW. *Musc.*
p. 5. Porro latior est ab anterioribus ad
posteriora, ob os sacrum magis rectum,
neque perinde antrorsum flexum BONA-
CIOLVS p. 15. ALBIN. MONROO
C. BAUHIN. PALFYN. *anat. de la femme*
p. 52, 53. lumbosque retrorsum patulos
C. B. etc. & coccygem rectiorem ALB.
l. c. MONROO l. c. VESALIUS L. I. c.
29. C. BAUHIN. qui idem mobilior,
& magis adeo retro versus est MAURI-
CEAU l. c. Sacrum os etiam longius facit
GREW. p. 5. sed hae mensurae ut pro
cons

Coccygis) Ejus mucro vertitur antrosum^b, ut fetum sustineat, atque simul ita articulatur, ut facile retrorsum flecti possit, sic spatium auget.

Remoti) Quando in pelvim masculini sceleti, ab inferioribus inspicio, major angustia

constantibus admitti possint, multa egent repetitione. Porro etiam ideo portio ossea minor est, quia ossa pubis longe majori & obtuso angulo uniuntur, quae princeps nota est sceleti muliebris, CELSO olim dicta L. VIII. c. 1. & VESALIO, C. BAUHINO & aliis: confer CHESLEDENII T. XXXIV. cum T. XXXV. ALB. l. c. MAURICEAU l. c. Eadem ossa breviori synchondrosi coeunt RIOL. p. 404.

Denique et ischii tubera magis distant ALB. l. c. PALFIN l. c. C. BAUHIN. hinc femorum cervices magis transversae cum trunco angulum faciunt rectiorem. Adeoque ibi femina latior est ALB. l. c. MONROO p. 336. BEURLIN *diff. de lux. fem.* n. 8. Quod quidem necesse est, ut latescens in graviditate abdomen firmitus sustineri possit. Aliae diversitates partim minoris momenti sunt minusve certae, ut foramen pubis majus VERHEYEN. p. 322. ossium Ischii tuber planius: MONROO l. c. aliae inferius dicentur, vide not. c. PINAEVS equidem videtur has diversitates fere partui tribuere *de not. virgin.* p. 178. Verum in virginibus etiam repertiuntur.

^b Vide not. a.

gustia manifesta sit perspicienti, qua a feminae pelvi differt. Hujus adeo capacior est apertura, cumque ossa (pubis et coccygis) a se mutuo longius distent, tota pelvis capacior quam viris est, quos eadem cum femina statura esse posueris. Haec adeo evidentia sunt visu, ut notae sint, quibus sceleta utriusque sexus distinguas.

Pubis) Ita augetur apertura pelvis, quae fetum transmittit.

Maxima) Statuam formosissimae feminae c adspice, qualis antiquissima illa Coae vene-

c Hoc duobus modis verum est. Nam I. maxima latitudo thoracis virilis superat maximam latitudinem inter duo ilia, in femina vero eidem cedit. In sceletis CHESELDENIANIS XXXIV. XXXV. rationes sunt hujus modi: Latitudo summa thoracis in femina $26\frac{1}{2}$ latitudo vero ilium $32\frac{1}{2}$. In viro thoracis latitudo $31\frac{1}{2}$ ilium vero $30\frac{1}{2}$. Adeoque comparatis numeris, latitudinis inter ilium ossa ratio, ad latitudinem pectoris, in feminis, est ad eandem in viris rationem :: $\frac{65}{53} \frac{92}{94}$ nempe uti :: 1035. 813. proxime. A sceleto vero rationes, quam a statuis sumere malui, nam tori majores viris pectoris rationem majorem faciunt, adeps clunium femoris rationem in feminis
A 2 auget.

auget. Verum hic unice quaeritur spatium ossibus interceptum DURERVS tamen *de proport.* L. II. p. 29. dat feminae humerorum latitudinem 24, femorum paulo plus: viro humerorum distantiam 31, femorum latitudinem 26. Hunc locum PRAECEPTOR velle videtur. Dudum RHASES ad MANSOREM L. II. c. 56 „ feminis pectus et scapulas angustas, costas minores, et coxas ex nates crassiores esse. In mauris autem feminis LIGONIVS auctor est, femora non latiora humeris esse *of barbados* p. 87.

2. Distantia ossium femorum et ossium illium, quae fere eadem est, maiorem rationem habet ad distantiam scapularum in femina, quam in viro. In integro homine, Vesalii Venus habet femorum distantiam partium $42\frac{1}{2}$, scapularum autem $48\frac{1}{4}$. In Hercule eadem quantitates sunt 48. 57. In sceletō CHESLEDENII in *osteogr. magna* T. XXXIV. XXXV. eadem quantitates in femina sunt $29\frac{1}{2}$. $35\frac{1}{4}$, in viro

$32\frac{1}{2}$ $41\frac{1}{2}$. Nempe in feminis latitudo femorum, ad latitudinem scapularum est uti 114 ad 141. in viris vero uti 65. ad 83: adeoque ratio, qua latitudo scapularum superat latitudinem imae pelvis in viris, ad eandem in feminis rationem est
 \therefore uti $\frac{141}{114}$ ad $\frac{83}{65}$ \therefore 3055.3154. vel uti 1018. 1055.

Vide.

veneris ^d statua est, quae Romae marmorea conservatur, et mensura distantiam inter extremitates infimae pelvis, reperies, tres partes habere, uti duas habet distantia maxima oppositorum terminorum thoracis. Contra in Mercurio, aut Hercule, sive alia pulcherrimi viri statua, reperies tres partes esse latitudinis thoracis, duas pelvis. Haec est feminae a mare diversitas, ut maius nempe spatium paretur pro fetu recipiendo, quod in mare angustius est, et quasi connivet.

Multa) Vesica ^e, quae fere nullum spatium occupat, quando inanis est: Uterus, non major parvo piro: Intestinum denique rectum gracile in mulieribus. Ergo in toto corpore nullus locus est, ubi partes minus premantur, quam in pelvi feminae. Ideo fit, ut in femina omnis in humorum quantitate excessus deorsum determinetur.

1732.

^d Videtur Praceptor Venerem Mediceam velle, quae Romae esse desiit, atque Florentiae inter thesauros gentis Mediceae reperitur. V. K E I S L E R I elegantissima itinera I p 499.

^e In femina pelvis amplitudo tanta est, ut sufficiat utero recipiendo, et vaginae, quorum loco viri non habent, nisi parvas vesiculas prostatamque. Neque incrementum uteri maximum in pelvi est, sed cedit turgenti pinguedo circumposita recto intestino, mobilisque coccyx.

1732. Vesicam quidem in femina majorem ^f esse, verum non ab ipsis primordiis, sed expandi sensim, cum in loco capaci posita sit; Hinc feminas urinam diutius retinere, quam viri.

DCLX.

Planiorem) ^a Ut paretur spatium pro mammis, quas lacte oportet distendi. Deinde, ut augeatur facilitas gestandi fetus. Nam centrum gravitatis corporis mutatur in gravidis, & declinat in anteriora, hinc facillimus esset in anteriora prolapsus, si per-

^f Nova observatio, sed vera, quantum video. Id etiam certum est, feminas urinam melius retinere, nisi gravidæ sint, neque in viris tantas vesicas reperio, quales non raro inter causas partus difficiles sunt, et tunc ad octo libras urinae visæ sunt continuisse, octoque pintas EDINB. SOC. IV. 449. et novem *chopines*, enormem certe molem, la MOTTE *obs.* LX. quia nempe familiari vicio urina ante partum subprimitur, capite fetus in vesicam nistente la MOTTE *des accouchem. obs.* 49. 220. Id etiam verum esse reperio, feminis magis triangulares vesicas esse, cum deorsum late scat a pondere vesica, neque resistentes sub se habeant vesiculas feminæ, duramve prostaticam, sed molissimum rectum intestinum: vide consentientem D PARSONS *of the bladder* p. 32. T. 3. et GARENGEOT *splanchn.* p. 75. qui in gravidis inferne dilatari ait.

^a Vide DCXXII.)

perinde thorax mutaretur ; cum aliunde gravidæ ad minimam offensam antrorsum labantur. Ideo thorax aliquandum retrorsum vergit , ut huic incommodo utcumque subveniat.

DCLXI.

Laxiora) Quando corpus feminae vestibulo tectum præsto est , et iuxta adiacet corpus virile, incidendo certe cutem femoris & comparando in utroque corpore crassitiem pinguedinis cum gracilitate cutis, facile feminam distinxero.

Cellulae) Mulier macilenta toroso viro obelior est. Hinc in viro toros musculorum distinguimus, quos in feminis alta pinguedo ita sepelit, ut tota corporis superficies plana videatur.

Vasa) Arteriosa & venosa majora sunt quam viri ^a: venae enim in feminis facile in
vari-

^a Haec observatio maxime necessaria est, per eam enim sequentia omnia demonstranda sunt. Nempe femina a natura facta est, ut certis vitae temporibus eius uterus enormiter crescere , fetumque satis magnum, tamquam novam corporis accessionem, ex suo sanguine alere possit. Ideo natura feminas toto corpore molliori & extensibili fecit: deinde uteri vasa dilatabilia; tandem ita disposita, ut eo sanguinis abundantia naturaliter vergat. Ergo puer & puella vix differunt, feminae vero a viris ita insigniter, ut de infanti indole diutissime, & in senium usque retineant universalem eam molli-
tiem, quam in ipsis ossibus anatome

varices extenduntur. Inde fit, ut mulier ad minimum superpondium in nutrimento, continuo

distinguit. Ea ipsa enim in femina leviora, rotundiora, planiora, minus cava, minus eminentia sunt. Sed neque otium hanc diversitatem facit, etsi eam augere non negaverim. Nam etiam rusticis exercitatis feminis haec in cute molli- ties, in adipe abundantia, in ossibus teneritas superest. Consentit mobilitas generis nervosi, dispositio ad convulsiones, ad animi motus, caro etiam tactu mollior, observata HIPPOCRATI *περὶ γυναικ. α.* pulsus celerior, debilior. Neque enim sanae manere potuissent, si laxitatem partium abdominalium majorem ipsis natura dedisset, reliquas vero partes aequae robustas reliquisset.

Sed hic subveniunt nobis experimenta CLIFTONI WINTRINGHAM, per quae mathematice constat, in brutis perinde, uti in hominibus, vasa feminarum & debiliora, & ad sanguinem ad pelvem determinandum aptiora tacta fuisse, arteriae ovium feminae ubique laxiores sunt, quam cognomines arteriae arietis *Exp.* 19 p. 130 & capaciores p. 151. Robur enim aortae arietis ad robur aortae in ove est prope cor :: 79. 78. p. 65. super emulgentes :: 1258. 1000. p. 75. & super iliacas :: 1272. 1000. p. 106. & 71. 70. p. 68. arteriae vero iliacae robur ad idem robur in vena socia in ove :: 1295. 1000. p. 110. Deinde ratio crassitie tunicarum in aorta adscendente ad

tinuo plethora laboret, nisi per menstruam sanguinis jacturam se liberaverit.

Replen.

ad sanguinem, est ad eandem in ove-
rationem :: 1033. 1000, p. 146. in de-
scendente vero :: 1108. 1000. p. 146. &
super emulgentes :: 1319. 1229 p. 122.

Haec adeo utraque ratio minuit vim,
qua vasa maiora in femina cordi resi-
stunt, & incrementum facit velocius;
deinde demonstrat plethoram femininam:
nihil enim plethora est, nisi ratio major
sanguinis ad tunicas continentes.

Sed vicissim venae feminis non in ea-
dem ratione debiliores sunt. Aortae
arietis robur, ad aortam feminae prope cor
est $\frac{79}{78}$ venae Cavae ibidem $\frac{91}{90}$ p. 66.

nempe minor. Super emulgentes arte-
riarum ratio est $\frac{1238}{1000}$ venarum $\frac{1166}{1000}$
p. 78. denuo minor. Ad divisionem
iliacarum arteriarum ratio $\frac{1295}{1000}$.

venarum $\frac{155}{154}$ p. 68. insignissime minor.

2. Sicuti autem arteriarum contentum
majus, ita venarum contentum in fe-
minis minus est. Nam proportio ca-
pacitatis venarum cavarum ad arterias
aortas est in ariete, ad eandem in ove
proportionem :: 1041. & 1076. 1000. p.
144. 145. super iliacas, & denuo ::
1091. & 1121. ad 1000. p. 147. His modis
efficitur, ut venae & parvitate sua, &

A 5

robo-

Replentur) Femina etiam satis gracilis per abortum vel lochiorum fluxum, magnam

robore suo sanguinem promoveant, ne nimis lentescat circulatio p. 153.

3. Haec laxitas arteriarum in genere feminino imprimis ad pelvim, & prope originem vasorum uterinorum, insignissima est, ut manifestum sit, ad hanc sedem adeo evidenter minus resistentem sanguinem abundius determinari. Non enim solum truncus aortae descendens in femina amplior est, quod etiam PITCARNIUS habet de *fluxu menstr.* p. 154 155. & FREIND c. IV. le FEVRE *physiol* p. 159. &c. Sed singulatim in feminis aorta versus iliacas, & magis, quam in maribus dilatatur, & minus augetur robore, adeoque uterinae partes magis dilatantur a vi aequae robusti cordis, quam partes pelvis masculae. Id apparet per supra citata. Nam ratio roboris arteriae arietis ad ovis arteriam ad cor est 78. 79. ad iliacas autem .. 1172. 1000. nempe arteriae robur valde augetur descendendo in ariete, in femina parum, ut omnino in maiori ratione, quam in aliis partibus arteriae ovis debiliores sint, ubi vasa uteri prodeunt p. 114. 115.

Deinde ratio capacitatis descendens ad ascendentem in ove, est ad eandem in ariete rationem .. 1082. 1000. p. 146. et ratio capacitatis aortae prope emulgentes, ad capacitatem arteriae in ariete est 1105. in ove 1120. p. 113. atque in universum capacitas aortae sub emulgentibus, in ove multo major est quam in

gnam copiam sanguinis amittere potest, ad unam alteramve libram, neque inde valde debilitabitur: & dimidia certe jactura sanguinis, quam vir aut per vulnus, aut per venam sectam emisit, eius vires ita franget, ut vel animo linguatur, vel extinguatur subito.

DCLXII.

in ariete; si cum aorta superiori comparetur p. 114.

Tanta sanguinis hic major est determinatio ad partes uteri, cum & axiores & ampliores arteriae eo ducant.

Capacitates venarum vicissim minores, roboraque majora sunt. Nam iliacae venae capacitatis ratio ad arteriam est 191. 100. cum ad emulgentes ratio capacitatis venae cavae ad capacitatem aortae sit 4694. 1000. p. 100

Denique arteriarum ex hypogastrio in feminis copia & major est, quam in maribus PITCARNE II. 6 & valde magna portione uteri, quem adeunt FITZGERALD *de catamen.* p. 49.

- b Experimenta demonstrant, quam enormes haemorrhagias tolerant feminae, quibus fetus ante diem eliditur FREIND. C. 3. Vide PUZOS in T. I. P. III. *Acad. Chirurg Paris.* Sex venae sectiones in puerpera absque omni noxa fuerunt la MOTTE *obs.* 157. viginti quinque demum librarum jactura ARCVLANUS apud SCHENKIIUM. Et in universum feminas plus sanguinis, quam mares habere, per experimenta demonstravit vir praestantissimus S. HA-

DCLXII.

Ἀκμὴν) Corpus humanum terminum suum habet, ultra quem nihil in longitudine excrescit, ^a in latitudinem vero parum. Hic terminus in juventute definitur ossibus, quod ad longitudinem attinet, quando ea ita rigida facta sunt, ut a cordis & arteriarum viribus non patiantur se extendi. Verum, post terminum hujus incrementi, in corporibus, quae ad summum staturae decus pervenerunt, abdomen strictum, costae arctae, corpus habilissimum, & natura junarum est, non arte, quam carpebat CHAEREA Terentianus in *Eunucho*. Post hoc tempus aliquantum adhuc crassescimus: aucto enim adipe distenduntur costae a mutuis contactibus, ut extrorsum protuberent: abdomen prominet, quod totum molle est & facile cedit, crassities augetur, absque augmento proceritatis. Ita feminae thoracem ante gestationem arctiorem, post partum autem latiore habent, quia perpetua pressio adscendentis uteri costas extrorsum vertit, & cartilagineas ad exteriora pellit, non rediversas ad priorem arctitatem, nisi continuo a partu fasciis thorax cogatur, uti solet fieri apud aulicas mulieres. Nunc ad istum verum terminum proceritatis feminae fere tertia parte annorum citius quam viri perveniunt ^b, inque eadem

S. HALES *hemastat.* p. 12. & inter omnia animalia feminam sanguinis copia excellere ARISTOTELES *hist. anim.* L. III. c. 19.

a CCCCLXXV.

b Per superiora. Cor enim aequae forte est in

eadem ratione citius ad generationem aptae sunt. Viri enim longitudine increscunt ad annum aetatis vigesimum quintum & ultra: femina vero annos nata sedecim aut octodecim iam attingit eam proceritatem, quam nunquam excedet, nisi in raro aliquo exemplo. His observatis, legislatores apud omnes gentes facultatem testamenti concedendi teneriori mulierum aetati concedunt, viris tardius largiuntur, quod existiment, etiam animas feminarum prius perfectas esse, uti corpora celerius vident perfici. Sed cor solum facit, ut feminae crescant, quod in vasa laxa sanguinem impellit. Nunc in femina sedecim annorum ossa dura sunt, neque concedunt incrementum ulterius, vasa autem ex natura muliebri laxa. Superest, ut ista dilatentur, atque plethora nascatur. Causa autem, quare citius in feminis ossa proceritatem limitent, est in ipsa valorum laxitate, quae non sufficit extendendis ossibus. Ossa feminis non duriora sunt, quam viris, sed maiorem laxioribus vasis opponunt resistantiam.

in puero & puella, neque enim ulla in recens natis diversitas reperitur. Sed puellae arteriae laxiores sunt, facilius adeo extenduntur, quantum possunt extendi, a definita ratione virium cordis; puero vero, cum duriores sint, lentius expandi necesse est, quae cordi magis resistent. Prius autem pubescunt feminae, quia haec arteriarum laxitas ad uterum etiam major est, adeoque nixu maiore vasa collapsa uteri & vaginae citius ita evolvuntur, ut rubrum sanguinem reci-

DCLXIII.

Mollis) Vulgo dicunt, cavum musculum esse, atque lacertos carneos habere, sed ego quidem nescio, ubi eos lacertos viderint

recipiant. Eadem porro laxitas arteriarum facit, ut feminae minus procerae sint, cum arteriarum minor impulsio fibras solidas minus in longum extendere valeat.

a *Situs est, in textu*) Uterus in pelvi ponitur, in altitudine, qualis vesicae est, aut paulo breviori VESALIVS p. 651. & de china p. 121. multo infra marginem pelvis. Directio deorsum & paulum antrorsum inclinatur WINSLOW p. 591. Anterior vesicam habet oppositam, posterius rectum intestinum ARISTOTELIS *hist. anim.* l. 1. c. 18. CASSER. L. VIII. T. 18. Et peritoneum quidem finiens abdomen, postquam superiori vesicae vertici modica latitudine incubit, adscendit iterum VESAL. l. V f. 24. & in medio utero adplicatur, paulo supra ortum vaginae, BIDLOO T. LIII. f. 1. hinc adscendit adhaerens utero, & consensu vertice descendit retro uterum, multo profundius, quam adscenderat, ante intestinum rectum, ad vaginae usque transversam partem, duasve tertias (HENSING in eximia *diff. de periton.* n. 46.) cellulosa vero circumposita reliquae vaginae, tum anteriori eius faciei circumfunditur. Lateraliter autem peritoneum modo in pelvi, uti certe saepe ovaria in pelvi

pelvi reperio, fere in media altitudine, modo ante vasorum iliacorum fere mediam partem a Psoa recedens, etiam altius quam uterus VESAL. p. 658 ovaria continet, uti dicam. Pars vero peritonaei, quae cavitatem anonymam imo utero recto, quae interceptam lateralis terminat, ea ab utero posteriora petens, duabus plicis transversalibus, tamquam ligamentis, ex altitudine ea, qua vesicam deserebat, sineque uteri inferiori, uterum cum recto intestino conjungit BIDLOO T. 50. utcunque, conf. LXXXVI. SANTORINUS eam pro *cervicis ligamento* descripsit p. 219. Vertici uteri omentum non rarissime adligatur. Exempla habent BARTHOLINUS p. 262. FABRICIUS de *omento* p. 93. & BLASIUS in VESLINGIUM: etsi non dixerim ideo sterilesce, ut HIPPOCRATES περὶ αἰσχροῦ & aphor. V. & PANAROLIUS *Pentec.* III. *obs.* 4. & FABRICIUS. Dudum monuit J. W. PAULI *diff. de nutrit* p. 25. & quotidie obesissimae feminae pariunt.

Sed vagina, quam cum utero describere necesse videtur, canalis carnosus est, ex terete, uti canales solent, compressus, multo utero latior, situ primo declivi, qualem omnes unice pingunt, deinde pene transversali, ut tamen modice antrorsum descendat DE VENTER *nov. lum. obst.* p. 21. 22. qui inter anteriorem, & inprimis superiorem vesicam, quam enormiter parvam EUSTACHIUS pingit T. XIII. & XIV. f. 2. & inter inferius & posterius rectum intestinum, a fine uteri, cui connascitur, ad interfemineum

neum descendit. Utero, paulo supra os internum, inviolabili nexu connascitur. Recto intestino etiam GALEN. *de diff. vulv.* c. 4.) & cellulosis, & carneis fibris cohaeret, ut tamen integra figura separari queat. Vesicae cellulositate mera, longe ante accretionem peritonaei, urethrae denique ipsa carne conjungitur, neque potest absque laceratione separari GAL. *de vulv. diff.* c. 4. C. BAUHIN. p. 120. Et anterior vaginae finis arctior est VESALIUS p. 655. media latefcit GRAAF. p. 169. 147. Nuper tamen exitum latiore vidi.

Ligamenta autem uteri utrinque duo dicuntur: *Lata*, quae velorum similia ARETAEVS dixit *de morb. diutur.* l. II. c. XI. sunt ipsum peritonaeum, quod a margine pelvis anteriori descendit, & ad uterum quidem dictum est, cum vero latius sit, ad utrumque ejus latus retrorsum fertur, hinc utero, inde pelvis lateribus continuatum, ad posteriorem pelvis parietem contra se ipsum redit, adeoque duplex est. HENSING, *de perit.* n. 47. VESALIUS 656. & quasi perpendiculare septum inter anteriorem & posteriorem pelvis medietatem facit WINSLOW. n. 601. VESALIUS l. V. f. 24. o. o. Idem utrinque & uteri lateri adhaeret & vaginae, uti recte SANTORINVS p. 219. maxime in virgunculis junioribus, ibique continuatur parti peritonaei tegenti uterum, prius dictae BIDLOO T. 50. EUST. T. XIV. f. I. GRAAF. T. XII. M. M. & XIII. (sed resectum.)

Idem peritonaeum, quod ligamenta lateralialia facit, ovarium amplectitur, eique pro membrana communi est, iterumque ab ovario recedit antrorsum, latiusculum, propria productione libere in abdomine natante, & longius ovariis attingit tubas & continet GRAAF T. VII. G. G. T. VIII. O. O. T. XI. I. I. T. XII. V. SWAMMERD. T. 1. D. D. T. III. tuncque porro ad musculos & vasa Iliaca redit. Haec ultima plica saepe, & MORGAGNO in primis *adv.* IV. p. 49. alae vespertilionis nomine venit. Aliis vero, et Gallis maxime, ligamentum ovarii in duas partes dividitur, posteriorem ovario, anteriorem vero tubae destinatam GARENG. II. p. 64. WINSLOWVS hanc alas parvas vocat n. 602. Fibras carneas vero alarum VESALII p. 660. f. 24. P. a COLLINSIO p. 573. & a BAYLIO repetitas *de catamen*, a quibus uterum in penis occursum deprimi VESALIUS dixit, & DIONIS *cours d'anat.* p. 291. recte refutat GRAAF. p. 206. & WEITBRECHT *syndesmol.* p. 230. & HENSING. l. c.

Alterum ligamentum uteri *teres*, sub tubarum origine EUSTACH. T. XIII. XIV. f. 1. & anteriùs, latius ibi quam in progressu GRAAF. p. 209. COWPER ad T. 50. ex uteri lateribus exit, inter redeuntes in se ipsum ligamenti lati laminas HENSING. n. 47. taeniae modice convexae simile, & retro peritonaeum, quod elevat, GRAAF T. XI. D. P. F. & retro arteriam umbilicalem, deinde flectitur deorsum, atque super vasa Iliaca extrorsum

sum abit, ad anulum abdominalem ten-
 dit, perque eum ad initia femoris ver-
 fus pubem convergens, & aliquibus
 fibris ibi insertum BARTHOL. *hist.* 92.
Cent. 2. LIEUTAUD p. 360. SANTO-
 RIN. p. 220. in fimbrias radiatim & dif-
 formiter solvitur, MORG. *Adv.* I. T. III.
 GRAAF. T. VII. VIII. XI. VID. T.
 LXVIII. quae in adipem evanescunt, ex-
 tra pudendum WINSLOW. n. 622. GRAAF
 p. 208. MURALT. *vadem.* p. 419. FAL-
 LOP. *obs.* p. 195. Cellulosum hoc liga-
 mentum est, vasis mistum WINSLOW.
 n. 619. SWAMMERD. T. III. V. COW-
 PER I. c. ut in praegnantibus quadru-
 plo crassiora sint, RIOLAN. p. 365. &
 in puerperis mire sanguine distendantur
 MORG. *Adv.* IV. p. 49. atque striis fi-
 brosis longitudinem sequentibus, AR-
 CHANGELO dictis p. 194. & NUCKIO
adenogr. f. 32. & BAYLIO I. c. & nuper
 Cl. TREWIO *Comm. Noric.* 1731. n. 26.
 & MOEBIO *diff. inaug.* obs. 2. aemulis mu-
 sculorum LIEUTAUD I. c. ut recte
 cum carneo tomento comparaverit FAL-
 LOPIUS *obs.* p. 195. SANTORINUS ve-
 ro ornatius ex praegnantibus & puerperis
 descripsit, & per cornua uteri, in sum-
 mum fundum ire, arcum facere, atque
 uterum detrahare dixit p. 221. quae for-
 te causa fuit, cur multi anatomici
 Cremafterem feminis tribuerint DCXL.
 recentiores autem aliqui musculos
 omnino vocent, ut PINAEUS
 p. 41. NICHOLLS p. 46. quos olim re-
 futavit FALLOPIUS, deinde GRAAF
 p. 208. Longius vero descendere, & ad
 clitoridem venire, ut COLUMBUS p.
 342. (qui pro novis describit) NYM-
 MAN.

MAN. *de vit. fetus* p. 43. 44. BARTHOLIN. p. 149. RIOLANUS *enchir.* p. 172. VESLINGIUS, & ante revocationem suam DIEMERBROECK p. 155. & nuper CRAMERUS *Comm. Nor.* 1734. *behd.* 19. vel ad media femora pervenire, ut C. STEPHANUS p. 292. aut ima, ut C. BARTHOLINUS, ut etiam lapsis ingenua muliebribus uterum detrahant, le CLERC *Chirurg.* p. 96. id experimento repugnat. Longe minus verum est, haec ligamenta cava esse, ut C. BARTHOLINUS, & RIOLANUS p. 184. qui eam viam veneni venerei facit, per quam bubones nascuntur, & BAYLE l. c. & NYMMAN, qui ea via puerum respirare docuit, *de vita foetus* p. 43. 44. aut semen continere, quod SPIGELIUS ait p. 259. & D. de MARCHETTIS p. 47. & VESLINGIUS. Horum errorum illud jam ARCHANGELUS l. c. deinde van HORNE *prodr.* p. 27. istum MOLINETTUS refutavit p. 324. FALLOPIUS autem, qui extremitatem cavam fuisse dicit p. 195. b. vasa vidisse potuit, in quae discedit.

Liberum ideo uterum esse, nemo negaverit experitus, & vera hic est DRELINCOURTII *de utero* n. 3 & KERKRINGII observatio (*obs.* 20.) quam GRAAFIUS repetit p. 209. nam pondus uteri lata ligamenta facile inclinat, teretia vero vix ullibi, quam in utero, firmitus punctum habent. A ligamentis autem latis, & a vagina adnexa hinc recto intestino inde urethrae & vesicae, retinetur uterus, ne nimis licentiose vagetur, aut per abdomen, guttorve obambulet, quae vetularum phrasis est

rint c. Uterus virginis sedecim annorum extra mensium periodum tantillus est, fescuncem longus, fescuidigito nihilo latior, ubi latissimus, & intus exiguam cavitatem ^d continet, fibrosam, transversis ductibus. Pulpa ipsa uteri in ea aetate tota homogenea adparet, praeter cervicem, neque arteriae venaeve adsunt conspicuae, nisi in exteriori superficie: nullae denique glandulae adsunt, sed singularis substantia, quam cum videret, mereri existimavit **GALENVS**, ut hymnos Iovi caneret, quod tam mirabilia sibi contigisset videre. Contextus est vasorum arteriorum, & venosorum, qualia nulla in virgine adparent, neque enim dissectus uterus sanguinem fundit, qui totus albicet. In gravidae vero feminae utero nihil fere vides, praeter far-

perantiqua, nam apud **ARETAEUM** reperitur *acutor*. L. II. c. XI. neque a recentioribus ejurata, ut apparet ex historiola **E. N. C. Dec. I. ann. III. obs. 349.** quam fabulum **RIOLANVS** castigavit p. 184. Idem recte addit, ovaria utique oberrare posse, quae etiam ab intestinorum pressione huc illucve cedere necesse est. Tenui intestino ovarium inhaesisse vidit **SANTORINUS obs. p. 217.** & in inguina etiam prolabi, testiumque specie imponere observat **Cl. PARSONS of the bladder p. 141.** neque quidquam repugnat.

c Vide **DCLXIV. DCLXXXVI.** ubi etiam hanc sententiam videtur defendere **PRAECEPTOR.**

d **DCLXIV.** ubi reliqua, ad fabricam utero spectantia, habentur.

sanguinem, & in eadem parte °, in qua vix unum aliquod vasculum inveneras, praeter superficiem, in ea nunc tanta adsunt, ut digitum inferere posses. Ab ea vero magnitudine uterus ad priorem parvitatem redit f. Vidi enim uterum feminae, quae decies & quater pepererat, similem certe virginei uteri.

Extensilis) Haec tota diversitas, qua gravidus uterus a virgineo distat, debetur humori ab interioribus distendenti, neque ulli augmento solido, quod vasis appositum fuerit: et tamen uterus gravidus ita dilatatur, ut 24 f libras capiat, si gemellis inpraegnatus fuerit. Haec admirabilis fabrica, quae in femella humana vix extricari potest, adegit MALPIGHIVM f*, ut in vaccarum uterum inquireret. Uterus arteriarum et venarum tela est & complicatio. Quod inter vasa medium, id cellulosum est, cavum, mucosum totum plenum in praegnantibus: utero vero inani & vasa & cryptae omnes evanescent, live in virgine extra tempus mensium inquisiveris, live in muliere, postquam peperit: neque ulla pinguedo circa uterum est, nisi in femellis castratis, & id ipsum de marium scroto obtinet: neque glandulae in utero ullae, sed cryptae ingentes, liquore

tur-

e DCLXXXV. Uterus in recente puerpera non major pugno la MOTTE *obs.* 397. &c.

f DCLXXVI.

f* *Epist.* ad *Spon.* p. 29.

g DCLXIV.

turgidae, in quas humanae placentae inaequalitates radican- tur, brutorumve cotyledones.

Hic totus uterus ex tantilla mole, exigua vi, ad insignem magnitudinem extenditur. Quo modo vero uterus, cinctus vasis adeo magnis, potuerit a centro ad circumferentiam expandi ^h, a tam modico influxu partis expandentis, neque potius ab ambeunte abdomine compressus fuerit, & quare ovum facilius potuerit distendere, quam uterus ovum comprimere, ad has quaestiones vix quidem datur respondere. Quod enim in ovo est, id omne ab utero venit. Neque flatu distendi potest; sed distendi videtur a conjuncta distensione vasorum omnium.

Elasticus; HARVEIUS, cujus nunquam sine reverentia oportet meminisse, scripsit, in ipso utero inesse vim, quae fetum expellat, tantam, ut inter mortuae matris femora puer repertus fuerit ⁱ, quem post fatum
ute-

^h Uti semen visci in cortice arboris, & inter rupes plantae saepe arboresque, bufo demum inter dura saxa augetur. SANTORINI. *obs.* p. 232. Vis enim viva omni vi inertiae major est. Neque vasa cavitatem uteri comprimunt, ea enim extrorsum dilatantur, cum in externa superficie truncos suos habeant, eaque liberior sit.

ⁱ *de gener. anim.* p. 267. edit. Londin. Sed fetus a morte matris in lucem erumpentis numerosas historias invenio, quae equidem demonstrare videntur, aut magnas in partu fetus partes esse, aut musculosam vim uteri ab ipsa morte superesse. In
summa

uterus expulisset. Certe post partum uterus mollis est, uti charta pergamena lota. Vivus autem coit quidem in se ipsum, ut

cavum
summa debilitate & deliquiis partus la
MOTTE *obs.* 154. in convulsionibus
BRESL. 1722. M. Dec. MAURICEAU
obs. 331. cum paralyfi la MOTTE *obs.*
219. In media apoplexia partus BRESL.
1719. m. Nov. in agone mortis BAR-
THOLINUS *hist.* 99. Cent. II. in co-
mate matris HARVEIUS p. 266. in epi-
lepsia ejusdem HELMONT. *vit. multipl.*
FONTANUS p. 135. E. N. C. Dec.
II. ann. 2. *obs.* 32. Dec. III. ann. 7.
8. *obs.* 124. & cum perfecta mentis alie-
natione conjuncta la COURVEE *parad.*
p. 244. SCHURIG. *Embryol.* p. 474.
PECHLIN. L. I. n. 30. Par-
tus a morte HORSTIUS ex CORNA-
RIO *hist. med. mir.* p. 705. ubi plura
exempla habentur. Duo exempla,
sed de auditu habet HILDANUS
p. 906. aliud suspectum SALMUTH
Cent. II. *obs.* 1. Unum absque idoneo teste,
est in E. N. C. Dec. I. ann. III. *obs.* 318.
aliud Dec. II. ann. 4. *obs.* 42. & Dec. III.
ann. 4. *obs.* 121. & vivi, ut videtur, fetus
ibidem *obs.* 83. tum apud VESLING.
ep. posth. 7. & melius Dec. I. ann. 3. l. c.
Duo in *Actis Hafniensibus* ann. II. *obs.* 35. p.
92. & in *Historiis BARTHOLINI* l. c. A-
liud ROLFINCKIUS *diff. anat.* p. 1195.
aliud BRESLAVIENSES 1722. m. Mart.
m. Sept. quae historia satis fida videtur, &
1718. p. 1192. 1193. & fidus auctor la
MOTTE l. c. p. 540. aliena quidem,
sed satis probabili fide. Sed & NYM-

cavum omne deleat ^k, perinde ut vesica, sed sensim & absque elateris indicio. In vivo enim animale aperto abdomine vesicam acu pupugi ^l, cum tota urina plena esset, effluxit urina, & vesica in se ipsam coivit, contraxitque se pro ea ratione, qua urina exhibat.

Liber) Tamquam ζωον εν ζω, uti DEMOCRITVS, facile moveri potest, sursum, deorsum, antrorsum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum: & pariter situm, uti figuram, facile & frequenter mutat. Haec

DE-

MANVS talia compilavit, & SCHURIG. *sylleps.* p. 200. Verum aliud, quod maxime huc facit, in quo fetus & ipse mortuus, & pene putridus ex mortua matre egestus est, exstat E. N. C. *Dec. ll. ann. 4. obs. 107.* & aliud ex languente & pene mortua matre, mortui fetus ejecti exemplum VERDRIES E. N. C. *Cent. ll. obs. 177.* aliaque pariter habet mortui fetus SALMUTH. *Cent. ll. obs. 36.* & aliud HOECHSTETTER. Non tamen oportet dissimulare, lochia etiam, & sanguinem, a morte per uterum & os, per expansionem aeris elastici concitata erumpere, & hoc modo fetum, cum effervescentibus lochiis, explosum fuisse E. N. C. *Dec. Ill. ann. 3. obs. 44.* & menses per os, naresque a morte apoplectica HILDAN. *Cent. Ill obs. 12.* ut omnino circumstantias accurate perspicere oporteat prius, quam ex his observationibus pro musculo uteri aliquid concludatur.

k DCLXIV.

l CCCLXVI

DEVENTRII ^m est observatio, os nempe uteri non semper recta respondere lineae medi-

m Nemo fere anatomicorum ante DEVENTRIUM ignoravit hanc in situ varietatem, quae in utero, in vagina, & in uteri ore observatur, & ipse & in utero vacuo vidi dextrorsum tracto, & in praegnan- te. In graviditate enim etiam frequentius contingere necesse est, cum funiculus rarissime mediae placentae, neque haec medio fundo uteri infigatur, ad eam vero partem uterum vergere necesse sit, ad quam fetus pondus eum trahit MULLER *de situ obliquo uteri Argent.* 1731. Ergo HIPPOCRATES fusissime diversos in situ uteri errores prosequitur *περὶ γυναικ. β.* & ab ea causa derivat sterilitatem *ib. α. & β.* & *περὶ ὀστρον.* deinde PLATO in TIMAEO, ARISTOTELES *hist. L. X. c. 1. 2.* GALENUS *diff. vulv. c. 7.* uterum ejusque collum sursum, deorsum, antrorsum & retrorsum inclinari ait. PAULUS propriam curationem, tamquam malo vulgo noto, uteri declinationi obponit *L. III. c. 64.* RHAZES declinantem uterum cucurbitula admota jubet corrigere *de sectionibus.* Sed & AVICENNA habet *Canon. L. III. Fen. XXI. Tr. I. c. 1. 8.* qui hac ratione a semine aliquando vult averti, & RIOLANUS p. 184. & ROLFINKIUS, & MAURICEAU p. 61. 57. & c. & BLASIIUS *obs. 2. L. IV.* & GRAAF. p. 178. & CHARLETON *de catam. p. 16.* & RUYSCH. *Cent. obs. 88.* & in E. N. C. *Dec. III. ann. 7. 8. obs. 9.* [dextrorsum] & IUSTINA SIGMUNDIN, quae pro-

B 5

fun-

mediae, sive axi vaginae ⁿ, declinare autem, ut retrorsum, vel ad latera aberret.

In-

fundum situm oris uteri inter causas difficilis partus retulit p. 188. 189. atque, si retrorsum declinaverit, periculum praefigit p. 12. & MORGAGNUS *Adv.* IV. p. 46. Ab eo tempore PARISINI *hiss. de l'Acad.* 1709. n. 5. hepar viderunt ab utero declinato in pectus inPELLI, & COUEY situm oris uteri incertum facit in edit. *Camer* p. 67. & MANNINGHAM *comp. art. obstetric.* p. 3. 11. 14. qui ad omnes quatuor plagas declinare vidit, & CHAPMAN *inprov. of midwifry*, qui oris obliquitatem solum ad posteriora & ad anteriora admittit p. 9. & recentiores fere omnes. Hoc autem peculiare habet H. a DEVENTER, quod has uteri aberrationes inter frequentes causas partuum difficultium numeret *novum lumen obstetr.* c. 9. 11. 46. seqq. quem sequitur MANNINGHAM p. 20. & I. VON HORNE *Wehmutter* S. II. c. 2. fuse. Sed recentiores video non plurimum tribuere huic difficultati, & vix aliam agnoscere, nisi quae sit ab ossium pubis a sacro nimis exigua distantia. Certe etiam in herniis uteri, enormiter devii, partus felices reperio; & vis uteri, qua fetum propellit, etsi aliquam esse non repugnaverim, pene nulla est, si cum enormi nixu respirationis comparaveris, quo urgente fetus, qua data via cedere cogitur, vitiumque mollis uteri facile ipse emendat, repulsus a sacro osse ad minus resistens ossis pubis intervallum, denique

ⁿ Lineam rectam per uteri axin cum vaginae
axi

Ineommodum est, sed necessarium. Inde HELMONTII ^{n*} voces, Deum ponere maximas potestates in membranis, cum ventriculus vim cibi mutandi nactus sit, uterus vim transformandi.

Pressus) nulla certe causa adest, quae comprimatur uterum, quem mollia undique ligamenta sustinent. Haec enim laxae tantum membranae sunt:

Defenditur) Supra uterum enim peritoneum proximum expanditur, uterumque cingit. Praeter eam membranam nullam aliam o. habet.

DCLXIV.

Membranis) Uterus omnino tegitur a peritoneo, tanquam externa membrana, & un-

axi continuam alioquin ducere impossibile est, cum uterus etiam cum optima vagina angulum intercipiat.

^{n*} Vide *sextupl. digest.* n. 18. *ideam morb.* n. 2. &c.

a *Turbinatae, in Textu*) Uteri proprie sic dicti figura est, quae a SORANO primum demonstrata est, ut modice convexa superficie superius terminetur VESAL. p. 652. de *rad. Chin.* p. 122. inde duabus lineis sensim convergentibus, modice curvis, tanquam lateribus finiatur. Tales bonas icones RVYSCHIUS dedit in *Theor.* VI. & *Adv.* I. Facies anterior & posterior planiores sunt VESALIVS p. 652. RIVOLANUS p. 185. latera pene acuta, magis eminent. Gracilior finis, in quo lineae convergentes coeunt, habet circum-

natam

undique clauditur, ut nihil apertum sit, praeter tubarum aperturam. Interior autem tunica nulla ^b adest, ne minus facile uterus in

natam sibi paulo super osculum vaginam GRAAF. T. VII. WINSLOW. n. 646. quae apicem resecti coni similem uterocultat. Confer EUSTACHII T. XIV. f. 3. cum T. XIII. & DCLXXV. Inde factum est, ut uterus vulgo nimis brevis & pingatur & describatur. Tres nempe digitos transversos longum faciunt VESALIUS p. 656. GRAAF p. 183. WINSLOW. n. 590. & alii, ego coram habeo, cujus dupla longitudo est, ex femina sanissima excisum. In puellis autem tenerioribus equidem exilissimus est RVYSCH *Mus.* p. 184. fabae mole HARVEI. p. 272. in virgine piro, in muliere ovo anserino comparat IDEM p. 273. In gravidis insigniter increscit, ut totus uterus pene sphaeram imitetur, RIVOLANUS p. 185. BIDLOO T. 54. bene, DEVENTER ic. c. VII. Crassities in matura femina circiter unciae (de gravida vero dicetur). Duos digitos transversos facit GRAAF p. 183.

^b Membrana exterior uteri peritonaeum est, quo undique obducitur, uti recte monuit ARANTIUS *de fetu* p. 3. neque aliam praeterea membranam habet, etsi nervosam membranam pro peculiari GALENUS numeret *de vulv. diff.* Post hanc membranam cellulosa sequitur NOORTWYCK T. I. C. superius ita arcta & brevis, ut vix possit a carne uteri separari. Interna, quam dixerunt GALENUS

in molem majorem distenderetur ; Loco vero membranae sunt vasorum ultimorum exhalantium , & inbibentium , fines , & in praegnantibus lacunae mucī plenae.

Fi.

NUS , qui venosiores facit externa l. c. & VESALIUS p. 656. & GRAAFIUS p. 186. & alii fere omnes , nihil est , nili ipsam substantiam uteri velis. Video quidem membranam hanc repetere WINSLOWUM n. 595, 596. VIEUSSENIUM *nov. vas. syst.* p. 2. & SANTORINUM , & Cl. LIEUTAUD. p. 360. porosque ipsi tribuere & lacunas villosque. Verum non video , quibus notis haec membrana a reliqua uteri carne separari possit : Dudum monet MERY *hist. de l'Acad.* 1707. *obs.* 2. neque dissentit MORGAGNUS *Anat.* IV. p. 47. & veteres video, ipsam carnem uteri pro ea membrana habuisse , cum crassissimam ; maxime ad ostium , VESALIUS vocet p. 657. &c. Membrana vero , quam bis in utero reperi & facile separavi , mollis , porosa , ea chorion fuit , ut videtur ; a conceptu infelici superstes , & nihil cum naturali fabrica commune habet. Caro vero uteri , in multa strata separabilis ARANTIUS l. c. BARTHOLINUS p. 262. VERHEYEN. p. 127. NOORTWYCK *anat. uter.* p. 12. spongiosa , mollis , fungosa , PLAZZON. p. 127. compressilis , succo plena , nihil fere cum ullo alio viscere commune habet , glandulosae tamen carni propior est , quod morbi utero familiares confirmant , scirrhi , canceri , sarcomata.

Fibris) • Uteri fibrae in integro & sanguine distento utero nullae apparent, tunc enim mera vasa videntur. Quando vero a partu sanguine spoliatus pallet, tunc innumerabiles adparent. Inde sequitur, aut totum

c Has fibras omni tempore in utero viderunt Anatomici. GALENUS omne genus fibrarum in utero esse dixit *de util. part.* L. XIV. c. 14. BONACIOLVS, cum paucissima habeat, villos tamen uteri habet, & longitudinales & transversos p. 17. *edit. Batav.* FERNELIUS eadem docet *physiol. descr.* part. c. VII. VESALIUS fufe, externas fibras in feminis, quae pepererunt, transversas, non plurimas, medias copiosiores obliquas, internas paucas & rectas esse p. 657. & denuo has carnosas fibras repetit *examen Fall.* p. 145. PLAZZONUS habet similia, p. 127. & BERGER p. 455. & GRAAFIUS p. 185. magis tamen in fundo, & C. BAUHINVS p. 123. ARCHANGELVS fibras carneas inter duas tunicas evidentissime vidisse testatur p. 190. LUD. BARLES inter membranas, ad orificium internum telam carneam nasci ait *nouvell. decouv.* n. 3. S. COLLINS in praegnantium utero fibras musculares ait apparere p. 568. MALPIGHIVS non in vacca solum p. 26. sed in mulieribus praegnantibus fibras reticulatas vidit, ut totus uterus ex laceratis componi videretur p. 29. et observationem MALPIGHII MORGAGNUS in puerpera confirmavit *adv.* IV. p. 47. Carneae reticulares uteri fibras etiam

CON-

totum uterum nihil esse nisi fibras, aut omnino nullas adesse ^c *. Quid ergo? nonne

CONNORVS habet *diff. de sarcom. uter.* p. 49. MERYUS in puerpera uterum musculofum reperit *hist. de l'Acad.* 1707. n. 2. & LITTRIVS 1701. p. 385. qui reticularem musculum vocat p. 386. FANTONVS fibras uteri copiosissimas vidit p. 198. & musculum notabilem, quo corpus uteri componatur, ex transversalibus longis & decussatis fibris HEUCHERVS *art. magn anat.* n. 63. VATERVS in sarcomate uteri carnem musculofam vidit propria *diff.* HEISTERVS denique, qui musculo uteri nihil tribuit, fibras tamen musculares uteri admittit *comp. anat.* n. 31. & in *diff.* MOEBII, SANTORINVS autem uterum absque dubii signo musculum vocat, cujus lacertuli in puerperis distincte adpareant, & alii in orbem ducantur, alii superne ab utero dimittantur p. 216. CL. NOORTWYCK strias in utero pene in orbiculum dispositas reperit graciles, passim sparsas, neque ad placentae sedem limitates, in gravida femina l. c. p. 12. 106. Ego denique, sed omnino semel, in utero tertio mense gravido, fibras in universum circulares vidi, deinde alias ex vertice uteri, per utramque superficiem secundum longitudinem descendentes.

- ^c * Fibras musculares omnino adesse, et pol-
lere vi elastica, multis modis confirma-
tur. Uterus enim humanus, praeter ex-
perimenta not. i. ad DCLXIII. ita valide
in

in partu constringitur, ut etiam manum debilitet *Hist. de l'Acad.* 1715. p. 7. CL. HARTMANET de *secund. cont. extrah.* p. 23. MURALT *coll. anat.* p. 642. CL. BOEHMER in *progr. de sit. uter.* p. 13. & perforatus a fetu, intra breve tempus vulnus, quod fetum transmiserat, pene clausit *la MOTTE obs.* 316. E. N. C. *Dec. II. ann. 9. obs.* 115. statimque ab exclusa placenta circa manum manifesto se contrahat DEVENTER p. 44. alias autem os uteri crampo constringatur in commode, partumque moretur SIEGMUNDIN. p. 10. aut a partu ita cito se claudat, ut retineat lechia HARVEIUS p. 295.

Deinde, matre immobili, fetu iam putrido uterus ita se constringit, ut puerum pellat, & iuvet eximentem SIEGMUNDIN. p. 31. notissimo denique experimento ex summa illa dilatatione in partu se intra paucas horas restituit, prioremque recuperat exiguitatem *la MOTTE obs.* 385. MANNINGHAM p. 4. &c. DCLXXXV.

Evidentius autem vidit HARVEIUS in prolapsu uteri, cum omnis septi transversus abesset actio, uterum se fetu mortuo liberasse p. 269. consentiente BIERLINGIO. L. BOURGEOIS II. p. 39. RUYSCHIO *adv.* II. p. 24. & BIANCHO de *gener.* p. 114. & rescisso abdomine in cane solum uterum fetum exclusisse HARV. l. c. p. 333. alibique in *ex.* 67. motum uteri undosum se vidisse memorat, in recens enectae damae utero. Porro in catellis VENETTE p. 247. 225. & GRAAFIUS in cuniculo, motu undos-

ne RUYSCHIVS ^d musculum vidit, quem descripsit? nonne in auctione publica venditus est, boni senis manu praeparatus, uter-
rus

undoso peristaltico fetum expelli vidit p. 313. & in cornubus uteri muris agrarii motum peristalticum suis conspexit oculis MURALTUS *vadem. anat.* p. 544. nuperque VALISNERI *de gener. vivip.* c. 5. n. 22. RUDBEKIUS uteri contractionem, quae post partum fit, diserte cum vesicae constrictione comparat *obs. post tr. de duct. aquos.* p. 329. Denique in partu muliebri ipse tetigit RUYSCH. uterum moveri, eminere, & manum propellere *obs. med. n.* 93.

d DIEMERBROEKIUS in puerperis vide-
rat, inter utramque uteri membranam contextus musculares, quos ad expellendos fetus aptos esse crederet p. 137. cito autem a partu evanescere addiderat. De *Meryo* dixi not. b. & *Littrio*. Deinde *Ruyschius* in *Adv.* 10. *Dec.* 11. fibras musculosas fundi uteri in circulos concentricos fere dispositas descripsit. Postea vero fusius exposuit, circulares, subtiles, fibras, (*Dec.* 111. iconem vide T. 3. f. 1. & in *tr. de uteri musculo*) placentam separantes, ut minime necesse sit manibus eximere nimis adhaerentem. Inventum rei gratulatus est *A. Vaterus* & *Hecquetus*, deinde recepit *Monrous Edimb. soc.* 11. p. 128. & *Simson Edimb. soc.* IV. p. 117. alique, ut praeter vulgo notas fibras novum musculum admittant. Sed etiam solertissimus *Hummelius*, quem
T. V. P. II. C

rus, in quo manifestas in fundo videres membranas circulares? Adfunt utique, sed fibrae non sunt. Quid ergo? Merae lacunae

quem nuper praematura mors extinxit, altero a partu die *Ruyshii* musculum se vidisse scribit *Comm. Lit.* 1738. hebdomadae 21. deinde ex repetitis experimentis descriptionem dedit ib. 1739. hebdomadae 16. conf. diss. *Hollingii de offic. obstetr.* n. 12. *Gravel de superfet.* p. 12. & *Keck. diss. de dolor. a partu causis* n. 41. & iconem COMM. 1739. T. IV. f. 1. fibras nempe in fundo uteri tenues, in varios arcus absque ordine flexas, & decussatas, plerasque orbiculares, rectas alias.

Verum contra hunc musculum *Heisterus* dixit *comp.* n. 31. & in diss. *Moebii* l.c. qui negat aliquid a dudum notis fibris diversum vere adesse. Tum *Cl. Hartranft*, cum uterum musculosum admitteret, peculiarem tamen & a fibris dudum notis diversum apparatus adesse negavit *de secund. extr. non differ.* n. 13. & testis omnium maximus *Ruysebius* in ultimo senio manifesto fassus est, parum se suo musculo tribuere, teste *Cl. SCHREIBERO de vit. Ruysh.* p. 54. ex ore communis nostri amici *Ill. Bohlii*, qui diu cum *Ruyshio* vixit, ultimus & carissimus discipulorum. Verum an ergo nullae omnino fibrae musculosae uteri adfunt? an omnino musculosae fibrae uteri sunt dilatae aut lacunae, aut arteriae venaeve, sanguine praeter naturam turgidae, ut hic PRAECEPTOR opinatur & video *Cl. GORTERVUM* sentire *de mor. vit.*

nae fungosae, sanguine plenae, quamdiu uterus distenditur: tortuosum autem vas, aut accumulatio vasorum similium, fibram refert muscularem. Recte adeo MALPICHIVS, ignorare se, quid uterus humanus sit, & nihil musculosum reperire. Deinde alia ratio est, quare has fibras non credam esse

vit. n. 41. & LIEUTAUD. P. 359. & pridem fuse VIEUSSENS nov. vas. system. p. 15. BOERHAAVIUS quidem tenacitatem elateris adlegat, quae in utero est, & desideratur in musculis. Sed notissimum est, intestina ad enormem molem distenta facile, expulso aere, in angustiam summam redire. CLIEUTAUD. obiicit, uterum fetum crassescere, cum ventriculus & intestina expansa extenuentur. Sed ea extensio uteri in vasis est, & dicetur alibi. Verum contractiles elasticas fibras inesse utero, pallidas ante graviditatem, tunc vero vasis turgentibus, uti omnes muscoli minores, rubicundiores evidentius conspici, opinor certum esse, atque & anatome demonstrat, & experimenta, & ipse denique ordo ramorum expers, & recti tractus a vasorum figura alieni. Peculiarem vero RUYSCHII musculum, diversum a fibris illis uteri dudum notis, neque cogit anatome neque ulla suadet admittere necessitas HUMMELII autem icon, uti a RUYSCHIANA tota differt, ita nostram sententiam confirmat, cum fibras & circulares varias, & varie longitudinales admittat.

esse de musculorum natura, hi enim ea ratione distendi non possunt, nisi tanta vis ipsis inferatur, ut postea nequeant se in priorem brevitatem restituere. Consideravi cadaver feminae, quae plurimos, & vegetos, fetus ediderat: postquam decem fere annis defisset parere, vidi uterum

c *Intortis, in textu*) Vasa uteri in feminis non inpraegnatis in universum proprios habent serpentinos flexus; ut toto itinere quidem pene rectam lineam sequantur, sed eam alternis undis interceptam describant. Habent HORNE, SWAMMERDAM *prodr.* T. I. II, GRAAF p. 187. T. I. utcumque & p. 181. & BOHN p. 224. & iconem dat NUCK *adenogr.* T. XXXII. Confer etiam FREIND *emmenol.* c. IV & VATERVM *uter grav proemium* & p. 11. In praegnante vero utero has plicas evanescere, & vasa in rectum exporrigi, manifesto vidi, ibique enormiter crescunt, ut credam BARTHO. LINO, qui emulgenti comparavit, & GRAAFIO p. 215. qui digitum recipere dixit p. 182. quod de spermaticis C. BAUHINVS dixerat p. 124. & RIO-LANVS p. 366. & SALZMAN in *obs. anat.* & pridem CARPUS in MUND p. CCLV. Addit MALPIGIANVS, duas fere ad unam arteriam venas esse p. 26. & CAR STEPHANUS, arterias, magis quam venas, flexuosas esse, quod verissimum est, L. III. c. 5.

Caeterum in non praegnante utero superficie inprimis trunci percurrunt,
sub

rum nihilo majorem, quam virgini fuerat. Ergo fibrae ureri, quae in tantam amplitudinem se patiuntur distendi, et tamen vim contractilem ita illaesam retinent, ut ad priorem parvitatem se contrahere valeant, non musculari potentia, sed communi aliqua vi elastica videntur agere.

Exter-

sub peritoneo, ut in iconibus GRAAFII & SWAMMERDAMMII adparet. In pulpa autem uteri dissecta adparent foraminum specie, quod dissectae arteriae se sustineant RUYSCH in iconibus plerisque, GRAAF T. VIII. F. SWAMMERDAM T. III. S. MAURICE U p. 33. f. 3. DOUGLAS *Phil trans abr.* IV. T. VI f. 2 Video MORGAGNUM, GRAAFIVM corrigere *adv.* IV. p. 47. quod pro vasis habeat, quae sinus sint. Verum ipsa teres figura & repletio aliud suadent. Denique in ipso utero vasa perinde, uti in aliis glandulis, in rete intricata evanescent MALPIGH. *epist. ad Spon.* p. 26.

f Lymphatica in utero vaccino facilia sunt visu, & calamo non minora vidi; conf. NUCKIUM *adenogr.* p. 75. f. 33 RUDBECK *fig nov.* IX. MALPIGH. *epist. ad Spon.* p. 26. GRAAF. T. XI. WHARTON p. 244. Ita etiam ovium uterus lymphaticae habet VIEUSSSENS p. 14. Haec ipsa vasa ea lactea sunt, quae EVERHARDUS & DEUSINGIUS agebant per lata ligamenta ad uterum & cornua ferri apud TILINGIVM *de placenta* p. 261. 360. & defendit DIEMER-

Externae) In viris musculi abdominis propriis perforationibus instructi sunt, per quas vasa spermatica descendunt. Ita in femi-

BROECKIUS p. 206. 213. &c. Sed & ovaria brutorum lymphatica habent RUDBECKIUS l. c. NUCK p. 70. In homine obscuriora sunt MORGAGNIUS tamen in puerpera turgida, sub externa membrana repentina, vidit *adv. IV. p. 76.* & WINSLOW n. 623. & iidem sunt lactiferi ductus interni involucri uteri, a CHIRACO demonstrati apud SCHVRIEG. *embryolog. p. 4.* Sed & MERYUS vidit, in omnibus partibus generationis apud la MOTTE *des accouchem. p. 101.* & STAEHELINUS meus *specim. anat. bot. I 24. n. 6.* NVCKIUS de utero humano desperavit p. 75. ovarii autem lymphatica quatuor aut quinque trunculis versus vasa magna & cisternam chyli euntia pingit f. 32. Haec eadem vasa ovarii in femina enormiter ampla visa fuisse PARISINI habent *Histoire de l'academie 1707. n. 4.* Nervos denique diximus ad DCLVI. Ab octavo pare deducit VESALIUS p. 660. sed intelligit intercostalem, a cuius plexu mesenterico infimo majusculos ramos video in uterum adire, & ex fine ultimo ramulos habent WINSLOW p. 623. VIEVSSENS T. XXIII. n. 81. deinde a trunculo, iam fini suo proximo n. 84. Addit GRAAPIUS ab osse sacro alios p. 188. qui mihi principes videntur, si cum nervis clitoridis conjunxeris. Nervorum autem in alis vespertilionum plexum primum
ube-

femina pariter duo foramina sub peritoneaei membrana reperiuntur, quae duas vasculosas vaginas emittunt. Veteres vocabant inferiora ligamenta uteri, sed eos DRELINCOURTIUS & deridet, solebatque per jocum dicere, eos viros in camera obscura feminas vidisse, qui has taenias pro ligamentis haberent, neque enim ligamentorum loco esse posse, & uterum retinere, nisi, quando feminae inverlae incedunt. Vasa sunt innumerabilia, quae ex femore ad uterum veniunt^h, & quae post EUSTACHIVM depinxit SWAMMERDAMIVS. Hinc intelligitur ratio herniarum, quae feminis accidunt. Herniam^h * dicimus, quo-

uberius descripsit SANTORINVS p. 229.

T. 2. f. 3. Sensus huius visceris acutissimum esse vulgo notum est.

g DCLXIII. Eandem sententiam sequitur GARENGEOT *splanchnol.* II. p. 74. nempe ligamenta teretia communicationem inter externas & internas partes genitales perficere.

h Omnes venae uteri miris anastomosibus communicant GRAAF. p. 214. etiam cum haemorrhoidalibus, de quibus negat IDEM p. 188. Res ipsa vera est, & perpetua, ut sola vasa genitalium externarum partium valvulas habeant. In ligamentis tamen teretibus venam valvulosam depingit SWAMMERDAM, ita dispositam, ut sanguinem ad uterum non sinat venire *prodr.* p. 27. T. II. sed refutat GRAAFIVS p. 355.

h* Hernias ibi fieri dudum FALLOPIUS vidit, qui

quoties peritoneum extrorsum pellitur; id in viris sequitur vasorum feminalium iter: in feminis autem, quibus peritoneum simplex vasis illis femoralibus, pro ligamentis habitis incumbit, poterunt intestina secundum eorum ductum elabi, & primo inguinalem herniam facere, inter angulum femorum & pudendi labium; deinde femoralem, quales ad medium femur prolapsus fuisse visum est; ut omnino MERYVS viderit, faeces alvinas ex medio femore exeuntes, per ruptum in dilatata vagina peritonei intestinum.

Communicantes) Ut arteriae femorales cum feminalibus, & cum iliaceis internis, & reliquae pariter inter se conjungantur mutuo. Ita fit, ut in omni statu corporis, quidcunque feminae contigerit, uterus semper abundet sanguine. Si enim quinque fontes obstruati fuerint, sextus, quem solum apertum mansisse pono, omnem eum sanguinem solus ad uterum feret, quem quinque fontes ferebant. Omnia enim vasa uteri liberrime communicant invicem, & val-

qui hunc ligamentorum teretium exitum per annulum bene describit p. 195. 195. b. Sed NUCKIUS fuse adfirmat, produci in feminis peritoneum in modum diverticuli, atque ligamenta teretia aliquousque comitari p. 130. seq. & t. 40. Verum nihil vidi unquam, nisi dubias aliquas rubellas strias, cremasteris imaginem, peritoneum autem ab anulo, perinde uti in viris, etiam aliquo spatio distat.

valvulis destituuntur, ut unica arteria repleta continuo repleantur omnes. Primus **EUSTACHIUS** in tabulis, **WREENIVS** autem ex conjectura, docuit nullas valvulas in utero reperiri. Nisi hanc fabricam **NATURA** selegisset, in uteri distentionibus facile vasa comprimi potuissent, nunc difficillime hic obstructio oritur. Eodem artificio natura in cerebro utitur, ubi vertebrales arterias cum carotidibus conjungit **CXXXIII**. Ad uterum ergo descendit sanguis per spermaticas, paralellus subit per iliacas, & haemorrhoidales, adscendit ex femoralibus.

Valvulis) Uterum ergo possumus dicere, texturam inextricabilem arteriarum & venarum a pluribus originibus ortarum, & inter se communicantium, quibus hoc singulare datum est, ut omnia incrementa arteriarum & venarum exprimere possint ⁱ. Nul-

ⁱ Ita **RUYSCHIVS** ea vasa vermiculata uteri ovilli prius limpida viderat manere, cum vasa rubracera repleta essent *Thef. II. aff. 5. n. 19*. Sed idem alibi continua vidit arteriis *Thef. VII. n. 16*. Et vulgo notum est, in gravidis incredibilem vim magnorum vasorum carnem uteri perrepere **DOUGLAS** l. c. quae in utero inani vix apparent: atque denique sanguinem naturaliter per ea vasa exire, quae liquidum pellucidum exhalabant. Ita **MORGAGNUS** sinus illos laxatos fluorem album, magis laxos sanguinem fundere credit *Adv. IV. p. 49*. **LITTRIUS** 1720. *hist. p. 20*, per eosdem

C 5

poros

Nullum enim sanguinem continent in utero virgineo non menstruato, nono autem men-

poros in menstruatis sanguinem, in gravidis mucum album exire, tenuem vero & limpidum liquorem in non praegnantibus, neque menstruatis. Hinc rete illud uteri cinereum, friabile, teretibus ductibus factum, ramosum, de quo dubitabat MALPIGHIVS, an arteriae, an fibrae carnae, an nervi essent p. 30.

k *Cavitate in textu*) Haec exigua est in utero non praegnanter, ut enormiter nimiam pinxerit VESALIUS f. 27. & etiam GRAAFIVS nimiam T. VIII. A. T. IX. X. Conpressa nempe ubique inter crassas carnes uteri, semper plana est & minimae capacitatis, cum anterior uteri medietas a posteriori proxime absit. Conf. WINSLOW n. 592. & N. STENONIS iconem ACT. HAFN. II *obs.* 89. Porro inter duas tubas, & super cervicem lata est, in cervice pene nulla, dum femina virgo est. Sed septo quodam, dicebant uterum utcumque in duos sinus dividi, veteres, ut ARISTOTELES *hist. anim.* III. c. 1. & AVCTOR *Ifag. anat.* c. 30 & PHILOTIMVS atque PRAXAGORAS apud GALENUM *de diff. vulv.* c. 3. & GALENVS *de util. part.* L. XIV. c. 4. & AVICENNA CAN. I. III. *fen.* XXI. Tr. I. c. 1. & RHazes *ad Mansor.* l. c. 26. Inter vero recentiores etiam divisum uterum describunt, sutura vel septulo, CARPVS in MVNDINVM CCXVII. CCXVIII. & *Ifag.* p. 22 b. & FER.

menſe nihil niſi ſanguinem, ut totus uterus videatur rubris vafis conſtare, inde iterum con-

Fernelius l. c. c. VII. *Paraeus* p. 106. *Platerus* p. 161. *Laurentius* p. 273. *Pinaeus* p. 132. *C. Baubinus* p. 127. *Mauriceau* p. 41. *Linden. phyſol.* p. 298. *C. Bartholinus* p. 154. *Spigelius* p. 259. *Riolanus* p. 196. 197. *S. Hilaire* p. 720. *Diemerbroeck* p. 137. Ego vero neque ſuturam, neque ſeptum ullum video, uti recte *Columbus* monet p. 241. & *Graaf.* p. 179. Veteres autem forte unice biſulcos uteros ad humanum genus tranſtulerunt, quod omnino probabile eſt, nam *Galenus* caprinum & vaccinum uterum cum muliebri convenire ait *de diſſ. vulv.* c. 3. unde manifeſtum eſt, quod dudum *Veſalius* monuit, p. 669. & *de rad. Chin.* p. 120. *Galenus* uterum muliebrem nunquam ſecuiſſe. *Praxagoram* autem & *Philotimum*, ob hoc ipſum vitium, pridem *Galenus* accusavit. *Hippocrates* denique vel certe auctor l. *περὶ τῶν μαιευτικῶν* manifeſto uterum bicornem deſcribit n. 1. Vel rarum aliquem ſulcum viderunt, uterum ſepto bipertientem, qualem *Riolanus* habet, & *E. N. C. Dec. II. ann.* 5. *obs.* 67. & *Morgagnus Adv.* IV. p. 46. et *Cl. Grauel de ſuperfet. obs.* 5. f. 2. aut medium lacertum cervicis; aut uteros demum rariori caſu ſemiduplices, qualem *Maius* deſcripſit *Comm. Nor.* 1753. h. 25. olimque *Sylvius append. Iſag.* et *I. Baubinus apud Rouſſetum hysterot.* p. 227. et *Littre hiſt. de l'Acad.* 1705. p. 59. In hydropica biſidum majorem, et
mi-

contrahuntur in latitudinem pene nullam.
Maxima arteria uteri non distenti invisibilis

minorem uterum lego in E.N.C. Dec. II. ann. 5. obs. 68. et apud Grauel obs. 1. f. 1. fere similis est. Uterus perfecte divisus Paulin. post E. N. C. Dec. II. ann. V. obs. 108. *Memoir. de l'Acad.* 1705, p. 504. Uteri duo, dexter major, ex *Margarita du Tertre*: alius ex la Marche apud Heisterum de nov. invent. alius in *Aët. Sil. vol. VIII. mant. n. 1.* Vagina duplex et altera pars latior Bartholinus Cent. III. ep. 2. Vagina duplex Comm. Nor. 1733. hebdom. 25.

1 Tubarum) vide DCLXVIII.

m Exigui, in Textu.] Pars ista anatomes uteri difficillima est. Id quidem facile est, superficiem cavitatis uteri superioris super cervicem fere rubellam apparere Graaf. p. 185. Santorin. p. 216. et naturaliter villosam et flocculentam esse Santorin. p. 216. Winslow n. 596. Papillofam video Ruyschium vocasse apud E. R. N. D. L. it. p. 89. Valcula vero lymphatico-nervea vocat Vieussenius p. 17. atque minimas propagines in cavum uteri descendere, inque poris ibi aperiri p. 20. 21. In testudine interna uteri facies adeo evidenter villosa est, ut intestinorum tunicae intimae comparet Taubry de la gener. p. 37. Hos villos esse omnino arterias exhalantes recte Kaauwius n. 1037. 1038. partim vero resorbentes venas, Noortwyck p. 9. in eos ipsos villos productas, & utrumque certum est. Experimenta enim demonstrant, & a venis, & ab arteriis, patulam viam esse

lis est, si cum arteria rubra comparatur :
& haec tamen invisibilis arteria adeo magna
fit

esse in uteri caveam. Nam flatus *Graafio* teste p. 184. *Fantono* p. 199. (ex venis) *Heistero comp. anat.* p. 109. *Pascoli de homine* Ill. p. 61. *Duverney Phil. trans. abr.* Ill. p. 21. & aqua observante *Graafio* p. 184. (sed in puerpera), & *C. Bartholino de siphonis usu*, & *Liftero de humoribus* p. 292. (qui tamen per glandulas uterinas ajunt exire liquorem impulsu vasis hypogastricis), & mercurius *Cassebohm* ap. *Cl. Böhmerum de sit. uter.* p. 21. & in *meth. sec. visc.* p. 34. per arterias & per venas, & cera demum impulsa in vasa hypogastrica viam sibi in uterum aperit (*Bidloo*) & per eos poros exsudat *Winslow* n. 617 Vicissim autem per eos poros aer ab utero in venas redit, *Bartholin. de lacteis dubia* c. 1. p. m 117. & *hist. anat.* 92. *Cent. 1. Heister* l. c. ipsamque placentam per solertissimi *Noortwyckii* experimenta. Habet etiam exiguos istos uteri poros *C. Bartholinus* avus *inst.* p. 154. *C. Bauhinus* p. 127. *Collins* p. 568. *Graaf.* p. 182. *Fitzgerald.* p. 19. *Santorinus* p. 218. *Wepfer de cic.* p. 125. *Peyer. exerc.* p. 76. (in puerpera), *Welsch. Tabb.* 52. *Winslow* n. 596. *Noortwyck* p. 12. *Littre Mem. de l'Acad.* 1702. p. 28r. Per hos poros uteri stillat serosus blandus tenuis liquor *Kaauw* l. c. *Graaf.* l. c. *Collins*, *Peyer* l. c. *Littre* l. c. *Pinaeus* p. 119. subsalsus *Fitzgerald* l. c. & in puerperis ipse sanguis *Littre Mem. de l'Acad.* 1701. p. 28r.
Ruyfch,

fit in utero praegnante, ut initium calami scriptorii admittat.

Emissa.

Ruyfch. obs. 10. Waldschmid. de abortu p. 11. & in menstruatīs Littre l. c. ut tamen apud plerosque aegre distinguas, an istos subtiliores fontes, an cavernularum velint ostia, deque Peyero & C. Bartholino omnino probabile sit, eos ista potius vidisse. Porro in cervice uteri lacunae sunt, inter transversas laminae interpositae, in substantiam uteri demersae, a TREWIO optime depictae Comm. Lit. 1732. p. 284. T. 2. f. 5. quae brevem setam statimve admittunt. Ex iis mucus exprimi potest. Videtur has lacunas dixisse C. Stephanus p. 308. habet etiam Arantius p. 5. Riolanus p. 197. 201. & I. van Horne prodr. p. 15. ubi meatus glandulosos vocat, & Graaf. p. 181. 186. & Verbeyen p. 127. & Cl. Berger p. 455. & Santorinus p. 216. & Fantonus p. 192. & Lieutaud. p. 359. & Pascolus III. p. 60. & Trew l. c. atque Petropolitani Tom III. & Cl. Noortwyck p. 105. In utero aliquae etiam, sed pauciores lacunae adsunt. Has Arantius p. 5. & Malpighius p. 29. & posth. p. 46. & Graafius habet p. 214. Duos Fantonus dixit prope tubos ortos, & per uterum ramosos, p. 193. tum Santorinus p. 216. In ipso demum externo limbo inferiori oris uteri folliculos describit Cl. Noortwyck muciferosque poros p. 7. & pingit T. I. & olim dixit Harderus apiar. p. 10. Corpuscula vero ovorum formicarum forma in utero puerperae T. Bartholinus viderat p. 298. & Collins glandulis uterum, atque

Emissariis) Haec nunquam defunt, et quo magis uterus distenditur, eo majora fiunt,

atque spongiosa substantia, conflare scribit p. 569. Recentiores autem bene multi, glandulas uteri receperunt, a *Littrio* toties nominatas *hist. de l'Acad.* 1720. p. 22 &c. ut a *Welschio Tab. anat.* 52. & *Pascolo* l. c. & prope tubas, sed dubius, aliquas posuit *Santorinus* p. 216. ex brutis vero insert *Tauryus anat. rais.* p. 185. ex rupicapris *Harder. Exerc.* p. 3. & ex vaccis *Id. apiar.* p. 18. *Pechlin. obs.* 21. *Cent.* 1. ex equis *Collins* p. 639. Has glandulas se vidisse credebat in mulier *Douglassus abridgm.* l. c. mucumque secernere docet *Keil. comp. anat.* p. 102. succum vero album chylosum *Preslon Phil. trans. abr.* III. p. 210. Eas autem glandulas, fateor, me vidisse nunquam, neque facile admittere, etsi tuberculosam faciem uteri viderim, (*Vatero* pictam fig. cit. a) quam scriptores videntur pro glandulosa habuisse. Negavit etiam *Meryus*, & omittunt recentissimi.

Deinde primus *Car. Stephanus* anfractuosos & spongiosos canales in substantia feminarum praegnantum vidit *L. Ill. c. 4* p. 295. *Riolanus* inventorem & inventum laudavit p. 185. ut non bene meatus in spongiosa substantia uteri *Johanni van Horne prodr.* p. 15 tribuat *Swammerdam* p. 54. Uterum pluribus tubulis & cuniculis percurri *Lindenius* dixit *phys.* p. 300. & fere similia *Diemberbroeck* p. 140. et *Salzmannus* ex puerpera (*obs. anat.* p. 44.) *Baylius* & *Charletonus* propria etiam experimenta adducunt, & quarto
mense

fiunt; minima in non gravidis, in praegnante utero tam vasta aliquando octavo mense

mense praegnans uterus cavernulis stylum admittentibus plenus describitur in E.N.C. Dec. I. ann. 4. obs. 192. 195. Caecos tubulos ex spongiosa uteri carne *Bobnius* dixit p. 15. *Vieussenius* vocat vasa vesiculoso-lymphatica de nov. invent. p. 12. Sed uberius docuit *Malpighius*, spongiosam illam uteri carnem plenam esse cavernosis sinibus *epist. ad Sponium* p. 30. nulla membrana coercitis, spongiarum ductus referentibus *Vieussens* p. 9. Contraria sententia membranosos vocant T. *Bartholinus* ad *Cass.* p. 149. & *Bayle* de caus. caetamen. p. 23 &c. & *Berger* p. 256. & *CHARLETON* de uteri rheumat. p. 25. & *Monroo* Edimb. soc. II. p. 127. & robustos *Bayle* p. 7. Hi sinus in sectione uteri apparent disiecti *Vater* fig. cit. C. C. C. inaequabili cavitate *Vieussens* p. 4. *Verheyen*. p. 153. Varie ramosi sunt *Malp.* ib. *Vater*, p. 13 - 18. E. N. C. Dec. I. ann. 4. obs. 192. In cavitatem uteri passim aperiuntur *Malp.* ib. obliquis ostiolis *Vater* p. 13. *Santorinus* p. 218. (qui vero nihil praeter eos siphunculos habet) uberius tamen in fundi parte, cui placenta adhaeret *Vater* p. 16. Haec ostia exilissima vocat *Bayle* l. c. sed in puerpera apicem digiti minimi receperunt *Morgagn.* & majora sunt, quam pro arteriarum portione *HORNE* de duct. saliv. II. Magna etiam oscula pingit *Noortwyck* T. I. P. Addunt viri egregii *Vater* fig. b. b. *Vieussens* p. 5 commu-
nicare sinus istos cum vasis uteri *Vater* p. 13.
Mro

menſe viſa ſunt, ut apicem digiti inſertum recipere. Mucoſo humore plena ſunt, & in haec ipſa loca placenta inſeritur.

DCLXV.

Morgagn. IV. p. 48. arteriis nempe E. N. C. Dec. I. ann. 4. obs. 192. *Monroo* l. c. *Vieuffens* p. 58. *Simſon* p. 39 a quibus ſanguinem accipiant, & venulis *Monroo*, *Vieuffens* p. 6. 10. *Simſon* l. c. *Bayle* p. 23. & per eas cavernulas liquidum in uterum deponi, quod truncis vaſorum injeſtum fuerit *Vater* l. c. & forte *Duverney* l. c. viciffim vero vaſa per oſtia cavernularum inflari poſſe *Vater* l. c. E. N. C. Dec. I. ann. 4. obs. 192. 195. ut hae ipſae ſint illae foveolae, ex quibus ſanguis menſtruus exſtillare viſus ſit *Diemerbroeck* p. 140. *Barthol.* p. 155. *Vater* p. 17. *Vieuffens* p. 12 & *Liſterus* forte, quando menſes ex glanduloſis duclibus provenire ait & ex iſdem lochia funduntur *Vater* p. 18. Adparere vero maxime in praegnantibus, cum ibi augeantur *VATER* p. 14. *MONROO* l. c. *SIMSON* p. 75. ad unius & duarum linearum diametrum uſque *LITRE* l. c. *SIMSON* p. 75. *MONROO* l. c. & digiti craſſitiem *ED. SOC.* IV. p. 450. & una molliſſimos fieri *VIEUSSENS* p. 4. in praegnantibus & in menſtruatis *MONROO*, & digitum capere minimum in puerpera *MORGAGN.* l. c. calamumve ſcriptorium *MONROO* p. 128. in praegnante, digitumve *NOORTWYCK.* p. 11. alio tempore arctos eſſe, Mucum naturaliter ſecernere dixit

dixit BOHNIVS, & in iis repertus est
 E.N.C. Dec. I. ann. 4. *obs.* 192. VIEUSSENS
 succum lymphatico lacteum tundere p. 3.
 & liquidum alibile fetus, quod resorbe-
 ant venae umbilici ib. p. 10. Sed VATE-
 RVS in eas ipsas cavernulas vasa ait de-
 generare p. 15. LITTRIVS loco venarum
 esse, Cl MONROVS utero pro arteriis
 esse ideo datas, ne in partu perpetua fieret
 funesta haemorrhagia *Edimb. Soc.* ll.
 p. 240. VIEUSSENIUS autem in eos
 ipsos sinus vasa sua lymphatico ner-
 vea ex superficie uteri inseridicit p. 7. 8.
 Haec uterque peculiaria habet. Ipse etiam
 in prae-gnante muliere vidi sinus illos,
 & replevi cera, ut ex osculis ultima fra-
 gmenta emerent, quae cera non, ut
 in vasis, teres, sed angulosa & multi-
 formis, & frustillata uterum percurrit,
 Non ergo repugno, cellulosa spatiosa in
 utero esse, interposita vasis, in quæ ali-
 quando serosus liquor, aut mucus, ali-
 quando sanguis deponatur, & per poros
 maiores uteri, illos ipsos forte, quos
 superius citavi, in uterum exeat, diver-
 sus tamen a liquore exhalante villorum
 arteriosorum. Has nunc cavernas utique
 in bubulo utero vidit MALPIGHIVS in
epistola ad Sponium, variis in stratis disposi-
 tas *posth.* p. 46. terminatas denique in
 duos magnos ductus, unum utrinque
 p. 26. qui cum utero gravido extensi,
 cubiti longitudine fiant p. 28. & circa
 cornua orti, multis ramulis p. 27. in
 uterum datis *posth.* p. 86. T. XI. f. 5.
 deinde ad cervicem uteri aegre conspicui,
 minores, iterumque in vagina maiores,
 fig. cit. ibique frequenter ramosi, quasi
 glo.

DCLXV.

Virgo) Ita voco feminam, quae incrementi sui terminum adtigit, neque nunc impraegnata est, neque recenter peperit. Vulgo annus decimus sextus pro termino incrementi habetur.

Plus) Ab eo die, quo virgo nata est, cor ejus continuo expandit vasa, & distendit hu-

globulis intercepti p. 27. & appendiculis cæcis ib. tandem uno alterove ductu prope urethram aperiantur. Addebat, ea vasa in vagina mucum, in utero magis terebinthinae similem liquorem continere p. 28. quem habeant a glandulis, propriis ostiolis se in eos ductus exonerantibus p. 27. l. cit. Hos ductus pene certum est, a veteribus productu excretorio, sive vase glanduloso a testibus ad exitum urethrae habitos & descriptos esse, ut a GALENO *de diff. vulv.* c. XI. & ab HEROPHILO, cum sermone cum tubis nescio quomodo confuso *de semine* ll. c. 1. quos renovavit PLAZZONVS p. 142. cujus ductus a LAURENTIANO differt, & C. BAUHINVS p. 116. negat autem VESALIVS p. 668. & *de radice Chin.* p. 124. & CARPVS p. CXCIV. & ad arterias refert *van HORNE* p. 14. 15. Sed in homine sinus omnes in univ-
sum diserte negat RUYSCHIVS, & VATERVM ait vidisse dissectorum vasorum sectiones, & subdubitatur NOORT-
WYCK p. 114. cum quibus neque sen-
tire possum, neque pugnare, sufficien-
tibus destitutus observationibus.

humoribus, sicque fecit, ut totum corpus increverit. Verum nunc pergit agere vis ea, quae distendit vasa, sed corpus non increscit, quia ossa nunc solida sunt, superest, ut vasa in latitudinem magis plena sint, quam ad eum gradum, qui requiritur, ut aperta sustineantur. Sed nunc omni mense pone corpus increvisse una uncia, neque nunc increscere, superest, ut ea uncia superflua in vasis adlit, & nata est plethora^a unciae unius sanguinis, nisi natura eam unciam alicubi excreverit.

Plus

^a PRAECEPTOR vetustam GALENI the-
 riam defendit, qui passim plethoram pro
 causa mensium adducit adversus ERASI-
 STRATUM & *de util. part.* L. XIV. c. 8.
 Eandem hypothefin inter recentiores ac-
 curatius excoluit FREIND in *emmenol.*
 & PITCARNE *de fluxu menstruo*, & tuentur
 BÖHNIIUS p. 219. & KEIL *comp anat.*
 p. 103. & FITZGERALD *diff. de catam.*
 Monspeli habitans, & discipulus Boerhaavii
 GORTERUS *comp. med.* Tr XXXV. &
 KAAUW. *de perspir.* n. 1069. & le FEVRE
physiol. p. 170. & auctor *Comm. in Heist.*
 & CYPRIANUS *epist. ad MILLINGTON*
 p. 43. & DUVERNEY *mem. de l'Acad.*
des sc. 1706. p. 406. tum STAHLIUS,
 cum adsculis p. 389. &c.

Ante pubertatem vasa genitalia minima
 sunt & cordis impetus inpenditur, ut
 arterias totius corporis, cedentes, in
 longitudinem producat. Sed desinant
 arteriae elongari posse, supererit aliquid
 de eo sanguine, quem cor expellit, & id
 ipsum

Plus quam) Uterus haeret in pelvi, ut nullam omnino pressionem patiatur unquam,

ipsum, quod absumebatur in incrementum, nunc alia via oportebit consumi *PITCARNE* p. 154. siue omnino incrementum nullum nunc sit, siue minus, quam pro portione generati sanguinis, posterius autem verius videtur, recte observante *D. SIMSON* p. 53.

Deinde convenit ferri hunc sanguinem imprimis ad uterum, quia arteriae eoductentes debiliores sunt, magisque cedunt communi cordis inpetui, et pro ratione venarum amplissimae sunt *DCLXI. not. a. FREIND* c. 4. tum pro aliarum partium ratione maximae *SIMSON* p. 33. & pondus denique sanguinis per perpendiculares arterias, *PITCARNE* n. 5. in omni fere corporis situ congestionem in uterum determinat *FREIND* c. 4. 5. *KEIL* l. c. *SIMSON* p. 73. Venae vero reducentes uteri & minus distensiles sunt, & ad perpendiculum sanguinem reducunt, & valvulis destituuntur. quae alibi sanguinis circulationem faciliorem reddunt *FREIND* c. V. & minores, pro ratione arteriarum *DCLXI. not. a.* adeoque sanguis & majori copia per arterias advehitur, & minori copia per venas redit, superest, ut in uterum facile congeratur, ibique stagnet. Nullibi certe omnes & majores & minimas arterias ita coacto & gelatinoso sanguine stagnantes reperi, quam in utero, ubi totum vasorum systema sub initia senii

quam, sed liber haereat in amplo spatio.
 Omnes autem aliae in corpore partes pre-
 mun-

plenum albis polypis vidi; sed & GRAAFIUS vasa uteri infarta vidit coacto sanguine p. 200. Porro arteriae uteri serpentino modo flexae sunt DCLXIV. not. e. Has nunc plicas ad retardationem sanguinis valere viderunt BOHNIUS, FREIND, BERGERUS P. 255. 256. HOFMANNUS: alias vero conditiones neglexerunt. Verum ob eas ipsas plicas sanguis, dum has arterias extendit, congestus, producit sinus earum flexuosos, & angulos auget, atque totas arterias reddit longiores, sive quod idem est, profundius in uteri substantiam penetrat. Atque extremitates harum arteriarum aliae in venas terminantur, fortiores & angustiores quam alibi, & rectiores arteriis, & perpendiculares, & destitutas valvulis, ut omnino sanguinem difficiliter revehant. Ergo sanguis in arterias congestus non poterit maiori copia per venas redire, uti majori per arterias advenit.

Sed altera extremitas harum arteriarum patet in cavitatem uteri, per villos exhalantes certius DCLXIV. per sinus pituitosos utcumque minus evidenter ib. not. m. Ergo sanguis harum arteriarum in bivio constitutus, impetum suum majorem, quem venae magis resistentes avertunt, inpendit in arterias exhalantes, easque distendit, uti alibi oculi arteriolas exsanguas, aut tubulos Bellini in haemorrhagiis renalibus solet distendere, donec succedat albus primum mucosus.

muntur. Huc ergo vergit plethora. Verum etiam mammae supra pectoris musculos

cofus liquor, ARISTOTELE iam observante *de gener. anim.* L. II. c. 4. *hist. anim.* VII. c. 1. etiam tenerioribus non infrequens PINAEUS p. 118. ut ipse sexto & octavo anno vidi, tum PECHLINVS *Cent. I. obs.* 34. & E. N. C. *Dec. I. ann.* 9. 10. *obs.* 28. & *ann.* 8. *obs.* 25. & nuper D. FITZGERALD. p. 9. qui aliquid etiam debilitati tribuit villorum exhalantium. Post eum ferofum liquorem liquor stillat lymphaticus, rubellus, qualem in utero feminae menses patientis vidit Cl. FITZGERALD p. 17. alias omnino flavus, nempe ipsum sanguinis serum E. N. C. *Dec. I. ann.* III. *obs.* 115. Denique ipse sensim ruber sanguis per uterum exit. Consentiant omnino ea, quae menses aut augere observantur aut minuere. Augent & praecipitant menses calor regionis DCLXVII. vita lauta otiosa ib. not. a. e. maxime spirituosus potus FITZGERALD p. 59. laetitia & ira, nova venus la MOTTE *obs.* 18. PECHLIN *obs.* 36. *Cent. I. BRESLAV. suppl.* III. p. 113. febris (TERENZONI l. c. p. 302.) pediluvia, vapores utero suppositi, sternutatio E. N. C. *Dec. II. ann.* 5. *obs.* 69. *Dec. III. ann.* 3. *obs.* 32. aliquando ipsa purgantia SANTORIN. n. 25. Haec autem omnia sanguinis ad uterum fluentis velocitatem augent, aut vasa uterina laxant. Minuunt menses contraria, frigus aeris, vita laboriosa DCLXVII. a. terror,

los locantur, sola pinguedine testae & laxa cute, ut nihil sit, quod premat. Cum ergo hae tres corporis humani partes minus resistent, quam reliquum corpus, eo omnis humorum excessus determinatur. Praeterea uterus & mammae^b recipro-

diaeta acida, frigida pedibus admota, quae omnia nempe impetum sanguinis aut minuunt aut averrunt ab utero, Reliqua facilia sunt, cum arteriae minimae ubique magnam habeant rationem ad impetum cordis CCLXI, hinc uti alibi arteriae tumidae, vel diffeclae, ita & in utero, facile, sublata plethora, arteriae in priores redeunt diametros, atque, ut prius, liquorem serosum excernunt.

Hic omnino a FREINDIO recedo, qui rumpi arterias, & cicatricibus claudi admiserat, ignarus legitimae anastomoseos, quem merito correxit HERELIVS.

^b Mammae eo semper tempore elevantur, quo uterus turget. Menses prodeunt puellis, quando ubera duobus digitis elevantur ARISTOTELES *hist. anim.* L. VII. c. 1. Causa dictu non est facillima: sed oportet, siquidem adest effectus, causam eam, quam PRAECEPTOR proposuit, aut solam, aut cum alia conjunctam, veram esse, neque quisquam fere repugnat, vide SIMSON p. 45. &c. Dudum GALENVS non simul posse feminam & lactare & bene menstruari *de util. part.* LXIV. c. 8. Suppressis mensibus mammae lac fuderunt, BERGER *erklär. merckw.*

ei proce consentiunt: quod enim per gestationem ad uterum confluit, id a partu ad mammas vergit; & lac sequitur secundo tertiove die. Quae feminae menses nunc patientur; iis mammae tument: quamprimum menses fluunt, flaccescunt mammae & collabuntur.

Lateralia) Sunt abscissi arteriarum fines, qui per extrema aperta humores suos deponunt, haec in utero contracto aqua replentur, sanguine vero copiosius adfluente majora fiunt, & latiora, & humidiora.

Pubem, inguina, femora) Inde enim vasa ad uterum veniunt^c.

Febri-

merckw. dinge n. 7. & vicissim lac in puerpera per uterum & velicam fluxit, LAURENTIVS L. VII. c. XI. P. 258.

Aliquando tamen menstruantur lactantes FREIND. c. I. CONRING *de lacte*, SIMSON p. 48. SCHENK. E. N. C. Dec. I. ann. 9. 10. *obs.* 9. Sed id ad eximiam plethoram refero.

c *Dolor* &c. signa sunt sanguinis ad uterum vehementius determinati, & vasorum ita distentorum, ut distrahant vicinos nervos, quos notum est plerumque vasa sequi. Deinde tumere mensium tempore uterum cum vasis, testes sunt GALENVS olim *de vulv. diff.* c. 8. & VESALIVS *exam. obs. Fallop.* p. 150. & COLUMBUS p. 174. & HERELIVS contra FREINDIVM p. 9. & VERHEYEN p. 94. & LITTRE *hist. de l'Acad.* 1720. p. 20.

Febricula]^d *virginalis vera*. Inter mille feminas vix una reperitur, quae ante primos menses non febricitet, & haec tamen, quae

Hinc vulgo nota eo tempore ad venerem proclivitas, etiam anatomico experimento confirmata, cum RIEDLINUS turgentem in menstruata clitoridem viderit. Pubertatis vero tempore vehementer sanguinem versus genitales partes in utroque sexu determinari, & vasa dilatare supra priorem diametrum, facile demonstratur, tum a pube in utroque sexu eo demum tempore erumpente, tum a femine in maribus primum secreto, denique anatomico experimento. Constat enim arterias ubique in corpore humano facillime in fetu repleri, in organis vero genitalibus solis, ante pubertatem, vasa & minima esse & ceram aegerime admittere, neque unquam, vel ad tolerabilem elegantiam repleri. nisi ubi prius ipsa per aetatem natura collapsa, & solis tenuissimis liquidis pervia vasa dilatavit. Si vero tumorem uteri menses fundentis non vidit VALVERDVS p. 199. & DIEMERBROECK p. 141. & GRAAFIUS p. 199. raritati occasionum, & subjeetorum forte vitio tribui potest, nimis enim analogus est tumor in vasis gravidarum, quam ut recedere velimus a GALENI & VESALII experimentis.

- d Febriculam demonstrant capitis dolor, pustulae virginibus molestae FREIND. c. 11X.
E. N. C. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 233.

quae non febricitat, lassitudinem in toto corpore percipiet.

Dilatantur) Plethora vasa dilatat, humores rarefacit, inde color ruber intenditur, accedunt pulsus fortiores, calores, vera febricula. Sed id uterus peculiare habet, ut arteriae uteri ex minimis possint maximae fieri, & ex maximis minimae. Nempe arteria in utero continuatur equidem venae sibi respondentis, antequam vero in venam abeat, effundit humorem sanguine tenuiorem

SCHURIG. *parth.* p. 214. ex variis, & frequentes tonsillarum inflammationes
WIEDEMAN. *de tonsill.* p. 20.

e Errorem loci perfecte ex PRAECEPTORE repetit p. 26. tum ALLEN *synops. med.* c. 14. n. 7. & pridem, sed non ita luculenter, PITCARNE p. 152. atque CYPRIANUS p. 43.

f *Mensem, in Textu.*] Prisci fere lunam pro causa periodi advocarunt, ut nodum DEA solveret. ARISTOTELEM vide *de gener. anim.* L. IV. c. 2. & GALENUM *de diebus decretoriis* c. 11. Inter recentiores menses lunae etiam tribuit CRAANEN *Oeconom.* p. 716. Sed facile adparuit considerantibus, nullam esse phasin lunae, in qua feminae menses non pantantur LISTER. *de humor.* p. 424. 425. BERGER. p. 250. neque plenam aut novam lunam hic aliquid a plebejis diebus habere praecipui, sed unice revolutos 28 dies sanguinem sequi. Confer BOHN. p. 228. la MOTTE L. I. c. 12. JUNCCKER *tab. phys.* p. 338. STAHL. p. 356.

rem in vas laterale, quod ante venam ex arteria oritur. Pone nunc arteriam intumescere, eadem certe causa etiam vas laterale distendet, dilatabit sensim ejus ostium, donec ultimo adeo ampliter hiet, ut ipsum sanguinem recipiat. Tunc nascitur in utero levior inflammatio; & pergente semper agere causa urgente sanguinem in vasa lateralia, ita tandem expandetur etiam extremum vas laterale, ut totum in arteriam san-

p. 356. qui aliquid tamen, ut erat in astra benignior, noviluniis & pleniluniis tribuebat p. 386. decrescenti vero lunae favebat ARISTOTELES *hist. anim.* L. VII. c. 2. Mihi vero absque luna res non videtur ita difficilis. Post primum fluxum mensium, determinata diuturnitas nixus sanguinis requiritur, donec vasa uteri inflexa extendantur, finesque resolvantur, & hanc videtur esse rationem constantiae periodi. Quare vero hic nixus intra 27. potius quam quadraginta dies vasa uteri resolvat, ratio reddi non debet, & ne quidem peti, nisi quis velit etiam rationem petere, quare nono mense homo, alio mense alia animalia pariant; & quare cerasa sex septimanis post florem, poma quatuor mensibus, castaneae etiam pluribus maturentur. Ipsa ratio periodi est in proportionem virium expandentium ad vires resistentes: uti horologii definita periodus rationem suam habet, in ponderis ad volvendas rotas resistentes ratione. Ipsos numeros proportionis effectus docet, ratio vero in tota fabrica latet. Quando vero nunc prima
vice

fanguineam mutetur. Sed finis hujus vasis lateralis patet in uteri caveam, eo ergo sanguis exstillabit, & fimillima in utero haemorrhagia fiet, qualis in puero fit, cui narium arteria dilatata fuit.

Exit) Quando vero vasa lateralia sanguine se depleverunt in uterum, tunc connivent, & prior utero figura redit. Hac simplicissima ratione totum negotium peragitur, absque imaginario fermento, ex sola ple-

vice post mensem regenerata est plethora, debebit, si mulier sana fuerit, omni mense redire, cum eadem causae intra idem tempus debeant eundem reducere effectum FREIND c. VII. Caeterum, neque id dissimulandum est, hanc periodum non adeo regularem esse, & longe plurimas feminarum periodos vicinas menstruis experiri, dies autem certamve regulam non sequi SANTORINUS n. 9.

g Recentiores passim viderunt systema plethorae quibusdam obnoxium esse difficultatibus. Nam etiam inedia confectae, tabidae, debiles, & exsanguines virgines menses saepe patiuntur. *Diemerbroeck* p. 141. *Charleton* p. 37. *Verheyen* II p. 95. *Schurig. parthenol.* p. 39. *Stahl.* p. 388. & *Acutissimi ingenii Vir P. G. Werlhof de febr.* p. 300. Porro feminae etiam robustissimae, durisque exercitae laboribus, menses saepe copiosos patiuntur *Bayle* p. 6. Sed objiciunt etiam venae sectionem neque retardare menses, neque necessitatem evacuationis tollere. Iterum perspiratio absque ullo majori malo augeri

plethora. Hac nunc plethora liberatur corpus muliebre, non majori, quando primi

augeri observatur & minui per *Keilii* observationes, hinc neque sanguinis abundantiae noxas evidentes esse deducit *Simson* p. 9. *Illustris* denique *Werlhofius* ingeniosissimo argumento usus est, feminas nempe, a quibus menses diu absint, tamen menstrui periodi tempore varios nixus & molimina experiri, quae periodo illa elapsa evanescunt, cum tamen nihil de plethora decesserit *de febrib.* p. 300. **HERELIUS** praeterea menses in gravida abesse observat. neque tamen fetum libram illam menstruam, aut duas, nam ita citat, libras **FREINDII** absumere, **IDEMQUE** vasa potius ex plethora intumescere & sanguinem retinere turgida aequum credit, uti in gravidis fieri solet p. 22. quam dimittere libera.

Hae difficultates fecerunt, ut praeterito chemico illo seculo passim fermenta & effervescentiae advocatae sint, ut ratio redderetur effusionis menstruae: colligi nempe acre aliquid, et in aliqua parte genitalium muliebrium residere, et paulatim auctum, tandem quocunque modo irritare uterum et distendere. Hoc fermentum alii alibi quaesiverunt. In universum **GRAAFIUS** p. 200. seqq. fermentis favet, et **BAYLE** toto libello, **COLLINS** p. 577. et parum diversus a **BAYLIO** **CHARLETONUS**, etsi fermenti nomen longe refutet p. 68. seqq. plethoram enim succi alibilis pro fervoris uterini causa adlegat p. 119. qui retentus accef-

cat

mi menses stillant, quam paucarum guttularum stillicidio, ut maculae aliquae in vestibus

scat p. 120. et ipse adeo huc recensendus. Porro et TERENZONUS *igniculos* huc advocat GIORN de LETT. XXIX. art. 19. ex quibus in feminis fervorem ad venerem deducit p. 119. Sed et VIEUSSENIUS similia sentit *nov. syst.* p. 11. et VERHEYENIUS, cujus fermentum circa extrema vasa in substantia uteri residet L. II. p. 96. Hi fere omnes causam mensium quaesiverunt in sinibus uteri cavernosis, ubi aliquis liquor excrementitius stagneret CHARLETON. 117. eosque distenderet BAYLE p. 20. TAUVRY semen muliebri acre factum adducit *anat. rais.* p. 189. et WENCK in E. N. C. Dec. III. ann. 4. *app.* non valde a GALENO remoti, qui dudum humorem uteri serosum mordacem fieri aestumque facere dixerat *de util. part.* L. XIV. c. 9. SANTORINUS, non repudiata plethora, in prostaticis femininis et veneri stimuli et mensium causam posuit *de catamen.* n. 61. liquorem nempe acrem qui vaginam irriteret n. 19. Sed etiam GANDOLPHE fermentum admittit, *hist. de l'Acad.* 1707. n. 9. et I. DRACIUS bilem singulis mensibus ex vesicula effluere, stimulumque in utero mirabilem efficere, e conjectura proposuit *anthrop.* L. I. c. 23. MORGANUS, si diis placet, serum excrementitium glandularum omnium, maxime vero cellulosa, quae renes uterum et ovaria ambeat, hac via excerni credit *mech. pract.*
of

flibus adpareant. Sed intra mensem, par
priori plethorae renascitur plethora, vel
etiam

of. phys. p. 246. cum nullibi certe, quam
circa uterum, minus sit cellulosae fabricae.
Sed anatome tota abhorret ab his acrimo-
niis, & ova & vesiculas Nabothi & uteri
succos omnes mucosos & blandos in omni
aetate omnique tempore reperit, semine
virili manifesto blandiores, cum retenta
nullum odorem carnibus tribuant, neque
urgeant barbam, & ipse sanguis men-
struus mitis est DCLXVII. SANTORINI
demum prostaticum liquorem multae fe-
minae aut maritatae, aut levioris animi,
abunde excernunt, nullam inde passae
mensium diminutionem; totaque denique
repugnat corporis oeconomia, cum in-
flammationes pleuriticae, ophthalmiae,
haemorrhagiae narium, sanguinis per re-
nes effusiones CCCLXXXIII. ab impactu,
absque acrimonia fieri videamus, omnia
vero, quae ab acri liquore sunt, sangui-
nis profluvia, vix sanabilia reperiamus, ar-
gumento a scorbuto, a bile atra, a ve-
nenis deducto. Sed inpedito etiam utero
haec acrimonia non erodit uterum, uti
necesse videtur, collecto & exasperato
fermento. Verum sanguinem menstruum
retentum videmus, uti a plethora exspe-
ctari potest, infartis jam arteriis uteri &
ita resistentibus, ut sanguinem innitentem
repellant, aliorum niti, ibique aut me-
chanice vasa rumpere, aut dilatare absque
ulla erosione earum partium, per quas
viam sibi aperuit, DCLXVII. not. *b. seqq.*
Sed in tabidis utique, si menses adfuerint,

etiam major, & vasa uteri, quae semel se dilatari sunt passa, facilius nunc dilatantur, atque

non difficilis, neque e longinquo petita exculatio est, quando sufficere dicimus, si in utero vasorum renixus debilior fuerit inpetu innitentis sanguinis. Plethora adeo, multum imminuta, menses tamen faciet, si cum sanguinis copia vis contractilis uteri pariter debilitata fuerit. Verum certum est, frequenter menses abesse a tabidis, et post morbos diuturnos menses lente recurrere *Freind. c. 1.* plethoricis autem, et macilentis, uberiores fluere. Lentiores etiam bimestresve periodi fiunt ad annum quinquagesimum 1 D. c. VII, cum magis resistant vasa, et longiori cordis nixu superentur. Exercitatae vero rusticae menses parciore experiuntur *Freind. c. VII.* ipso fatente *Herelio* p. 18. 19. ut vix una die, vix unius unciae pondere sanguinem amittant, non raro denique destituantur mensibus *Freind. c. III* uti neminem video, qui neget, lautis et otiosis copiosiores esse, atque celerius, et bis aliquando intra mensem redire. Vidi etiam puellas, quibus duodecimo anno mensium indicia adparuerant, choreis et frequentibus sudoribus excretionem sanguinis ita repulisse, ut post duos demum annos redierint. Venae sectionem autem mentes non retardare, vix crediderim, si major. si propior periodo imminenti, si in minus plethorica fuerit. Certe *Ta-puyae* feminae tempore pubertatis incisio- nibus filias suas per femora lacerant, ita

atque, cum renascente adeo plethora, etiam eadem sed mitiora symptomata redeunt, & uberius

a mensium periculo liberant, ut per totam vitam nullos patiantur LERY *in itin Bras.* p. 302. & I. von STADEN. et notissimum est, abortus periculum averti, lochia mensesque fluentes vena secta suppressi, ipsamque mensium necessitatem repetita venae sectione tolli FREIND. c. 7. 8. In feminis anno 45. venae sectionem largiorem saepe necessitatem mensium subito auferre, STAHLIUS ipse auctor est p. 387. Si vero levis sanguinis jactura, et longe ante proximam periodum, et in bene cibos digerente muliere fuerit, non mirum est, menses inde nihil retardari. Nam sanguinis copia, post aliquot a venae sectione dies, etiam major est QUESNAY *de la saignée* p. 366. et libram sanguinis intra 5 dies restitui observat BODARTUS *in hist. Acad. Reg.* p. 167. Perspirationis noxas avertit saepe succedanea diarrhoea, aut mictio uberior: sanguinem in uterum congestum, non alia via ex corpore, et imprimis ex uteri vasis, educi posse, facile est visu. Aliquando tamen salivationem, aut diarrhoeam (E, N, C. *Dec. II. ann. 10. obs. 193.*) mensium vice fuisse legimus FREIND c. IX. Neque uterus continuo, aut semper levabitur, si plethoram de reliquo corpore deleveris: poterit enim in tactus semel manere sanguis, et densari in vasis uterinis, uti saepe inflammatorias obstructions nulla tollit venae sectio. Neque vasa, quod vult Cl. HERELIUS, supra certum gradum

uberius stillicidium menstruum renascitur: Quam primum vero plethora abest, etiam menses sponte evanescent, & una fecunditas

gradum dilatari, mensesque retinere possunt, uti possunt in gravidis, quando oscula eorum excretoria oppositae radicularae, placentae obferciunt. Illae demum, quas ILL. WERLHOFIUS excitat, historiae, puto, rarae sunt, et referri possunt partim ad vires consuetudinis, cum etiam ipse appetitus post horam prandii absque cibo evanescat; & sanguis praeterea per ea ipsa, quae citantur, molimina, in quibusdam feminis, ex uteri vasis in venosum systema portarum expediri poterit.

CL. SIMSONUS omnino parum a nobis abest: Etsi enim plethoram repudiat, tamen ait incrementum uteri menses facere, quia sanguis sensim sibi viam in sinus facit p. 31. donec, sed post longos nixus, eos sinus ita dilatet, ut eo penetret p. 34. 64. tunc effusum sanguinem docet distendere sinus, sic vicinas arterias comprimere, circulationem sanguinis retardare, dolores facere etc. p. 40. donec per sinuum oscula effluat, inde vero laxari compressa vasa, et circulationis libertatem restitui etc. Sed vir Clar. errorem profundamento posuit hypotheseos, tunc nempe incrementum desinere, quando adeo lata sint vasa, ut facillima sit circulatio p. 26. cum certum sit, solis exceptis genitalibus, in fetu plurima, et facillime distensilia vasa esse, et maximam impetus fluidorum rationem ad solidorum resistantiam, cum aetate autem plurima

ditas, anno aetatis 45. ^h vel quinquagesimo.

Tempore) Feminae dantur, in quibus menses ad horologium redeunt, adeo accurate observant tempora. In aliis incertiora sunt tempora, uti variae circumstantiae exegerint, & diversa vitae ratio. Neque adeo

perire, & ubique resistentiam vasorum contra impulsum liquidorum augeri
WINTRINGHAM *inquiry* p. 92.
106.

^h Plerumque; nam exempla, quae nolo cumulare, exstant feminarum, quae in aetate longe seriori menses passae sunt, & compilationem vide apud BRESLAVIENSES. Ita menses anno 55. adhuc fluentes vidit la MOTTE L. III. c. 9. Anno 60. BRESL. 1719. *Obf.* p. 494. 1722. m. *Jan.* 1724. m. *April.* Anno 63. BRESL. 1724. M. *Jan.* Anno septuagesimo FRANC. *Sat.* VI. p. 96. 98. *Phil. tr. abridg.* IV. p. 122. Anno 73. ID. Anno 77. T. BARTHOL. *hist.* 34. *Cent.* VI. Anno 78. HILDANVS *Cent.* II. *obs.* 60. 61. Anno 80. L. BOURGEOIS L. II. p. 24. HILD. *obs.* 63. *Cent.* IV. Anno 82. LANZONVS *anim.* 33. Anno 85. KERKRING. *obs.* 88. Anno 88. BRESL. 1719. l. c. Anno 89. FRANCVS l. c. Anno 90. BARTHOLINVS *hist.* 90. 91. *Cent.* III. Anno 92. HAGEDORN, Anno 100. BLANCAARD Anno 102. SOLENDER apud SCHENKIU: & in variis decrepitis CARPVS p. CCXXX. Non tamen dissimulandum est, plerumque hos menses morbosos esse MAN-

adeo mirabile videtur, si secundum certam regulam menses redierint. Nam etiam virili corpori per artem menstruam plethoram conciliare novi. Aliquando homines ex capite dolent, medicus jubet sanguinem mitti, levantur; sed post quatuor forte septimanas malum redit. Sanguis determinatur iterum ad capitis arterias, & dolorem facit, qui repetitae venae sectioni iterum cedit, quam EGO quidem non valde probo. Verum repullulat vivax malum post duos menses, & repetita venae sectione denique plethora ita ad caput determinatur, ut statim redeat vicibus, nisi malum radicitus extirpatum fuerit. Hic Leidae mercator vivit, vir honestusⁱ, cui sanguis omni mense per arteriam haemorrhoidalem majori copia, quam

NINGHAMO monente p. 45. uti lethalia sunt exempla la MOTTII, & BRESLAVIENSIVM 1729. M. Oct. & 1724. M. Apr.

i Cont. CXIII. Menses viriles haemorrhoidarios MARCELLVS habet, ex AMATO, VESALIO p. m. 411. & RODER. a *Castr.* in *praef.* tum E. N. C. Dec. I: ann. 2. *obs.* 192. an. 3. *obs.* 108. ann. 4. *obs.* 44. 45. 69. Dec. II. ann. 1. *obs.* 70, & magnam compilationem dat SCHURIGIVS *Parthenol.* S. II. c. 4. Menses juvenis per virgiam fluentes STALPART *van der Wiel Cent.* 1. *obs.* 30. E. N. C. Dec. III. ann. 9. *obs.* 136. SCHURIG I. c. S. II. c. 4. & bis se vidisse testatur ALLEN I. c. n. 9. Menses in juvene per vomitum exiisse

quam ulli sanissimae feminae per uterum, fuit, nempe ad integram libram, & observat periodos ad horam. Hac eadem ratione viros quoscunque liceret effeminare. Hibernus erat, cujus historia in actis Britannicis legitur, cui certissimus quovis mente morbus imminebat, nisi sanguis per apicem minimi digiti ^k efflueret: post mensem redibat idem fluxus, neque ullum in cute vestigium relinquebat viarum, per quas sanguis prodissset. Cum hunc fluxum tentarent siccare medicamentis, in morbum incidit gravissimum. Adparet adeo, corpus humanum, quando aliquoties per eandem viam sanguine se deplevit, consuetudinem indui, qua fiat, ut statis temporibus eadem pars sanguine obruatur. Quo plus sanguinis fuerit, quod effunditur, eo plus etiam in eandem partem redibit, si sanitas integra manserit & bona chyli viscera. **LISTERUS** ^l narrat de lanionibus Londinensibus, eos vitulos reddere pinguiissimos mittendo sanguinem, deinde corpora replendo lacte, sic plethora generatur sanguinis non rubri.

Eadem caussa plethoram & ad uteri, & ad mammarum vasa determinat. Si alia autem pars fuerit, ad quam sanguis effluere consuevit, tunc quidem non ultra
per

BARTHOLINVS testis est, *obs.* 33.

Cent. V. Ex cute in viro **RENIVEN.**

C. 4. Menses virorum ex digito, urina, alvo collegit **SCHVRIGIUS** ib.

^k *Cont.* DCLXVII.

^l *De humor.* p. 450.

per uterum manabit. Triennium est (1724.) quod Amstelodami virgo in orphanotrophio vixit, cui omni mense ex cute capitis sanguis exsudavit, spectaculo ita celebri, ut mille homines supersint, qui viderunt cominus.

Vaginam) Non negaverim, & potest eo sanguis vergere, uti sunt, quibus per nares, aut aures, aut os denique effunditur ^m.

^m Ab omni tempore quaesitum est, num per uterum, num per vaginam potius menses effluent. Pro vagina pugnarunt rationibus variis, a magnitudine (sed imaginaria) vasorum cervicis, & uterinorum exilitate PLAZZONVS p. 122. ab angustia uteri virginici SANTORINVS l. c. n. 3. a sanguinis menstrui fluida natura, quem uterus coactum fundat VESALIUS p. 662. a mensibus gravidarum sano fetu fluentibus, cum os in gravidis clausum sit ARANTIVS *de fetu* p. 8. STALPART *van der Wiel Cent. 1. obs. 76.* PLAZZONUS p. 122. HILDANUS *Cent. V. obs. 41.* ZOD. GALL. ll p. 141. BARTHOLIN. *hist. 13. Cent. IV.* SCHURIG. *parthenol. p. 148, 204.* SIEGMUNDIN p. 238. TREW. *Comm. lit. 1738. hebd. 9.* la MOTTE *obs. 25.* quas observationes mire confirmare videtur la MOTTII experimentum, haemorrhagiae, quae in grvida manifesto per vaginam fiebat *obs. 209.* Experimenta porro habent ZACUTUS (quem testem citat SCHURIG. *parthenol. l. II. c. 3.*) & COLUMBUS p. 174.

PINAEVS P. 130. CAR. PISO *de coll. fer.*
 S. II. P. II. p. m. 159. BOHN P. 217.
 BERGER P. 257. LANZONVS *anim.*
 33. GOUVEY *ex edit. Camer.* p. 75.
 qui omnes negant in utero mentes pati-
 entium fuisse sanguinem, aliqui etiam,
 ut ZACUTVS, ex labiis vulvae menses
 viderunt stillare. Ita TERNZONUS
de morb. uteri in scabiosa mentibus sup-
 pressis etiam vaginam scabiosam in-
 venit GIORN. de LETT. XXIX.
 P. 355

Alii ex utero pariter & ex vagina
 fluere malunt, ut PLAZZONUS P. 122.
 HIGHMOR. P. 100. FREIND C. V.
 HOFMANN. *med. syst.* P. 229. COL-
 LINS P. 576. MAURICEAU *obs.* 49.
 P. 93. VERHEYEN. VATER. *de utero*
grav. P. 5. STAHL. P. 391. ut tamen
 MAURICEAU, COLLINS & VATER
 & STAHL. plus tribuerent utero,
 PLAZZONVS & HOFMANNUS
 vaginae.

Sed facile ipsa fabrica partium demon-
 strat, uterum naturale organum esse
 hujus secretionis, neque adeo ab HIP-
 POCRATICA doctrina recedi debere,
 qui *περὶ γυναικείων α.* menses ubique
 utero tribuit. Uterus enim, & quidem
 fundus uteri, villosus est & arteriis ex-
 halantibus scatet DCLXIV. vagina vero
 villis omnino destituitur, quos non pati-
 tur adesse attritus necessitas, & membra-
 nam duram habet, & cartilagineam
 DIONIS *des accouch.* P. 166. sed arteria-
 rum etiam majores trunci ad uterum
 veniunt, rami ad vaginam CHARLETON.
 P. 21. Glandulae vero vaginae a multis
 dictae,

dictae, paucis visae sunt. Lacunas enim nihil hic posse manifestum est, sive urethrae illas velis, satis incommode prostaticarum nomine appellatas, & minime regulariter binas MORGAGN. *adv.* IV. p. 4+. 45. quarum ostia pinxit MORGAGNUS *adv.* I. T. III. ** & descripsit p. 36. & olim vidit RIOLANUS p. 198. sive de vicinis lacunis urethrae dicas, inferius utrinque inter nymphas, & papillares cuticulas ex urethra descendentes, positas, tres, quatuor aut quinque, quales habet MORGAGNUS l. c. sed minores, & videtur DUVERNEYUS detexisse apud PEYERUM *exerc.* p. 148. lacunas autem vocasse PLAZZONUM *de part. genit.* L. II. c. 6. & ex eo RHODIVM *mantiss.* n. 53. atque LINDENIVM *phys.* p. 332. sive demum intelligas minutos illos novosque sinulos, qui corpori clitoridis respondent, anteriores, inferiores, & a glande eius ad urethram in recta fere modicecava linea descendentes, qualem unicum MORGAGNUS dixit l. c. & forte GARENGEOTVS *Splanchn.* II. p. 57.

Glandulas autem vaginae alii pro fonte mensium habent BRESL. 1721. p. 81. seqq. Verum ego maculas quidem vidi non raro, sed absque depressione, vel sinus. Glandulas autem vaginae a DUVERNEYO dictas PEYER *exerc.* p. 97. & COLLINS p. 564. & E. N. C. Dec. II. ann. IX. *obs.* 224. & VERHEYENIO p. 146. T. 17. f. 2. a VERCELLONO adoptatas *de pudendagr.* p. 16. & CL. DIONIS *des accouch.* & ASTRUCIO *de lue venerea* p. 153. & a RAVIO propositas

fitas apud VALENT. *zoot.* II. p. 65. & a CHESELDENIO p. 274. nunquam vidi, & refutavit MORGAGNUS *adv.* IV. p. 45. brutis nempe concessas, non homini, ut simiae E. N. C. *Dec.* II. an. I. *obs.* 61. sui RAI *synops. quadrup.* p. 95. aliisque. Poros vero C. BARTHOLINI *de ovar.* p. 27 HARTMANNI, MALPIGHII *posth.* p. 46. GRAAFII p. 171. 214 VERHEYENI p. 133. aut sinus potius EVSTACHII T. XLV. f. 3. 4. & FANTONI p. 192. 198. omnino aliquoties reperi, sed muciferos.

Verum experimenta praeterea pro utero & a pluribus, & in universum a maioribus viris capta consentiunt
 Ut enim nihil tribuas capitibus illis venarum in uterum insertis DIOCLIS, PRAXAGORAE, PHILOTIMI, GALENI *de diff. vulv.* sub finem, CARPI p. CGXV. *Isag.* p. 22. PLAZZONI p. 121. quae aiebant emulgentium aequalia fieri in praegnantibus, C. BAVHIN. p. 124. vasisve in cervicem uteri apertis PINAEI p. 226 arteriis denique patentibus VESALII p. 657. poros certe uteri nemo negat, quos ex Bartholinis, Graafio, Wepfero, Peyero, Welschio, Fitzgeraldo, Santorino, Winslowo, Mauriceau p. 42, supra excitavi, & sanguinem viderunt stillare in puerperis WALDSCHMID. RUYSCH. LITTRE &c. In menstruatibus autem, quod rem nostram demonstrat, omnino maculae in utero sanguinem stillantes visae sunt a LITTRIO *Mem. de l'Acad.* p. 171, p. 281. *Hist. de l'Acad.* 1720, p. 22. MORGAGNO *Adv.* I. p. 39. T. III. *Adv.* IV. p. 48. SANTORINO apud

apud MORGAGNUM *Adv.* IV. VERHEYENIO II. p. 94. MAURICEAV *obs.* 49. & *prat. des accouch.* p. 48 SCHVLZIO *Comm. Neric.* 1731. *spec. 5.* VIEVSSENIO *nov. syst. vas.* p. 20. 21. FITZGERALDIO p. 17. HEISTERO *not.* 32. HERELIO l. c. p. 9. Ex ostio uteri stillantes menstrui sanguinis guttas viderunt VESALIUS p. 664. la MOTTE *obs.* 21. PYRMAN. *Chir. cur.* II. p. 486. LITRE *hist de l'Acad* 1720. p. 20. *memoir.* 1702. p. 282. MAURICEAV *obs.* 96. 322. E. N. C. *Cent. V.* *obs.* 24. In vagina vero, nihil simile vidit LITTRIVS, et MORGAGNVS, et iste quidem in solo fundo neque ipsa cervice uteri, maculas istas vidit, consentiente la MOTTE *des accouch.* l. c. 12. Porro uterum in mensium suppressione atro sanguine plenum vidit BLANCARD. *anat. pract.* p. 133. & COLLINS p. 579, et olim MARCELLVS DONATVS p. 455. mensesque per tubas erumpentes RVYSCH. *Thes.* III. p. 25. *conf. obs.* 85. atque stillantem ex cicatrice operationis caesareae menstruum sanguinem la MOTTE l. c. *obs.* 339. Gravidarum vero menses vel ex oris uteri circumferentia externa fluere possunt la MOTTE p. 129. l. c. vel per ipsum os uteri, non adeo perpetuo clausum, vel per vaginam, sed praeter naturae legem GRAAF. p. 198.

Saecpissime enim ii menses nocent HIPPOCRATE teste et ARISTOTELE *de gener. anim.* L. IV. c. 5. E. N. C. *Dec.* II. *ann.* I. *obs.* 110. BVCHNERO *in miscellan.* etc. ut tamen ideo non negem, posse in plethoricis E. N. C. *Dec.* I.

DCLXVI.

Communicant) * Post RIOLANVM
NUCKIVS repletis vasis reperit, omnino has
ana-

ann. 6. 7. obs. 63. ROUSSET. S. VI. p. 153. absque magno malo menses fluere. Has nunc uteri maculas, quas cum MOR-GAGNO vidi, analogia demonstrat esse stipata oscula arteriarum exhalantium, per venas enim excerni, ut C. *Bauhinus* p. 27. *Higbmorus* p. 100. & *Bohnius* p. 225 & pariter ex venis & arteriis *Pitcarne* p. 182, id quidem officio venarum manifesto repugnat. Recte haec *Santorinus* l. c. n. 4.

a Arteriae mammariae aliae internae sunt, aliae externae.

Illae oriuntur utrinque ex subclavia, ubi sursum prodit thyreoidea inferior, sursum et posterius vertebralis, deorsum et posterius intercostalis superior, supra terminatum ibi caecumque pleurae saccu. Inde descendit inter pleuram costasque cartilagineas, maxima parte musculis nuda, fere ad perpendiculum, exit inter extremum sternum et costarum marginem cartilagineum, descendit inter rectum abdominis musculum atque peritoneum, et paulo supra umbilicum flectitur introrsum ad lineam albam, ibique ramosa evanescit.

Praeter alios ramos, minime hic enumerandos thymicam, mediastinas *Walther de vasis vert.* pericardiacam lateralem, et interiorē majorem, et pericardio diaphragmaticam, et bronchialem ipsam, quam aliquando edit, et majorem

anastomoses vere adesse. Ob istam anastomosis, & ob similem in mamma is laxitatem fit celebris ille uteri cum mamma consensus. Quo enim semel natura viam sibi

rem inferiorem diaphragmaticam, ramos minores per intervalla costarum exeuntes, ad intercostales, claviculam, sternum, costasque *Ruyfch. Ep. II. f. 2, 3* ramum magnum cutaneum, quem edit, ubi sternum finitur, et alium lateraliter divergentem secundum costarum marginem *EUST.* forte *T. XXVII. f. 12*, aliosque cuti et obliquo externo datos; praeter inquam istos, principe loco hic memorandum exhibet ex intervallo secundae tertiaeque costae, alias inferius (inter 4. et 5. *C. Bauhinus p. 120. Cl. GUNZ de mamma p. 20.* trans pectoralem ad mammae pinguedinem. uti recte *Fallopins obs. p. 127.* & glandulam *Lientaud* furculisque ad papillam exeuntem *Gunz l. c.* Ex ultimo vero inflexu trunculi, per ipsam recti muscoli carnem duos ramos dat, qui cum totidem epigastricae ramis saepe communicant,, *Eustach. T. XXVII f. 12.* quem vide, *Casser. L. IV. T. XI Fallop p. 127. Winslow L. III. tr. de arter. n. 90. tr. des Veines n. 60.*

Vena mammaria sola origine differt, quae in dextra ex trunco cavae est, ubi findi incipit *Eustach. T. XXV. XXVII. Winslow III tr. des vein. n. 60.* in sinistra ex subclavia *Winslow l. c. Eust l. c.*

Mammaria autem arteria externa, quam recte distinguit *Vesalius p. 677.* et *D.*
de

sibi aperuit, eo perpetuo redit, ut quasi per consuetudinem omni mense sanguinem per loca genitalia excernere cogatur. Hinc fit

de *Marchettis* p. 61. & alii, una vel plures, oritur ex subclavia, ubi sub clavicula est, retro Deltoideum, datque alios ramos musculis, uno vero ante pectoralem descendit ad mammas, maxime vero ad pinguedinem cutemque *LIEUTAUD.* l. c. *GUNZ.* l. c. non absque aliquibus cum interna anastomosibus *GUNZ.* l. c. Hic ramus mihi perinde, ut *CABROLIO obs.* 7. major videtur, quam internae rami. Per istas feminae, lac sibi super axillas ad mammas sentiunt attrahi *STAHLIO* teste p. 366. Venam comitem *VESALIUS* pinxit p. 451. ic. P. & dixit p. 677. & ipsam longissimo trunculo sub cute cum epigastricae ramo exteriori communicantem. Haec ea est, quam *FALLOPIUS* a thyreoidea vena plerumque prodire vult p. 122. Epigastrica denique arteria ex Iliaca externa oritur, proxime prius, quam retro ligamentum pubis trans-eat *Casser.* L. VIII. T. 3. *Winsl. Tr. des art.* n. 133. conf. *Eust.* T. XXVII. f. 12. & alibi. Inde trunco suo ante peritoneum, retro rectum abdominis musculum, adscendit *Winslow III. tr. des vein.* n. 171. & super umbilicum cum mammariae ultimis ramulis coit *Eustachius* l. c. *Casserius* L. IV. T. XI. *Winsl.* l. c. *des vein.* n. 171. *des art.* n. 234. *Riolanus* (de vena) p. 176. Reliqui rami in musculos abdominis & cutem inpenduntur, maxime vero notari meretur ramus exterior

fit, ut in neutrum horum vasorum, uterinorum aut mammariorum, vis sanguinis venire possit, quin simul in alterum pariter ingruat. Inde omni feminae, quinque ante

terior, qui longe saepe inter obliquum descendentem & cutem adscendit, quemque vidi pariter, sed alio loco, cum mammaria communicasse.

Recte adeo egerunt, qui communicare dixerunt has arterias, ut *Galenus de diff. venar. & art. c. 8. Carpus in Isag. p. 5. & 36. (sed ex aliis), Fallopius l. c. Eust. l. c. Pareus op. p. 119. Vidus p. 290. Pinatus p. 196, C. Bauhin p. 180. C. Hofman. de usu part. p. 315. Casserius l. c. Highmor, p. 120. Vigier l. c. 21. Amstelodamenses p. 8. in vitulo, Nuck in adenogr. p. 11. Verheyen. p. 152. Schrader. obs. 3. Dec. I. Rau apud Valent II. p. 104. Mangetus Theatr. II. p. 168. qui per pudendam redire vidit aquam injectam mammariae, Gunz l. c. p. 24. Inde in vulnere epigastrii sanguis ad inguina eductus *Zod. Gall. I. p. 51. Non optime vero has anastomoses raras esse dixi Valverduus p. 277. Minus bene alii, qui omnino aliquas adesse negaverunt, ut Columbus p. 173. Carpus p. CCVII. de homine locutus. Jessenius a Jessen anat. p. 28. Major anat. l. p. 17. Muralt. Vadem. p. 62. T. Bartholinus hist. 9. Cent. 1. & hist. 6. Cent. IV. Barles nouv. decouv. p. 148. Harder in prodr. phys. c. 10. Mauriceau p. 412.**

Porro recte plerique physiologi uteri cum mammis aliquod commercium esse dixerunt, ut *Galenus de util. part.*

te diebus, quam menses patiatur, mammae turgent, maxime vero eo die, quo menses prodibunt ^b. Postquam autem menses defierunt fluere, concidunt eadem ad priorem

L. XIV. & recentiores fere omnes. Nam Epigastrica non raro obturatricem dat, a qua vasa varia pudendorum veniunt DCLXIV. & pudendas externas l. c. &, si nihil dederit, uti negat dare *Vesalius* p. 660. proxima tamen est, & vicinissima arteriae Hypogastricae. Addit *D. de Marchettis*, arterias epigastricas in lactantibus duplo majores esse p. 62.

Verum an ideo lactis materia ab utero ad mammas determinari possit, in gravidis & puerperis, & lactantibus, quibus plerumque menses desunt, aut a mammis ad uterum, uti fit, quando lochia mammas lacte exhauriunt, id quidem non dixerim. Nam angustae sunt anastomoses, & vulgares ubique inter truncos vicinos, & denique in viris pariter, atque in feminis reperiuntur, uti etiam nunc in puerulo video. Sagaciter adeo *Vesalius*, qui anastomosis non quidem repudiatis p. 476. parum tamen tribuit p. 477. (non ideo quidem, quod nullae ab internis arteriae mammas adeant, uti scribit p. 678. id enim aliud est a nostris experimentis) tum *Laurentius* L.VII. c. XI. & *Bayle de catam* p. 64.

^b Confer DCIXV. ^b. Inde illa effata *Hippocratis*, Lac ex mammis fluere signum debilis fetus *Aphor.* V. n. 52. *Epid.* II. S. 6. Si mulier neque praegnans, neque puerpera lac habuerit, ei desunt menses *Aphor.*

rem gracilitatem, post tertiam septimanam, denuo in tumorem rediturae. Sed gravidis etiam post retentos menses mammae turgent, & post partum maxime. Quamprimum concepit femina, uterus clauditur; tunc sanguis, repulsus ab utero, in mammas venit. In partu depletur uterus, tunc mammae concidunt, sed brevi intervallo contrahitur uterus, tunc autem mammae lacte rigent.

Evacuatis &c.) Mammarum arteriae a proximo corde non recta via adveniunt: sed adscendunt ad finem pectoris, inde ad mammas retrogradae descendunt.

DCLXVII.

Duriori) Dantur integrae nationes, quarum mulieres mensibus destituuntur: id de

Aphor. V. n. 39. Ad menses nimios cucurbitulam maximam mammis oportet admovere *HIPP. Epid. ll. S. 6.* In ea parte, cujus mamma major est, in ea fetus *de superfet. n. 9.* Quibus mammae gracilescunt, abortiunt *Aphor. V. p. 53.* Cum haemorrhagia uteri mammae collapsae *E. N. C. Dec. ll. ann. 4. obs. 154.*
 a De Brasiliae indigenis dixi. Groenlandiae indigenas pube & mensibus destitui *OLEARIUS refert in itin. Mosc. Pers. p. 170. & PECHLINUS obs. 34. Cent. I. & menses in septentrione rariores sunt FREIND. c. IX. HIPP. περὶ αἵρων &c. n. 7.* His borealibus frigus solidas partes corporis strictiores reddit: illis Brasiliae incolis pletho-

ra

de scythicis ^{a*} narrant feminis, quae marito, in bello comitantur; vix eas mamma ajunt habere, vix menstrua pati. Accedunt nempe ad marium naturam.

Labore) Hae enim superpondium per labores ^b dissipant.

Succulentae) Novi feminas pulcherrimas, sed mollissimas, quae vix integra septimana a mensibus liberae sunt ^c. Hoc ab otio fit, &

ra sub prima molimina mensium destruitur, ut prius, quam nova generetur, solidata vasa uteri pressioni sanguinis resistere possint. Recte Cl. SIMSON, mensēs non necessarios esse, quando uteri vasa justo minora sunt p. 79.

^{a*} HIPPOCRATES *περὶ αἱμάτων ἰσχυρῶν* &c. n. 48. Salutarices excitat FREIND. c. 3.

^b DCLXV. not. a. g.

^c *Minus, in Textu.*) HIPPOCRATES, Graecus homo, quae gens feminas in gynaeceo quietam & reconditam vitam jubebat agere, mensium copiam integris duabus heminis aestimat, *περὶ γυναικῶν α.* quam copiam credunt viginti unciarum pondere esse; id ipsum vero pondus FREINDIUS adsignat c. 1. Hispanis quatuordecim & sedecim unciarum menses esse FITZGERALD l. c. p. 5. Occitanis ab octo ad decem ib. Batavis vix supra sex uncias GORTERUS in *compendio* p. 141. & rusticis germanis vix unius unciae pondere DCLXV. not. g. Ut in copia, ita in tempore, quo menses fiunt, aliqua diversitas est. Graecis biduo vel triduo absolvitur periodus ARISTOTELES *hyst. anim*

& mollitie, deinde ab igne, quem pedibus feminae batavae perpetim supponunt, deterrimum secutae morem. Ita enim inferiora laxantur, & eo sanguis adtrahitur, dum corpus quiescit, & perpetuo tamen cibis repletur opimis, & theae coffeaeque potu. Nempe, uti in **LISTERI** experimento venae sectiones plethoram augent, ita his feminis accidit: & praeterea vasa laxantur, ut nullum sanguinem retineant. Non sanantur, nisi ad labores redeant si noluerint, quadragesimo anno hydropicae pereunt: si autem conceperint utero, plerumque abortiunt.

Vias] Nulla pars est in corpore humano, ex quo aliquando menses non prodierint. **HIPPOCRATES** effatus est, quibus menses supprimuntur, & mammae tument, iis menstrua caput petunt, & furor accedit f. Quibus vero retentis menstribus per haemoptoen sanguis exit, sanantur, si catamenia redie-

anim. L. VII. c. 2. & **HIPPOCRATES** *περι γυναικων α.* triduo & ultra **HIPPOCR.** *de fetu octim.* n. 5. Occitanis intra quatuor & sex dies menses delinunt fluere **FITZGERALD.** p. 9. In Anglia triduo **FREIND.** c. 1. In Belgio triduo, quadriduo **VERHEYEN.** ll. p. 93. **GORTER.** *comp.* p. 141. & in Gallia etiam triduo, quadriduo **MAURICEAU** p. 49. Germanis integra septimana **STAHL.** p. 772. Sed ego, uti vidi hanc periodum, ita saepe etiam in feminis sanissimis brevior rem vidi.

redierint &. Vidi hujusmodi haemoptoen,
 quae in consuetudinem abierat, ut sanguis
 flo-

d *Tardius*) In calidis regionibus mire praeco-
 ces sunt, & fertilitatis termini, & men-
 sium adeo, cum ante menses feminae raro
 concipiant. In provincia Indostanica
Azmex puellae anno aetatis decimo pa-
 riunt, in Balagatta octavo THEVENOT
Itin. T. III. L. I. c. 29. & 48. Sed
 MANDELSLOH in indicis itineribus puel-
 lam vidit, quae secundo anno mammas
 extulit, tertio menses passa, quinto pe-
 perit, *Itin.* p. 118. Occitanis, in adeo
 parva diversitate, menses integro anno
 prius, quam Parisinis prodeunt FITZ-
 GERALD p. 3. In Belgio vero inter 14
 & 26 annum GORTERUS p. 140. In
 montanis menses serius proveniunt SAT-
 SIL. I. n. 5. & facillime supprimuntur,
 uti saepe in alpibus per querelas hospi-
 tum didici. Non ignoro, passim exem-
 pla exstare fecunditatis valde praecocis,
 etiam in Europa. Ita nono anno puellas
 peperisse exempla lego apud MARCEL-
 LUM DONATUM p. 384. I. SYL-
 VIUM de *mens. mul.* p. 165. JOURNAL
 des SAVANS a. 1681. BRESL. 1723. M.
Nov. &c. & puellae quatuor annorum a-
 dultae & mammosae historiam habent
 PARISINI in *Actis acad.* 1708. *hist.* 2.
 aliamque similem VALISNERI *asser.* 9.
 magnamque vim praecocium puellarum,
 quibus a decimo anno ad primum menses
 eruperunt, videas apud FRANCUM
Sat. VI. p. 94. & SCHURIGIUM *Par-
 then.* S. II. c. 5. Sed hic quaeritur de
 integris nationibus.

floridus singulis mensibus ,absque detrimento sanitatis,cum levi tussicula exscrearetur. ^h Vidi ubi evomebatur sanguis ⁱ: vidi per alvum ^k deponi & per sudorem ^l. Imo ex inter-

e Plethoricis menses bis intra revolutionem lunae fluunt *Freind. c. l* etiam ex *Dureto*, & ad integram libram *Gorter. l. c. p. 141. 142.* pondere nempe pene triplo ponderis in ea regione, familiaris. Perficae mulieres, ex luxuria & otio celebres, in fervida regione, bis etiam & ter intra mensem sanguinem de utero fundunt *Fitzgerald p. 3.* Vide etiam exempla fluxus bis in uno mense redeuntis apud *Panarolum Cent. ll. obs. 41. Mauriceau p. 54. Schurig .p. 148 & 14. diebus E. N. C. Dec. lll. ann. 7. S. obs. 149. & 18. diebus in uno mense Venette p. 242.* Deinde otiosis ad sex & octo dies periodi protrahuntur *Freind. & Gorter.* Sed & viris otiosis haemorrhoides frequenter *LXlll.* Sanguis enim multus generatur, dum valent viscera, quae chylum faciunt, & parum diffatur, & in primis vasa non ita conpinguntur, ut vel minimae plethorae resistere possint.

f A suppressis muliebribus epilepsiae *Coac. L. lll. & omne fere malorum genus, atque mors ipsa, intra sextum mensem περὶ νοῦσων β.*

g Oculorum caligo discutitur, quando prorumpunt muliebria *COAC. lll. TR. lll. n 43.* Caecitas pro mensibus menstrua *Pechlin. obs. 42. Cent. 1. Recte haec Freind c. Vlll. & simillima Praeceptor.*

interno oculi cantho^m nonnullis menses fluxerunt. Ubique eadem materia est, floridus nempe sanguis; qui per quamlibet corporis partem erumpit, si in ea parte ea consuetudo nata fuerit, cui vulgo uterus obnoxius est. Quam primum enim alia aliqua pars corporis magis, quam uterus, dilatabilis est, in eam sanguis irrumpet, & per eam exhibit, uti per uterum solebat. IDEM HIPPOCRATES in pulcherrimo libro *de mulierum morbis* o dicit omne mor-

h Experimenta exstant absque numero fere. Vide *Bennetum Theatr. tabidor.* p. 45. *Salmuth Cent. II. obs. 18.* *Ortlob. oecon. part. p. 147.* *Pechlin. Cent. I. obs. 43.* *E. N. C. Dec. I. ann. 9. 10. obs. 27. & ib. Cent. X. obs. 33 in gravida) Bresl. 1721. M. Jul. Hagendorn. Harder apiar. obs. 81. Phthisis ex mensibus suppressis Bennet. l. c. & Hipp. περί γυναικων. et ex lochiis suppressis Cattier obs. XI. etc.*

i Conpilationem habet *Marcellus Donatus hist. med. mir. L. IV. c. 16* et *Sennertus L. IV. p. 186.* tum *Stalpart VAN DER WIEL Cent. II. obs. 17.* et aliam *Schurig. Parth. S. II. c. 3.* Sed etiam *Hipp. vidit περί γυναικων. α.* et *Aretaeus L. II. c. 2.* et *Lang. Epist. p. 54.* & *Panarolus Pentec. l. n. 6.* & *Harder. apiar. obs. 82.* & *Lanzonus obs. 182.* & *E. N. C. Cent. I. obs. 41.* Porro *Benivenius exemplum narrat morb. abd. c. 41.* & *E. N. C. Dec. I. ann. 1. obs. 95. ann. 6. 7. obs. 67. Dec. III. ann. 2. obs. 101.* & *Ruyfch adv. III. n. 9.* & *Molinettus p. 326.*

In

morborum genus nasci ex menſibus, & iisdem menſibus eos ipſos morbos ſanari. Si
phre-

In viro menſtrua ſanguinis per vomitus excretio *Barth. Cent. V. obſ. 33.* In prægnante *Id. obſ. 19. Cent. 1. Pechlin. obſ. 37. C. 1. Lochia per vomitum COMM: Nor. 1735. hebdom. 40.*

k *Hildanus Cent. VI. obſ. 67. Bresl. 172. M. Aug. Paræus, & Schurig. ex Hollerio; Horſtio, Dalaæ: et Bresl. 1719. M. Oct. p. 493. Porro Hippocrates Coac. L. III Tr. III. et Duretus ibid. C. Bauhin. p. 124. et in E. N. C. Dec. I. ann. 3. obſ. 24. 22. Dec. III, ann. 5. 6. obſ. 196. Menſes cum hæmorrhoidibus alternantes Paulin. poſt E. N. C. Dec. II. ann. 5. obſ. 30. Hæmorrhoides pro lochiis Stalpart obſ. 78. Cent. 1. In gravida hæmorrhoides Siegmundin p. 238. Pechlin. l. c.*

l Per poros verticis capitis *Kerkring. obſ. 85. Pechlin. Cent. 1. obſ. 38. Schenck Exerc. anat. p. 175. Verduc. de Uſag. des part. Ruysch. adv III. n. 3. Rucker Comm. not. 1734. hebdom. 8 Ex gena E. N. C. vol. VI. obſ. 27. Ex naſi pinna E. N. C. vol. VI. obſ. 27. Per poros manus et genæ ſanguis cum ſaltu erupit Barthol. hiſt. 13. Cent. 1. Ex cute dorſi E. N. C. Cent. VII. obſ. 86. Ex pollice E. N. C. vol. 3. obſ. 161. Ex apicibus digitorum E. N. C. vol. VI. obſ. 27. Mercatus apud Schurig p. 106. et in eadem demum virgine ex his omnibus viis E. N. C. vol. VI. obſ. 27. Per ſudores *Franc. Sat. XV. p. 269. 270. Ex cute nova ambuſtorum pedum E.**

phrenitide femina laboraverit, et menses fluxerint, a phrenitide certe liberabitur.
Ita

N, C. Cent. IV. obs. 101. Maculae per cutem pro mensibus Barthol. ib. hist. 15. Fontanus consult. & respons. p. 150. E. N. C. Dec. II. ann. 6. app

m Bartholinus hist. 16. Cent. I. E. N. C. vol. VI. obs. 27. Sal. Alberti de sudore cruento. Zod. Gall. II. p. 41. Dodonaeus, Ruysch. adv. III. n. 3. Stalpart van der Wiel I. n. 19. Harder. apiar. obs. 82. & ex Mercato, Dolaeo, Helvvigio, Schurigius l. c. Schenk p. 633. Lochia ad integram libram ex ductu lacrumali Woolhouse in collectione a leCersf. edita p. 47. Habet etiam exemplum Manget Theatr. II. p. 49. aliudque Cyprianus p. 30.

Sed aliae viae mensium minus naturales supersunt. Per mammas menses Panarolus Pentec IV. obs. 13. Stalpart van der WIEL Cent. I. obs. 79. in irata, E. N. C. vol. VI. obs. 27. & ex Amato, & Brassavola, Marc Donatus p. 410. Borellus hist. 48. Cent. I. Ruysch adv. III. n. 3. Paulinus E. N. C. Dec. II ann. 5. obs. 70. & Schurig. ex Wolfio, Gassero, Bauschio & proprio experimento. Per nares Pechlin. Cent. I. obs. 40. Schurig. l. c. ex Bauschio, Bierlingio, Solenandro, Riedlino, Brassavola; Tum Hildanus Cent. III. obs. 12. Freind. c. IX. Rucker l. c. E. N. C. Cent. X. obs. 38. Lochia per nares E. N. C. Dec. I. ann. 2. obs. 184. Salmuth Cent. I. obs. 59. Per aures menstrua Franc. l. c. Schurig ex Spindlero, Hor:

Ita diuturni capitis dolores mensibus restitutis solvuntur. Neque mirum, hi enim mor-

Horstio Partb. L. II. Schenk l. c. & Harder apiar. obs. 83. Linder in A. Suec. 1723. p. 432. Rucker. l. c. E. N. c. vol. 3. obs. 161 Ruysch. adv. III. n. 3. Sub genu ex duobus fonticulis Bresl. 1721. m. Maj. Ex tibia Rhodius Cent. III. n. 50. Ex ilibus dextris Comm. Nor. 1735. hebdom. 13. Hipp. περι γυναικ. Per urinas Bresl. 1721. m. Jul. Brassavola &c. Salmuth Cent. III. obs. 36 Ex foramine inguinis Zacutus a Sennerto citatus. Ex poplite Cumme E. N. c. Dec. I. ann. I. obs. 96. Ex pedibus Bartholinus Cent. 1. hist. 16. ulceratis Pechlin Cent. 1. obs. 30. Edimburg. Soc. Eff. III. p. 380. E. N. C. vol. VI. obs. 27. & Schurig p. 108. ex Horstio, Zacuto, Riedlino, Blancardo, & Comm. Nor. 1735. hebdom. 40. Ex ulcere tibiae E. N. C. Dec. 2. ann. 5. obs. 81. & genu Dec. 1. ann. 4. obs. 57. Ex evulso dente Schurig partben. p. 94. ex Hollerio & aliis, Rhod. cent III. n. 51. Loescher de dent. sap. p. 22. Ex gingivis Zacutus, Dolaeus, Horstius, le Grand, Blancaard apud Schurigium p. 95. Cyprianus p. 30. (de lochiis). Ex ductibus salivalibus E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 87. Ex labio inferiori Cent. 1. obs. 48. Ex isthmo faucium Cent. V. obs. 48. Ex palato Breslau 1723. M. Jan. Ex umbilico E. N. C. vol. V. obs. 161. 161. vol. VI. obs. 27. RUYSCH adv. III. n. 3. ZACUTUS, Rhodius Cent. III.

morbi fere a plethora fiunt, ea vero soluta morbos ipsos sanari convenit. Quando menses decimo quarto anno in puella adparent, deficiunt quadragesimo: si anno viges-

n. 49. Ex scarificatione E. N. C. Dec. III. ann. I. *obs.* 88. Ex vulnere digiti manus E. N. C. Dec. II. ann. 8. *obs.* 86. Ex trunco amputati pedis RANIE *disp.* Ups. habita n. 9. Lochia per vulnus cancroſae mammae E. N. C. Cent. IX. *obs.* 54. Ex vena sponte rupta, jugulari SCHURIG. l. c. p. 103. ex Frid. HOFMANNO, saphena SCHENK. BRESL. 1724. p. 637. In gravida vena malleoli aliquoties aperta SELECT. FRANCOF. I. p. 186. & cruralis vena HARDER. *apiar. obs.* 85. Conf. SCHURIG. *parthen.* p. 207. FRANCOF. I. p. 186. & integram collectionem apud FRANCUM in *satyr.* XV. p. 269. 270. & SCHENKIUM. Denique FREINDIVS, non haemorrhagias unice, & venae sectiones, sed varias uberiores excretiones mensium loco fuisse fuisse demonstrat c. IX. salivationes, diuresin, sudores. diarrhoeas DCLXV. *not.* g.

n HIPPOCRATES *de natura pueri* n. 12. *περι γυναικείων α.* & ARISTOTELES *hist. anim.* L. VII. c. 1. menses sanguinem dixerunt talem esse, qualis a victima fluit, & cito congelascere. MARCELLUS DONATUS exemplum habet menstrui sanguinis, qui in uterum effusus, omnino uti saluberrimus sanguis, in scissilem duritiem coit p. 455. & menses ab atreta diu retenti omnis putredinis expertes educi

gelimo primum prodierint, serius evanescent: & ad quinquagesimum supererunt, si 25to demum adparuerunt. In Italia & Hi-

Si fuerunt a *la MOTTE* *obs.* 341. & in *E. N. C. Dec. II, ann. 3. obs.* 151. Hanc veram sententiam etiam *ARAN-TIUS* tenuit *de fetu* p. 3. & *MANNING-HAM* p. 45. Recentiores autem, abusi forte Mosais legibus, nescio quae vitia mensibus tribuerunt, ut etiam vulgo prophiltro habeantur. Vide ridiculas historias *BONACCIOLI* p. 39. aliamque *STALPARTI van der WIEL Cent. II, obs.* 19. & *E. N. C. Vol. I.* non valde probabiles. Lentiores esse alio sanguine *LISTERUS de humor.* p. 401. & facere *ID.* p. 400. *ALLEN Synopsis. med. c.* 14. 3. *HILAIRE anat.* p. 756. Faetidissimos etiam *SCHURIGIUS* recenset p. 218. 219. & *BRESLAVIENSES* 1723. *m. Apr.* & ita acres, ut aliquando cutem excoriarint, spathulam atraverint *GRAAF.* p. 203. & esse feminas, quarum menses noceant *la MOTTE l. c.* p. 57. *COLLINS* p. 578. etiam arboribus *E. N. C. Dec. II. ann. IX. obs.* 37. ipsumque menstruatarum feminarum halitum nocere *VERHEYEN suppl.* p. 98. & lac menstruatarum noxium esse *la MOTTE obs.* 87. Neque negaverim in calidissimis regionibus sanguinem menstruum facile putredinem concipere, uti lego *Hottentottarum calidissima menstrua* dari *TAVERNIER L. II. c.* 27. & feminas esse, quibus acres manent, uti fluor albus saepe cutem desquamatur (*CHARLETON de catam. p.* 182.) Per-

Hispania femellae nubunt anno aetatis undecimo, decimo quarto, sed eadem cum trigesimo anno pariendi finem faciunt q.

Denique SANCTORIUS^r observavit, viros perinde ac feminas menses pati, non tamen sanguineos. Sed in viris omnimode nasci ad ponderis stateram augmentum, & ad sensum, minui perspirationem, corpus

Perpetuum vero & in sanis, & mundis feminis, & in recenter emissio sanguine vitium esse, nullo aut experimento certo confirmari video, aut ratione, quae demonstret, quo modo in uteri arteriis sanguis potius, quam in mesenterio v. g. corrumpatur.

- o Mulieri sanguinem spuenti supervenientes menses morbum solvunt HIPPOCRATES *aphor.* 32, *Sect.* V. Et mulier, cui menses suppressi sanguinis naribus fluxus bonus ibi. n. 33.

- p Non solum ex retenta aliqua sanguinis copia, ut in CHEYNEI *theoria* p. 166. sed imprimis a stagnatione ejusdem sanguinis in uterinis vasis, hinc orta tensione partium, obstructione late per vicina vasa diffusa, & impedita circulatione per pelvim, cujus adeo ampla vasa sunt, ut dimidium sanguinem aortae descendantis accipiant. Deinde vitia topica huc pertinent. Ex suppressis mensibus inflammationes & suppurationes colli matricis HILDEBRAND *Cent.* II. *obs.* 62. 63. 64. Scirrhum uteri, ductibus dilatatis gypsea materie plenis FITZGERALD p. 18. &c.

- q Balagatenses feminae pariunt octavo anno, sed estetae sunt trigesimo THEVENOT l. c.

corpus languere per duos & tres dies ,, & appetitum torpere , ut plethoram enatam inedia homo cogatur auferre Tandem sudorem copiosum prodire , aut crassam & multam urinam , atque ita morbum solvi , donec cum proximo mense novus redeat paroxysmus.

Hactenus dictum est , quo abeat superflua sanguinis copia , quae in sanae feminae
cor-

l. c. Puella, cui menses anno tertio eruperant , quinto periit PECHLIN. *obs.* 34. *Cent.* I. Menses a quarto anno ad octavum ordinati , sed puella non vitalis E. N. C. *Dec.* III. *ann.* 7. 8. *obs.* 149. Etiam Graecis mulieribus circa quadragesimum annum plerumque menses desinunt ARISTOTELES *de hist. anim.* L. VII. c. 5. Ita PHLEGON ex CRATE-RO historiam pueri excitat , qui septimo anno, ducta prius uxore & genito filio obierit. STAHLIUS etiam parum vitales esse puellas , quae nimis cito pubescant, observat *de mens.* sub finem. Cum enim menses paulo ante finem incrementi erumpant , incrementum autem finiatur , quando vasorum resistentia cordis inpetui aequalis est , & vasorum resistentia , quando vi cordis aequalis est facta , continuo augeatur , sequitur , citius in his , quam in aliis feminis , menses , ipsamque vitam destrui debere. Tunc autem menstrua desinunt , quando vasa uteri ita indurata sunt , ut a cordis inpetu evolvi & aperiri renuant SIMSON l. c. p. 70. Hanc durtatem in utero vetularum etiam digitus , & culter ipse percipit , & maxime siphon.

corpore generatur, postquam incrementi terminus advenit. Quando vero concepit, tunc

r Locus est *Seet. 1. aphor. 65. 66.* Sed negat GORTERUS *de perspir. p. 285.* neque videtur res regulam admittere, etsi in universum subinde vitia perspirationis emendentur alia excretionem aucta. Quare vero viri menses nullos patiantur, non difficile dictum est. Nam istis circulatio magis expedita, arteria aorta descendens minor est, DCLXII. & rami ejus multo duriores, & nulla in pelvi latitudo vel laxitas, DCLIX. nulla denique vasa arteriosa exhalantia, quo decumbat plethora. Inde pueris & juvenibus frequentes narium haemorrhagiae, adultis autem haemorrhoides.

Bruta vero menses non pati, pariter non difficile est. Iis enim duriora sunt vasa uteri, neque ita dilatabilia, ut arteriosum sanguinem recipiant. Id demonstrat comparatio spongiosi uteri feminae, cum musculo & fibroso musculo brutorum, (RUDBECK apud HEMSTERHUYSEN. p. 333.) & carente sinibus, si fides CHARLETONO *de catam. p. 125.* tum cotyledonum indoles, quae lacteo succo, absque sanguine turgent, ut secunda etiam absque sanguine de utero decidat, cum feminis placenta sanguinea sit, & nunquam absque insigni cruoris jactura de utero avellatur. Nonnihil forte etiam perpendicularis situs potest, qui in muliere sanguinem in uterum determinat, a brutis autem abest. Ita PITCARNE & FREIND. c. 5. Ea causa etiam est, quare mu-

tunc ex hoc ipso menstuo sanguine reten-
to,

mulieres prae brutis frequentius abortiant
MONROO *Edimb. Soc.* ll. p. 233. Id in primis
probabile fuerit, si verum est simias menses
pati, quod in PEIRESCII vita narratur,
ex aliena fide, & SANTORINUS n. 2.
ex proprio experimento profert, & pari-
ter STAHLIUS p. 770. & biduo triduo ve
quidem in E.N.C. *Dec.* ill. *ann.* 9, 10. *obs.*
217. Omnia autem quadrupeda vivipa-
ra, quae suffragines flectunt, menses pa-
ti, uti ARISTOTELES *de gener. anim.*
L. I. c. 20. *de hist. anim.* L. VI. c. 18.
tantum pauciores, quod crassiora min-
gant, & in pilos plethoram absument
hist. anim. L. VII. c. 2. aut vaccas etiam
menstruari, uti ARIST. *de hist.* L. VI.
c. 22. BOHN. p. 227. & canes, uti
IDEM l. c. c. 20. & STAHL. l. c. &
PLATER apud SCHURIGIUM citatus
p. 126. & equos, ut ARISTOTELES
l. c. c. 21. Id quidem nimium est: ne-
que pro mensibus habere oportet vene-
reum liquorem, qui ex brutis sub tempus
pruriginis annuae stillat, uti hunc liquo-
rem eo trahunt ARISTOTELES l. c.
c. 20. Cl. HERELIUS *Thes.* 2. Hic e-
nim parcissimus, neque naturaliter san-
guineus, neque ex utero, neque men-
struis intervallis, neque plethoram solvere
potens est. Deinde plethora brutis rarior
est, uti HALES citatus DCLXII. *not. b.*
& ARISTOTELES *hist.* ill. c. 19. &
demonstrat summa raritas haemorrhagia-
rum, aut haemorrhoidum, vix unquam
in brutis observatarum.

to , fetus aliquando ali debet , & crescere ad sex aut decem librarum pondus , tum placenta generari bilibris , tum humor amnii parari. In has inpenas consumitur copia superflui sanguinis.

DE

f Menses primam materiam fetus esse *Aristoteles gener. anim* L. I. c. 20. Gravidæ menses absumuntur in fetus nutrimentum *Hippocrates de nat. puer* n. 6. Nempe laxitas uteri , & facilis sanguinis ad uterum decubitus , & præsentia villorum exhalantium , quibus placenta inosculetur (*Simson* p. 72.) conditiones sunt , absque quibus conceptus non potuit ali , & eae ipsae conditiones menses reddiderunt necessarios. Non ignoro , aliquando repertas esse feminas , quae menses non passae , tamen dicantur peperisse. Exempla numerosa exstant , & habent *Hippocrates Epidem* II. f. 3. *Foesius* ib. *Rodericus de Castro de nat. mul.* p. 68. *Panarolus Pentec.* I. obs. 15. *Hild* Cent. V. obs. 41. E. N. C. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 159. Dec. II. ann. I. obs. 41 ann. 4. obs. 126. ann. 6. obs. 217. Dec. III. ann. I. obs. 24. ann. 7. 8. obs. 41. 19. Cent. VII. obs. 72. *Eohn.* p. 215. *Bidloo Exerc. anat.* Dec. II. n. 5. *Rhodius* obs. 54. Cent. III. la Moitte obs. 23. 24. *Stalpart.* obs. 31. Cent. II. & compilavit *Moebius Inst. Med.* p. 575. & *Marcellus Donatus* , addito proprio exemplo L. IV. c. 23. & *Sennertus* L. IV. P. 2. f. 2. c. 1. & *Franc. satur.* VI. p. 99. 100. & *Schurig.* syll. p. 176. Aliae vero post diuturnam mensium suppressionem conceperunt , ut *Bartholinus* habet *hist.*

DE CONCEPTU.

Conceptum) Antiquissimum vocabulum est, & significat eam actionem, qua id, quod femina ad generationem confert, jungitur cum eo, quod mas ad idem opus tribuit, ea ratione, ut adunatio horum, diversissimorum, principiorum, ad determinatum finem contingat. Nempe principium, quod vir tribuit, recipitur ab utero, ut homo fiat.

DCLXVIII.

Uteri) Cujus fabrica in humana femina, a brutorum structura plurimum differt.

Tria

37. *Cent. IV.* aut cum paucissimis mensibus E. N. C. *Dec. 3. ann. 2. obs. 214.* Verum pauca exempla ad peculiarem forte fabricam pertinent, qualis in viraginibus, aut Groenlandicis feminis dicta est.

- a In quadrupedibus viviparis enim vagina finditur in duo longa, undulata cornua, quorum finis in tubas adtenuatur *Graaf. T. XIV. XX. XXV Duverney Mem. de l'acad. 1701. f. 1. 2.* totus etiam tenuior magisque carneus est confer *Vesalium p. 665.* In cornubus istis fetus in totidem cellulis distinctis sedent *Fabricius de form. fet. f. 53.* in cane) & *T. 18. f. 48.* in scropha, *Sbaragli sceps. p. 330.* tum *Mauriceau p. 35. f. 4.* & *Graaf. c. 6.* & in his cornubus plerumque fetus, vel totus sedet vel parte maxima *Hartman de perit. vet. anat. p. 18.* In mulieribus autem uterus

&

Tria autem foramina habet: uno semen masculinum recipit, duobus ad tubas^b patet.

Exire)

& unicus, et sursum latefcit, et ex angulis tubas edit absque cornubus, et pulposus totus est, atque spongiosus, multoque crassior, et fetus in utero naturaliter habitat *Galen. de diff. vulv.* ubi vero idem de capra et vacca non bene affirmatur, recte enim feminae proprium esse docet *Drelincourt de femin. ovis not. c. p. 590.* Nisi forte simiae uterus humani similis fuerit, uti lego *E. N. C. Dec. II. ann. I. obs. 61.*

b Tubae Fallopianae sunt canales conici **BIDLOO** T. 53. f. 4. 5. **GRAAF** in omnibus iconibus, varie incurvi **BIDLOO** T. LIII. qui ex maximae diametri fundi uteri terminis **EUSTACH. T. XIV. f. 2. 3. 4.** **GRAAF** T. IX. X. **STENONIS** in *act. Haf. ann. II. obs. 89.* minimo ostio prodeunt **FALLOPIVS** p. 197. **GRAAF. T. IO. PEYER. ad MURALT. p. 408.** setam admittente **GRAAF. p. 276. KEIL. p. 106. WINSLOW n. 608. LIEUTAUD p. 361. &c. &** inter duas laminae peritonaei in se ipsum redeuntis **DCLXIII. HENSING. de perit. n. 48. WINSLOW. n. 607.** extrorsum versus ilia migrant, primo inferiores, deinde exteriores accumbunt ovariis **FALL. nst. superioribus primum, deinde & interioribus vide WINSLOW. &c.** Continuo cundo latefcunt **BIDLOO l. c. PLAZZON. L. II. e. 10.** ita tamen, ut subinde

Exire) Ut per eos materia quaecunque
ex utero versus extrema fimbriata canalium
aeque

inde angustiae aliquae interponantur
GRAAF. T. XIX. f. 1. 2. 3. donec ova-
rium aut proxime SANTORIN. p. 227.
membrana intermedia FALLOP. p. 196.
aut omnino adtingant ACT. BEROL. I.
vol. VII. SANTORIN *Istoria dun feto*
n. 39. GRAAF p. 261. & T. 19. f. 1.
WINSLOW n. 610. LIEUTAUD &
aliquando adnascantur, quod equidem
credit per morbum fieri Fallop. p. 196.
b. In vacca vidit Duverney junior *Mem.*
del' Acad. 1701. f. 2. in laena vero &
tigride perpetuum esse *Parisini* auctores
sunt *Diff. des anim.* P. III. p. 12. & ele-
phanto p. 134. Ibi ampliori, quam ad
uterum, osculo patent Fallop. p. 197. minus
tamen lato, quam pars proxima tubae
Lieutaud l. c. Winslow. n. 609. Taurvy
p. 69. quam cum varice non male com-
paravit in *institutionibus Fallopius*. Id
osculum undique ambitur fimbriis car-
nosis Fallop. l. c. Pascoli l. c. p. 63.
varie & saepe eleganter laciniatis Fallop.
l. c. Bidloo l. c. Graaf l. c. f. 2. Verheyen.
T. 17. f. 6. Schelhammer, exerc. 12. quasi
erosis Riolan. p. 179. valde vasculosis vide
iconem uteri nostri & Heister. T. III.
f. 11. fibrisque longitudinalibus instructis
Sbaragli *seps.* f. 4. unde musculos vocat
Drelincourtius in *Mangeti Theatr.* II. p. 138.
Concept. de conceptu *Perioche* 5. 6. tum
Harder *apiar.* p. 34. Has fimbrias non
quidem nulla bruta habent, ut vult Sbaragli
l. c. p. 366. habet enim felis Zibet

aeque facile ire possit, ac ab iis ipsis extremis versus uterum fertur c. Nullae enim intus

thina *Parisiis* testibus, *Leaena*, apud eosdem: & rana *Peyer* apud *Murali*. in *Vademec.* p. 404. 405. Aliquando tamen etiam in femina fimbriae desunt *Elzholz* E. N. C. Dec. I. ann. 6. & 7. obs. 197. f. 3. *Cbeselden. Weitbrecht. Petrop.* IV. p. 262. *Acad. des sc.* 1700. hist. p. 46. *Zod. Gall.* II. p. 73. Utraque forte causa est, quare *Swammerdamius* in iconibus suis omiserit lacinias, & GRAAFIUM, qui pinxerat, carpsit.

- c Flatum libenter transmittunt ex utero in abdomen *Graaf.* p. 260. aut vicissim. Hinc in tubis frequenter sanguis repertus est *Ruysch. Mus.* p. 127. aut mensium *Ruysch. obs.* 85. aut lochiorum *ID. obs.* 84. *Staebelin. spec. a.* 1724. II. 4. aut puerperii *Blancard* in *collect.* ad duas libras *Blegny Zod.* I. m. Jan. (ubi adeo apertae fuisse leguntur, ut grumos manu eximere liceret) & per eam viam in abdomen sanguis exiit *Santorin. ist. d'un. feto* p. 16. ad duas in puerpera libras *Blegny histoire d'un fetus* p. 24. Hunc sanguinem ex utero habuerunt, & manifeste *Ruyschius* vidit, sanguinem continuo ductu in utero, & tubis & ad ovarium fuisse *Mus. rar.* p. 127. Pili etiam et steatomata per uterum a puerpera excreta, fuerunt procul dubio ex ovario *Siles. Satur.* VII. n. 5. Spiracula esse uteri, per quae in abdomen halet, *Fallopium* ex conjectura proposuit in *inst.* et repetiit *Whar.*

intus adsunt valvulae d: Ultimus finis in
cavi-

Wharton. p. 230. ut manifestum sit, viam
vidisse liberam.

d Valvulas anatomici nonnulli proposuerunt,
cum stylum mediocrem, & facile per
ostium abdominale subeuntem, ad unciam
circa uterinum ostium, repelli viderent, &
aliquando flatum WEPFER *de cicut.* p.
124. tum viderent forte cellulata bruto-
rum cornua. Ergo tres cellulas, qua-
tuorve *Riolanus* fecit l. c. & *Linden.*
phys. p. 282. & *T. Bartholinus* in *Casp.*
p. 142. valvulas vero multas *Wharton.*
p. 230. & *C. Bartholinus.* Sed mera
angustia est, rugae vero internae tubae, non
circulariter, verum secundum longitu-
dinem disponuntur *Graaf.* T. XIX. f. 2.
E. N. C. Dec. III. ann. 9. 10. obs. 102.
Verheyen. p. 132. T. 17. f. 6. *Buchner.*
Miscell. 1727. p. 62. *Santorin,* obs. T. II.
f. 3. *Winslow* n. 613. suntque plicae
membranae internae *Bianchi de gener.*
p. 73. Neque video valvulas illas duas
ad ingressum in uterum FANTONO
dictas p. 200. quarum similem unam in
cuniculo vidit GRAAFIUS p. 266.
etiam ab ELSHOLZIO receptam l. c.
& VENETTE p. 254. Recte adeo ILL.
MEISTERUS monet, tubas mulieri minime,
ut in brutis cellulas esse *comp.* p. 106.
valvulasque refutavit PEYERUS ad MU-
KALT p. 409. & *Graaf.* p. 261. &
Welsch. T. 52. & TAUVRY p. 64. & qui
ne in equarum quidem tubis reperit,
MORGAGNI *Adv.* IV. p. 54.

cavitatem abdominis aperitur °, & dilatatur in fimbrias lacertosas live membranosas. Nihil tamen ex cavo abdomine in
tubas

e Caecam tubam plerique fecerunt vetustiorum, Fallopio excepto, qui ubique apertam descripsit: Nempe CASSERIVS L. VIII. Tab. 20, 21. & Spigelius p. 261. & Plazzonus II. c. 10. & c. Bartholinus *inst. anat.* p. 142. & T. Bartholinus p. 258. & Mauriceau p. 13. & Highmorus p. 100 caecam faciunt, LEAL autem, non multo melius concidere ait intra aliquot a morte dies, ne stylum admittant p. 63. Caecam etiam tubam vidit BARTHOLINUS *bist.* 92. Cent. I. & GRAAF. p. 259. T. 19. f. 3. & in E. N. C. Dec. II ann. 5. *obs.* 63. & DUVERNEY *Mem. de l'Acad.* 1702 p. 403. fuse, & MANGET *Theatr. anat.* II. 108. & MANNINGHAM pro frequente) p. 49. & CHESELDENIUS *Phil. trans.* n. 337. & in *anat.* p. 276 et Cyprianus p. 22. & Weitbrecht l. c. & Parisini *Academici* 1704. n. 3. & Bianchi p. 75. & Ruysch *Obs. chir.* § 3. & Naboth *de sterilit.* n. 12, qui addit saepe se vidisse. Alteram autem tubam caecam recenset Ruysch *Mus. rar.* p. 174 & Valisn. *delle nove delle vivip.* c. 5. n. 21. et Vogli *anthropogen.* p. 227. Inde sterilitatem deducunt aliqui Ruysch *obs.* § 3. Cyprianus expertus, & Mangetus l. c. Denique ovarium, tubamque lateris sinistri defuisse vidit BLASIVS IV. *obs.* 2. Ego vero perpetuo apertam reperio, etiam in teneris puellis et in fetu (*Mar Balib. A&*, 1699. p. 20, contra MURALTII experi-
men-

tubas recipi potest : aut vicissim ex utero in tubas venire, praeter vaporem aut aerem.

Dilatatas) Tubae versus uterum strictissimae, ad partem averfam amplissimae sunt, quae ipsa figura fecit, ut *tubae* vocatae fuerint ab accurato illo descriptore FALLOPIO; qui non invenit quidem tubas ^f,
iter

mentum p. 426.) etsi aliquando osculum non continuo reperiam, collapsum inter fimbrias, ut olim monuit FALLOPIUS, deinde DRELINGURTIUS *advers. ad dogma* 12. & habeo consentientem MORGAGNUM *adv.* l. n. 30. Errorem priscum refutavit, tubasque cavas esse demonstravit WHARTONVS stylo inserto. & I. van HORNE *prodr.* p. 18. (cui hoc inventum non bene tribuit SWAMMERDAM p. 54.) & GRAAF p. 259. 260. & PARISINI in tigride & SCHRAEDER *obs. Dec. I. obs. 7* et MOLINETTVS p. 323. & SCHELHAMMER *progr. valed.* n. 32. (qui stylum excludere, sed flatum transmittere monuit), & in gravidis digitum recipere vidit BAYLE *de catam.* p. 23. Causa errandi aut in rariori casu, aut in illa difficultate a lacinis fuit. Coalitum autem ad praegressam aliquam inflammationem non imperite referunt Cyprianus & Duverneyus.

f Satis certum est vetustos anatomicos tubas utcumque vidisse, neminem tamen veram historiam dedisse. HEROPHILUS ductum varicosum fere uti ductus feminalis maris, utrinque in uterum in-

iter tamen ad uterum & cavitatem primus detexit. Ex hac diversa amplitudine sequitur, iter potius ex tuba in uterum esse, quam ex utero in tubas.

Fle-

fertum descripsit, apud GALENUM de *semine* L. II. c. I. non absque magnis erroribus admittis, quem non in omnibus mulieribus reperiri ait GALENUS de *diff. uteri*. Disertius RUFUS in *ovc.*, vascula e testibus enata varicis ad modum revoluta, in cavum uteri perforata vidit, quae pressa mucum funderent. L. I p. 40. ed. CLINCH. Hi etiam cirrhi sunt uteri apud RVFVM, cornua DIOCLIS, GALENI de *util. part.* L. XLV. c. X quae dixit de *vulv. diff.* c. 3. paulatim arctata angusto sine testi adhaerere 13. Et apud EUNDEM de *vulv. diff.* c. 3. & ORIBASIVM p. 123. processus laterales vulvae versus ilia hemicyclis comparavit HEROPHILUS. Sed etiam GALENI meatus seminales a testibus in cornua novi, ignoti HEROPHILO & EUDEMIO de *vulv. diff.* c. 9. ad testem latiores, in medio angusti, pene solidi, laxiores ad uterum, semen effundentes de *semine* II. & transmittentes specilla ib. c. I. analogi parastatarum varicosorum de *utilitate partium* L. IX. c. II. breves tamen et angusti c. 10. huc videntur pertinere. Idem adeo sunt ductus a testibus in cornua a THEOPHILO repetiti p. 895. & FERNELIO descr. *part. corp. hum.* C. VII. et recentioribus ut VESLINGIO *Syntagm.* p. 71. aliisque

que. GALENVS enim tubas potius, quam ligamenta ovarii vidit in suis bestiis, eae enim tubas habent, ligamentis, istis destituuntur TAUVRY de la gener. Nihil aliud etiam VE ALIUS dixit p. 659. aut pinxit f. 25. V. f. 26. K. tum, quando dixit cornubus uteri inferi de china p. 123. In examine vero obs. FALLOPII p. 135. 146. videtur quidem tubas describere, totus tamen obscurus est. Sed & PAREVS p. 105 f. G. tubas pingit. COLUMBUS autem vasa seminalia tortuosa seminis pro uteri cornubus esse testis est p. 242. FALLOPIVS denique in *inst anat.* p. 10. & *obs* p. 197. meliorem descriptionem dedit cum *meatus seminarii* nomine, fimbriasque, & ampliorem finem addidit, EYSTACHIUS in tab. XIII. & XIV. f. 1. 2. 3. 4. satis demonstravit sibi notas fuisse. Ab eo tempore vulgo receptae sunt nomine *deferentis ductus* a C. BAVHINO c. 36. PINAEO p. 38. CASSERIO L. VIII. T. XX. XI. aliisque.

Verum alias etiam vias veteres ab ovariiis ad uterum proposuerunt, marginem nempe ligamenti lati teretem, turgidum, retro tubarum initium positum, qui fibris quibusdam semitendineis praeditus, utcunque ovarium contra uterum firmat Grauf T. IX. f. 1. *Weitbrecht syndesm.* p. 231. *Lieutaud.* p. 362. E. N. C. Cent. VII. obs. 98. bon. ic. *Morg. Adv.* I. T. III. o. o. *Sbaragli* in icon. Eum non pauci pro vase semen in uterum effundente habuerunt. Hunc videtur *Galenus* subinde velle, nam obscura res est. Clarius *Massa*

& *Riolanus* p. 178. & *Spigelius* p. 261. & *Veslingius* p. 71. & *Casserius* l. c. & *C. Bartholinus* p. 143. & *Whartonus*, qui caecum videri fateatur p. 227. omnesque qui ad eam aetatem vixerunt; qui tamen varie cum eo ligamento tubae descriptionem confuderunt, ductum autem dixerunt *ejaculantem*. Eum adhuc habet *Elsholz* l. c. & *Mauriceau* p. 90. lit. G. cavumque se reperiisse confirmat *Meryus* apud *Fantonus* p. 204. tum *Fantonus*, ut etiam valvulam in cavitate videret p. 208. Caecum autem esse, & verum ligamentum *Plazzonus* monuit p. m. 138. & *D. de Marchettis* p. 44. neque multum ei tribuit *Harveius exerc.* 64. Deinde ita refutavit *Graafius* p. 256. & *Tauvry de la gener.* p. 28 seqq. ut nostris temporibus obsoleverit.

Deinde *A. Laurentius* alium meatum voluit saepe invenisse, qui in principium cervicis duceret L. VII. c. 9. quale quid etiam *Fernelius* habet *part. corp. hum. desc.* c. VII. & repetit ex *A. Laurentio Vigier Enchir.* p. 58. & *Riolanus* p. 178. 201. 366. fibrillas nempe duas in cervice uteri, & poros, ejaculantium vasorum oscula, & *Elsholz* l. c. Recte vero negat reperiri *Spigelius* p. 280. & omnino *A. Laurentius* vel idem, quod *Fernelius*, ligamentum vidit, vel arteriam aliquam ex uterinis. Ita *Drelincourt, parerg. de tubis* n. 8. De *Galenico* illo ductu longiori dictum est ad DCLXIV. a quo tamen *Laurentianus* differt, quem eo referebat, *Tauvry* p. 22. Tripartitum vas ejaculatorium *Riolanus*, lubens omitto, quod ad tubam

Flexas) : Ratio est, 1. ut cum compendio longitudinis quam maxima tamen itineris esset diuturnitas: 2. ut remoram obponerent cor-

tubam, fundum, & orificium uteri dixerat se in gravida vidisse findi p. 366.

- g *Flexas* tubas esse dudum *Galenus* pluribus locis, & ante eum *Herophilus* l. c. deinde *Vesalius* f. 25. V. f. 26. K. cumque capreolis comparavit *Fallopianus* p. 197. porro *Graafius* p. 259. (cujus tamen icones nimis rectae sunt) & *Bidloo* T. 52. &c. Directio vero in universum varia est. Olim ambire testes dixerat *Placczonus* L. II. c. 10. *Graafius* fere transversas & sine deorsum verso. Ita pene *Cbeselden*. T. XXXII. Sed alibi *Graafius* magis compositas, descendentes, deinde ad ovarium introrsum converfas facit. Transversas etiam *Winslowus* V. n. 607. *Sbaragli* vero adscendentes pingit, sine versus uterum converso II. f. 1. 2. p. 401. 449. Super testes scandere, deinde retro eos descendere, sineque suo sursum vel deorsum patere *Morgagnus* Adv. I. n. 30. T. III. idque frequentius esse confirmat Adv. V. p. 74. aliquando tamen conscendere ovaria, non superare, alias ne conscendere quidem IDEM. *Verbevenius* situm mutabilem esse (ut in gravidis deorsum respiciant p. 132.) & eadem *Winslowi* sententia est. Ego in gravida femina, cujus historiam dedi p. 2. *Morgagni* descriptionem confirmavi, caeterum incertam invenio, quom facillime dum removentur intestina, dimoveantur, & alioquin modo in pelvi, modo super vasa iliaca reperiantur. Etiam nunc bis video

corpusculis, quae vel ab utero per eas tubas versus fimbrias moverentur, vel a fimbriis versus uterum migrarent.

Glandulosa^a Fabrica tubarum crassa^h est, scabra intus & villosa, similis glandulosae.
Cryptae

video,,super ovarium adscendere,deinde osculum versus rectum intestinum convertere.

^h Tubarum membrana exterior a Peritoneo continuatur, tota levis GRAAF p. 262. Interior ab utero est LIEUTAUD p. 361. pulposior, crassior, rubentior Winslow. n. 813. a qua in primis laciniae illae producantur, rugosa tota.

Inter utramque infinita vis vasculorum est in rete mirabile implicitorum: conf HEISTERI T. III. f. 11. & Iconem nostram. Sed & musculares fibras inter duas tunicas descripserunt varii, SWAMMERDAM prodr. p. 25. WEPFER de cic. p. 124. DUVERNEY mem. de l'Acad. 1702. p. 404. orbiculares exteriores SANTORINUS p. 228. longitudinales (in vacca) SB RAGLI sceph. p. 453. DUVERNEY l. c. interiores, in lacinias productas SANTORINUS ib. T. II. f. 3. Utrasque etiam WINSLOWUS habet n. 611. & TAUVRY p. 64. illas autem spirales vocat. Anulum vero cis fimbrias, qui tubas constringat DRELINCOURTIO dictum concept. de conc. Per. 6. & SCHELHAMMERO exerc. 12. de gener. & BIANCHO de gener. p. 73. nullum haecenus vidi. Recentiores addunt spongiosum corpus, WINSLOW n. 613. quale in deferente vase est DCXLV.
utri-

Cryptae i sunt , mucilaginosae , quae ex latiori fundo per angustius emissarium viscosum liquidum effundunt.

Hae

utrique membranae interponi , cuius ope tuba possit erigi a sanguine effuso DRE-LINCOURT. l. c. *Per.* 7. FANTON. p. 219. HARTSOEKER *Coni. phys.* p. 310. DRAKE L. l. c. 21. COMMENTA-TOR HEISTERI , PALFYN II. p. 231.

Mihi de eo corpore vere cavernoso nondum satis constat. An vasa illa numerosissima viderunt? Tubum autem nervum illum, quem in tuba reperiebat ad uterum latiore ROLANDUS p. 178. 179. & in priori medietate admittebat VES-LINGIUS p. 73. ego quidem non intelligo.

i In tubis mucus reperiri solet WEPFER de *cicut.* p. 124. qualis in utero , non dissimilis humani feminis RUYSCH *obs.* 45. in vetula , VOGLI l. c. II. p. 56. in virgine, in puerpera vero SANTORIN. c. XI. n. 18. & in universum in iunioribus LINDEN *physiol.* p. 282. aut lactis aliquando coacti similis BLANCARD *anat. pract. obs.* LV. Cum testium succo comparabat Bartholinus *anat.* p. 259. & *hyst.* 92. Cent. 1. Ego vero mucum vidi , sed turpem , ut E. N. C. *Dec.* II. ann. IX. *obs.* 224. , a semine masculo valde diversum Lympham Winslowius vocat p. 613. & sapidam , coagulabilem LITTLE *Mem. de l'Acad.* 1704. *hyst.* p. 27. Hunc potest

Hae tubae ponuntur in ligamentis latis. Ea ab ARETAEO CAPPADOCE ^k cum alis vespertilionis comparata fuerunt: ab aliqua similitudine, quae his alis est cum ligamentis, ubi ab utero versus ovaria expanduntur. Hoc nomen retinuerunt apud recentiores. Ipsae tamen tubae mobiles sunt,

potest uterus suppeditare. Sed etiam in tuba muci fontes invenerunt, glandulas nempe Cypriano dictas in *Epist.* p. 21. *Duverneyo* l. c. *Tauvry* p. 64. *Santorino obs.* c. XI. n. 18. *istor. d'un feto* n. 26. & *Parisinis hist. de l'Acad.* 1704. *obs.* 3. timidius autem *Winslowo* l. c. Exhalare vero & in vaporem cogi, saltem partem ejus, constat ex *Heisteri* experimento, quo mercurius in arterias impulsus in tubarum caveam exiit not. 34. ut omnino non necesse sit, ad tubas lubricandas liquorem ovarum adhibere, quod fecit *Paitonus della gener.* ll. p. 46. & *Cyprianus*. Flavum esse in vetulis vaccis, & fermenti forte genus vult *Sbaragli* p. 451. In ranis similis in oviductu viscor est du *Hamel hist. acad.* p. 275. & in Raja oviductus papillis muciparis repletur *Stenonis myol. spec.* p. 147. *Collins* p. 656. (etiam de aliis piscibus). Aliquando increscit in enormem hydropem. Centum & quadraginta aquae libras in tuba reperit *Harderus apiar.* n. 88. Aliud exemplum est in *Zod. Gall.* I. p. 202. & 150. librarum *Cyprianus* l. c. f. 3.

k Vide DCLXIII.

sunt, & libere ^l in fluctuante membrana disponuntur, nihilque impedit, quo minus sursum, deorsum, antrorsum, vel retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum moveri, & versus uterum accedere, aut ab eodem facillime recedere possint.

Animalium) Incomparabilis HARVEIUS ^{l*} & ingenio summo polluit, & rara felicitate beatus est, ut ex liberalitate CAROLI I. omnes necessariae ad totum opus impensae ei subpeditatae fuerint: Iste eximius vir, reliquit nobis historiam generationis animalium, quae ARISTOTELIS ^m simile opus tantum certe superat, quantum aurum terra pretiosius est; cum tot talenta ⁿ in praeceptorem suum ALEXAN-

^l Nisi aliquando praeter naturam utero adnascuntur, qualia exempla VOGLI habet *anthrop.* p. 227. & BLANCHI p. 75. 76. aut intestino recto &c. Sed nulla in corpore particula est, quae non aliquando ad viciniam accreverit.

^{l*} *De gener. anim.* p. 228. Duodecim nempe damarum copiam HARVEIO fecit, quas subinde a conceptu secuit

^m Neque ipse tamen rudis aut indiligens, etsi omnino multa ex aliorum fide recenscat, neque perinde in secando aut in assiduitate observandi versatus fuerit.

ⁿ ATHENAEVS in *Dipnosophist* L. IX. licet non multum huic famae tribuat eruditissimus SCHULZIUS *hiss. med.* p. 358. Sufficit tamen quod PLINIVS confirmat
L. VIII.

XANDER effuderit. Omnes feminae animalium quadrupedum, gradientium & respirantium (nam aves unicam tubam habent o) duabus tubis uterum instructum nactae r sunt, & in vaccis totus uterus manifesto in duo cornua finditur, in muliere vero cornua multo angustiora sunt, & minora, & dicuntur tubae q. Hae, in homine

L. VIII. c. 16. & ipsa res legentem facile docet, venatores nempe, et piscatores, & aucupes, iussu regio, quidquid haberent observationum, in adversaria ARISTOTELIS contulisse.

o Rarissime duas, & praeter naturam, quale exemplum in gallina MORGAGNIUS vidit *Epist.* XX. & aliud N. STENONIS A. H. II. p. 226. n. 31. Nam avibus unica tuba, uti unicum ovarium est, TAUVRY p. 66. tum quadrupedibus oviparis, fibris in gallina spiralibus cinctus PEYERMERYCOL p. 164. In insectis oviductus duo sunt. deinde in unum confluunt MALPIGHIUS de bombyce T. XII. P. 35.

p Uti duo iisdem ovaria sunt, ita duae in omnibus tubae. TAUVRY l. c. Rationem diversitatis addit idem, quod in quadrupedibus motus per tubam a pede alterne in gressu promotus juvetur, avibus autem non alia, nisi a vesicularum aerearum motu vis sit p. 68.

q Quadrupeda & cornua habent, & tubas, mulier solas tubas, male cornuum nomine

mine tubae, quae in animalibus cornua sunt, in iis animalibus, quibus statum est coeundi tempus, eo solo tempore mutantur, quo haec animalia in libidinem ex naturae lege ruunt. Soli ^r nempe homini nullum tempus definitum est, quo generet, reliquis animalibus pene omnibus suum tempus statutum fuit, quo, neque alio, mares & feminae pariter lasciviant, appetantque venerem, reliquo anno se mutuo repudiatura. Ergo HARVEYVS, indagaturus, quid in femina mutaretur eo tempore, quo ad generationem idonea redditur, facile vidit aptissimum consilium fore, si in femellis certo tempore venerem appetentibus, in hanc mutationem inquireret. Equas adeo, vaccas, cervas; damas secuit, tum eo tempore, quo marem refutant, tum eo, quo appetunt & admittunt. Experiundo didicit, nullam uteri marem passi, uterive virginei diversitatem esse, nisi quae in tubis ^s est, & in ovariiis

mine etiam passim recentioribus receptas, ut VENETTE.

^r Tum animalibus, quae homini familiaria sunt, cani, equo, feli, porco, tauro. Equos in Alti toto anno equae aeneae adhinnivisse PAUSANIAS *Eliac.* I. p. 314. Certa tempora in primis cervi observant.

^s Est utique. Vide DCLXXIII. De tubis parvus est. Sed aliorum exstant experimenta. In femina impraegnata tuba inflammata

riis t. Tubae nempe incisae in femellis
 veneri non obnoxiiis, internam cavitatem
 levem

mata, quae ovulum comprehenderat
 cum femine viri EDIMB. SOC. ESS.
 V. p. 336. In alia post venerem occisa,
 tuba rubicundior, crassa, distenta, versus
 ovarium intorta RUYSCH. apud DIER-
 MERBROECKIUM & apud ERNDL.
It. angl. bat. p. 90. In cane ad venerem
 turgente tuba vasis plenissima VALISN.
della nova delle femine vivipare c. IV.
 n. 5. 7. 19. idque ante receptionem ovi
 sibi semper adparere, ut simul major sit ID.
 n. 17. In cuniculo pariter tuba rubicun-
 dior GRAAF p. 305. Liquidum aliquot
 uncias in tuba ovario adhaerente vidit
 BUSSIERE *Phil. trans. abridgd* III p. 12.
 & adeo dilatari in gravidis, ut digitum
 capiat BAYLE *de catamen.* f. 13. Cornua
 cuniculorum magis rubra GRAAF p. 305.
 & extenta reperiri post conceptionem,
 plenaque succo viscido COSMOPO-
 LITA p. 45. 46. sive EVERARDVS. Tur-
 gidam post conceptum tubam NENTE-
 RVVS vidit *physiol.* p. 320.

t Ovarium ante venerem macrum est (in cane)
 VALISN. c. IV. n. 14. Idem a conceptu
 plenum liquido viscido EDIMBURG. V.
 p. 337. Ovarium a coitu rubrum VER-
 HEVEN. II. p. 314. Post coitum conti-
 nuo vesicularum tunicae pluribus vasis
 conspicuae SBARAGLI *sceps.* I. v. 300.
 & opacae GRAAF p. 267. Ovum ali-
 quod reliquis majus perpetuo RUYSCH.
Thef. VI. n. 5. (sed de corpore luteo dicit)
 Congressus tempore nascitur in ovario
 da.

levem habent, & lubricam, mucos intus inunctam. Sed in venerea libidine interior superficies tubarum quasi inflammata adparet, maculisque rubris variegatur. Deinde in femellis, quae venerem non appetunt, tubae suo pondere labuntur ad inferiora, & fimbriarum lacinae pendent, uti in castrata femina semper flaccidae reperiuntur. Sed veneris tempore, etiam in galli-

damarum fibrosum tuberculum, quo ovum ab ovario liberatur PEYER *mercol.* p. 40. et in seropha globuli undique ex ovario eminent ID. ib. quod globuli simile, glandulosum describit GRAAF l.c. & foramen denique adparet, per quod ovum transiit p. 283. Sed vide de eminente corpore luteo DCLXIX. Adeoque mutatur omnino ovarium ad conceptus tempora, quod non bene negaverat HARVEIUS, (VALISNERIO monente c. X. n. 4.) & ea ipsa mutatio partes demonstrat magnas esse ovarii in generationis officio IDEM c. 9. n. 3. In furore uterino ovarium pugno aequale BLANCAARD *anat. pract.* ll. obs. 99: ovaque pisco aequalia BONNET. *Med. Sept.* l. p. 216. SCHURLIG. *de muliebri* p. 336. idemque vidit BRENDelius, et magna inde symptomata hysterica SANTORINUS p. 224. ruptamque ovarii membranam, quam diduxerat corpus luteum turgidum IDEM *istoria d'un feto* n. 29. Ovaria plenissima hydatidibus in femina maniaca COMM. NOR. 1742. *behnd.* 12. & ovarium ovi gallinacei mole RUDAEVS *misc. obs.* 6.

gallinis, statim a coitu tubae rigent, & lacinae expanduntur, & non raro, continuo a coitu, reperiuntur ita expansae, ut ovarium amplectantur contiguae^{u*}.

Fetus) In feminis humanis non raro reperti sunt fetus matri suae funesti, qui in tubis^x enutriti fuerant: in tota nempe lon-

In hystericis vesiculae tumidae DRELINCOURT *de femin' ovis* p. 519. In virgine a retento semine crasso ovarium pugni mole VENETTE p. 208: & in puella non casta semine turgidum p. 222. Testes in animalibus catulientibus magni & semine pleni HARVEIUS p. 272.

^u Sed dissentiunt alii, neque continuo a coitu, & post aliquot demum dies adhaesionem tubarum observant C. BARTHOLINUS &c. In catella primo & altero die distantes, tertio quartoque admotas ovario tubas vidit, ovumque recipientes Schurig. *Sylleps.* p. 75. & Langius ib. p. 61. & sexto die aut quinto in juvenca demum tubas ovarium amplecti a Deswig *de formatione fetus*, viginti vero septem horis a coitu in cuniculis GRAAF p. 306. & foramen in ovarii tunica tertio die ovum transmittere, serius in majoribus animalibus p. 267. eoque tempore egere videtur, ut ex ea lege secedere et per ovarii membranam penetrare queat, si Taubry fides p. 83.

^{u*} Post venerem versus ovarium conversam vidit Rayseb. apud Diemerbroekium, Els-

longitudine anfractuosae tubae: modo in angusto orificio tubae, proxime juxta ute-

Elsholxium E.N.C. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 196. et *Mangeti Bibl. anat.* p. 550. ovario vero fibrosis appendicibus adhaerentem; Osculo suo adglutinatum quasi ovum absorbturam (extra conceptum tamen) *Valisnerius* c. 5. n. 23. Deinde tubam ovarium amplexam post coitum saepe vidit *Graafius* p. 269. *Acad. des Sc.* 1704. *hist.* 21. et *Buffiere Phil. trans.* n. 207. *abridg.* Ill. p. 211. et *Valisnerius* c. 21. n. 11. in vacca *Du-verney junior Mem. de l'acad.* 1701. p. 243. atque in sue *Buffiere Phil. trans. abridg.* Ill. p. 212. et n. 207. in asina *N. Stenonis Aët. Hafn.* ll. p. 229. in cane *Schurig. sylleps.* p. 75. et *Goelicke* apud eundem p. 50. in juvenca *Deswig de formatione fetus*; et in ave demoiselle de numidie *Parisini*, in rana *Valisneri* operum T. I. p. 445.

Porro ovum in tubam pendulum ex vasculoso pedunculo *Buffiere* in femina *Phil. Trans. abr.* Ill. p. 212. *Goelicke* apud *Schurig. sylleps.* p. 51. Ovum autem in tubam receptum in femina *Edimb. Soc. Eff.* V. p. 336. in erinaeco *Peyer* ad *Muraltum* p. 256. *Valisnerius* in cane c. IV. n. 5. et vulpe ib. n. 5. tubam late instar cuculli ovarium amplexam vidit, ipsumque demum motum peristalticum, quo tuba adreptum ovum promovebat c. IX. n. 12. Ita

LITTRIVS illustre exemplum habet

uterum, modo alibi in flexione aliqua,
modo propius fini tubae, qui in fibras
expan-

tubae adhaerentis ovario, ovum ample-
xae, quod media parte ex ovario exierat
hist. 1705. n. 8. & aliud pene simile 1701.
p. 144. Similis fere VERCELLONI
historia est, & plucula in canis tuba
ovula vidit SCHVRIG l.c. MANGETVS
etiam ova extra ovaria, & in ipsa tuba
in femina reperit l. c. p. 72 & in cane simi-
llima observavit GOELIKE apud SCHU-
RIG. *sylleps.* p. 50. 51. deinde ex ovario
de petiolo pendula *ib.* nisi ea quidem
fuerint hydatides, uti non male suspica-
tur SBARAGLI *sceps.* p. 381. quales saepe
de tuba pendulas vidi, & pingit NOORT-
WYCK, atque passim reperio E.N.C. *Dec. II.*
ann. 5. obs. 73. atque ovum de ovario pen-
dulum *ann. IV. obs. 74.* pro ovo etiam
habitum in COMM. NOR. 1737.
bebd. I.

x Denique RIOLANVS duo exempla
fetus in tuba repertorum habet p. 180.
quorum alter pollicis longitudine fuerat.
Non ignoro, parum huic historiae tribu-
ere G. PATINVM in *epist.* ad STRAVS-
SIVM, rationem vero dubii in tanto
exemplorum consensu non video. Aliud
ex BARBATO ipse SBARAGLI narrat
sceps. l. p. 266. Aliud exemplum est in
E.N.C. *vol. V. obs. 152.* aliud in *Phil.*
trans. III. p. 216. n. 251. aliud ex MENONE
MATTHIAE apud SCHURIGIUM in
sylleps. p. 89. Fetus in tuba siccum
reperit memorat a DUVERNEYO
DIONIS 307. & 307. & placenta
prae-

expanditur, modo in superficie ovarii,
quod extrema tuba expansa comprehende-
rat,

praeditum, cum tubae finis pene caecus
esset E. N. C. *Vol. 5. obs. 152.* et DUVER-
NEY *Mem. de l'Acad. 1702. p. 298.*
seqq. Fetus tubarium etiam vidit BRO-
CKIVS *Comm. Nor 1735. hebdom. 19.*
Ex *Fabricio Terza Lana* duo exempla
refert *Païtonus della. generaz IV. p. 97.*
SANTORINVS etiam narrat historiam
fetus in tuba reperti, iconemque addit
T. II. f. 3. 69, CYPRIANVS propria epi-
stola historiam tradit fetus, quem ex tuba
matris excidit superstitis, obscuriorem
tamen, ut etiam negaverit tubarium fuisse
BANCHVS p. 190. 191. Sed et Proscocer
meus TEICHMEYERVS fetus tuba-
rium vidit, quem post sex annos ex in-
ciso abdomine, crassaque ad duos digitos
sinistra tuba exsecuit ILL. TEICH-
MEYER *med. for. p. 64.* et dentes ma-
xillaeque fragmentum ex tuba excisam
BÜCHNERVS refert *misc. 1730. p. 1421.*
Bis etiam conceptionem tubariam vidit
I. DOUGLAS in tract. *de cunic. partu:* et
lego PETERMANNUM talem con-
ceptum vidisse. VASSALIANVS
etiam fetus, quem in uteri potius hernia
quam in tuba sedisse, MAURICEAU ad-
firmat p. 77. seqq. omnino tubarius fuit, ut
icones docent in *PHIL. TRANS. N. 47.* &
apud MAURICEAU p. 50. & in ELS-
HOLZII *disl. de tubaria conceptu,* &
confirmat DIONIS *cours d'anat. p. 55.*
& DUVERNEY *mem. de l'Acad. 1505.*
p. 505. In vacca partum tubarium habet

rat, accreta ovario. Plerumque tamen in media uteri cavea fetus in humanis feminis repe-

BIANCHI p. 51. Huc porro pertinent historiae fetuum, qui in tuba enutriti, eam enormiter dilatata[m] ruperunt, & in abdomine reperti fuerunt. Tale exemplum habet DIONIS *cours d'anat.* p. 373 & aliud, nisi ad duplicem uterum pertinet p. 330. & ZOD. GALL. *ann.* IV. *m febr* Aliud SAVIARD, *obs.* 60 & *Phil. Trans Abr.* III. p. 2. 14. idemque describit DIONIS p. 315. seqq. BIANCHVS fetum habet, placenta sua ad tubam adnatum, qui ultimo per anum putridus ejectus est p. 181. Fetus immaturum ex tuba rupta elapsum fusc LITTRIVS describit *Mem. de l'Acad. des Sc.* 1702. p. 279. seqq. Similis CALVI historia est, nisi quod matri funesta fuerit *hist. de l'Acad.* 1214. *obs.* 2. & VALISNERIC. 17. huc enim pertinere MORGAGNVS testis est *adv. anat.* IV. p. 82. Verum non solus casus fetus invenit tubarios, NVCKIVS enim cani. tertio a coitu die, cornu ligavit, deinde 21. die reperit inter ovarium & vinculum duos fetus, cum reliqua tubae pars uteri vicinior inanis esset *Adenogr. curios.* p. 69. 70. Experimentum enim falsum esse durissima conjectura est VOGLI & PAITONI l. c. IV. p. 94. 95. in tanto cum reliquis experimentis consensu.

Quomodo vero ali potuerint in tuba fetus, explicavit CYPRIANVS. Vascularis abundat tuba, & alibi non rarum est, adfectas partes in enormem massam adflu-

reperitur, in brutorum autem femellis multiparis in cornubus.

DCLXIX.

adfluxu humorum intumescere. Omnes tamen tubarii fetus exigui fuerunt **SANTORIN** *istor. d'un feto*, neque facile sextum mensem superaverunt **DUVERNEY** *Memoir. de l'Acad.* 1702. 406.

Caeterum haec fusius proponere necesse est, postquam **SBARAGLI** omnino tubam ovarium amplecti, ova exfugere *sceps.* II. tum ova de ovario excipere & promoveri posse negaverat *scepsi* p. 451. & affirmaverat, saepius se expertum, nunquam in cornubus ovum invenisse p. 372. quae etiam **LEUWENHOECKII** obiectio est *Exper. & cont.* p. 402. Addit **SBARAGLI**, longitudinales fibras tubam potius claudere p. 453. Alii vero, tubam non mutari, neque dilatari tempore conceptus, obijciunt, ut **DUVERNEY** Chirurgus **ZOD. GALL** II m. *Mart* & fassus est **VERHEYEN**, se tubam ovario applicatam non reperisse II. p. 316. Denique **NABOTHVS** se catellis vinculis tubas constrinxisse, nihil diminuta fecunditate ait *de steril.* n. XII. Verum reliqui mortales pene omnes consentiunt, tubas, ad ovaria accedere posse. Nam etiam sponte plerumque adhaerent extremis laciniis *not. n.* & vasis repletis adsurgunt, ut ad ovarium se quasi convertant **KEIL.** *comp. anat.* p. 107. **SANTORIN.** p. 229. qui aliquas etiam hic partes esse credit nervei plexus alarum vespertilionis p. 230. Erigi spongioso corpore repleto & adhaerere **HARTSOECKER** *suite des conj. phys.* p.

110 et analogia omnino favet sexus masculi. T A U V R y v s etiam fibris suis spirabilibus & longitudinalibus & breviores fieri, & ad ovarium adduci credit, uti ex simili fabrica fit in oviparis p. 68. Sed eae fibrae obscuriores sunt. GRAAFIUS vero vinculo multum tribuit p. 305. Porro fimbriae musculosae ovarium amplecti possunt DRELINCOVRT apud MANGET ll. p. 138. *de conceptu Perioch.* 13. & ovum exprimere, tunc anulo fibrarum contractae promovere *perioch.* 5. 6 HARDER *apiar.* p. 34 et eo tempore tubae insigniter tument, robustaeque sunt, quando adhaerent ovario BVSSIÈRE *abridgm.* lll. p. 211. Deinde tuba ovario admota reperta est, per priora, et in tuba fetus: ut omnino non teneamur, demonstrato eventu, mechanicam docere, qua fieri potuerit.

Denique in aliis animalibus, quae certissime ovipara sunt, longe minor inter ovarium & infundibulum, sive tubum nexus est, neque fere nisi vinculum, ad quod inflexus oviductus adscendat. In avibus SWAMMERDAMIUS testis est, l.c. p. 24. et BELLINUS, et VALISNERI c. 19. n. 9. ut olim admiratus sit HARVEIUS, quomodo ovum ex vitellario per distans infundibulum descendere possit p. 83. In piscibus, ut in cane, oviductus per abdomen mobiles fluitant N. STENONIS *myol. spec.* p. m. 146. In ranis autem non solum longe pro animalis statura ab ovario distant tubae, sed praeterea immobiles sunt SWAMMERDAM l. c. PEYER ad MURALTUM p. 405. &c. et adeo arcto orificio aperiuntur, ut ignoratum

DCLXIX.

Utero) Ovaria haerent in membrana eadem, in qua tubae, continua cum tunica, quae super uterum expanditur. Uterum autem & tubas ^b nullibi contingunt, cum in plano ab utrisque remoto sedeant.

Firmantur) Ne facile a loco suo divagentur ^c.

Magna) Testibus tamen virilibus minora ^{c*}. Veteres pariter testes dixerunt: com-

raturum prioribus primus invenerit VALISNERIVS l. c. c. 19. n. 8. In testudine vero tubae foramen minimum, finis ab ovario remotus et averſus eſt, et deſunt lacinae amplexurae, et tamen ova eo venire neceſſe eſt, cum ova pariant TAUVRV p. 38. 60 In vipera denique oviductus foramen reperiri nequit MORAGNVS IV. p. 82.

a *Valida, in Textu.*) Teres illud dictum DCLXIX. & latum DCLXIII.

b De tubis vide DCLXVIII. not. b.

c Mobilia tamen eſſe adparet ex DCLXIII. not. b.

CARPUS modo ſupra cornua eſſe, modo inferius, modo longe remota in MUND. p. CXCVI.

c* Duplo minora in homine VALISN. c. 1. GRAAF. p. 225.

d Ovaria corpora ſunt ſemiovalia, utrinque compreſſa WINSLOW. 604. baſi lata ex ligamento ſuo ſive peritoneae orta, poſita retro tubas, & paulo ſuperius SBARAGLI f. 1, 2. conf. GRAAF T. I. Ibi innumera vafa a ſpermaticis ad ovarium accedunt

cedunt, quorum ramuli per medium axin
 baseos in ovum adscendunt GRAAF. T.
 XVI. c. c. Haec pleraque cincinnata sunt,
 & serpentina, & olim a GALENO cum
 caesarie comparata fuerunt de *vulv. diff.*
 c. IX. Cincinnata vocat SBARAGLI p.
 421. & pingit NUCK T. XXXII. Antror-
 sum a basi in eminentiam adscendunt
 ovaria, arcu comprehensam semielliptico,
 utrinque depressam, latamque GALENUS
 l. c. c. IX. Superficies limitatur equidem
 pene insuperabili (VESALI p. 658.) ad-
 haesione membranae alarum vespertilio-
 num, quae ovarii communis membrana
 est, pro darto data a GALENO l. c. sim-
 plex in homine, & similis peritonaei, abs-
 que ullis carneis fibris, quas in vacca vi-
 dit MALPIGHIIUS *ep. ad Spon.* p. 30. & VA-
 LISNERIUS c. 3. p. 17. & in equa *Idem*
 c. IV. n. 1. & in femina nominat *Idem*
 c. V. n. 24. tum *Littre hist. de l'Acad.*
 1701. p. 143. Neque Sbaragli vidit p.
 302. 303. uti imaginarios illos Galeni
 cremasteres ovariorum bonus *Carpus* non
 reperit p. CCXC. Neque video aliam
 propriam testium tunicam, diversam a
 propagine ligamentorum latorum, qua-
 lem *Riolanus* proposuit p. 200. & *Littre*
 l. c. nisi de industria velis in lamellas se-
 parare, ut *Santorinus istor. d'un feto* n.
 21. Vide consentientem mecum *Graafium*
 p. 226. *Lieutaud* p. 364. Hinc inde plerum-
 que ovarium eminentibus turget hemisphae-
 riis, quae olim ratio fuit, cur *Vesalius* cum
 glandulis conjunctis comparaverit l. c. &
 p. 658. ubi sinus „ ad pisorum similitu-
 dinem protuberare scribit; glandulosum ve-
 ro dixerit & pinxerit *Spigel. de form. fet.*
 T. XXI. f. 1. conf. *Swammerdam. mi-
 rac.*

rac. natur. T. III. *Elsholz.* E. N. C. Dec. I. ann. I. obs. 197. f. 2. &c. Substantia propria alba, pulpofa, humecta, ex brevissimis, arcte stipatis fibris mollibus, parum tensis *Valisneri* c. 1. compacta, nihil in corpore humano sibi simile habet, utcunque tamen cum conglobatis glandulis convenit. conf. *Winslow* n. 605. Cum placenta comparat *Bianchi* p. 48. quod pariter in villos abeant. Sed differunt longissime. Carneas substantiae ovarii in asina fibras *Valisneri* c. IV. n. 2. a *N. Stenonis* tactas A. H. II. p. 229. & in equa, ex externa membrana profectas *Valisner.* c. IV. n. 1. etiam *Sbaraglio* dictas p. 421. & *Littre hist. de l'acad.* 1701. p. 194. & *Vesalio* forte exam. obs. *Fallop.* p. 145. & in porca *Valisnerio* c. 3. perinde nunquam vidi. Neque cellulas peculiares in ovariis novi, in quibus demum vesiculae nidulentur facile eximendae, dictas *Dre. Vincourtio* de sem. femin. n. 9. p. 591. *Elsholzio* l. c. & *Nigrifolio* p. 16. neque alius, praeter *Duverneyum*, ovarium per cicatriculam inflari posse vidit, & instar cellulosae fabricae turgere, quae cum vasis spermaticis communicet *Mem. de l'acad.* 1701. p. 240. De Lymphaticis vide DCLXIV. Ea in ovario, & in ipso ovo vidit *Valisneri*, & ab ovo in corpora lutea exire c. 12. n. 6. *Graafius* in interioribus ovarii non viderat p. 227. *Malpighii* vasa flavo liquore plena in ovariis reperta huc pertinere videntur p. 32. Praeterea duriuscula vasa ignota in quibusdam animalibus reperit *Valisnerius* c. 3. n. 27. an arterias? In juvenculis utique ovaria magis succulenta sunt *Valisneri* c. 1. globosa magis, & pondere drachmarum duarum

communia autem sunt* omni generi animalium femininorum. Eadem eximuntur ex vaccis, porcisque faginae destinatis, vulnus autem, erepto ovario, consolidat veterinarius. Femellae vero, quibus excisum est, nunquam ulla adficiuntur libidine venerea, neque concipiunt unquam. Hujusmodi castrator in Germania fuit, cui cum mi-

*Santorin. obs. p. 221. Graafius in recens natis & infantibus a quinque granis ad decem, in flore aetatis tesquidrachmam, in decrepitis scrupulum pendere scribit p. 225. In vetulis ego ovaria exsucca reperi, scabra, minora, duriora: quae 10. tantum grana pendere Santorinus testis est p. 222. conf. istoria d'un feto n. 21. Vidi tamen in quinquagenaria femina, obsoleta ovaria vetusta quaedam ova continere, & duo corpora lutea: Alias in vetula ovorum loco miliaceos tantum acinos, albos, solidos, reperi. Cur autem decrescant quidem, sed non evanescant, ut in gallinis, respondet *Tauvry de la gerner. p. 49. quod in avibus & majora, & molliora sint. Sed ratio evidens est in peculiari fabrica glandulosa spongiosa, quae in viviparis copiosior est, licet neque avibus desit Collins p. 646 &c. Ipsa denique corpora lutea perinde in vetulis delentur Valisn. l. c. c. 18. n. 18.**

e Primus ovaria dixit *N. Stenonis a. 1667. in spec. myol. p. 145. ed. bat. etiam Savam-merdamio teste prodr. p. 54. post eum van Horne prodr. p. 15. ut male Hornio tribuat Diemerbroeck p. 129. Recentiores omnes consenserunt Sbaragli excepto, qui vesicaria solet vocare scps. I, p. 304.*

minus casta filia esset , ita bilis mōta est , ut aperto latere castraret puellam , quam ab eo tempore nulla tetigit veneris cupidof.

Sphaeroidea) Ex sphaerica figura compressa. Hi testes in virginibus teneris leves sunt , coitus vero tempore perpetuo scabri , majores , pleni sanguine.

In-

f Historia exstat apud *Wierum, Graaf.* p. 240.

Olim ,, apriis partem parvam vulvae resecari , sic conceptus facultatem & amorem veneris extirpari, *Aristoteles* auctor est *hist. anim.* L. IX. c. 50. Perfec̃te hoc confirmat *Verheyen* , per sectiones animalium castratorum edoctus ,, senioribus ovarium solum , junioribus praeterea uteri partem resecari , utrasque porro a venere abstinere & a conceptu ll. p. 316. *Gardenius* vero apud *Veeuwenhoeckium* experiment. & cont. p. 397. & *Bartholinus* *epist.* 64. Cent. III. & *Venet̃e* p. 228. & *Schurigius* *muliebr.* p. 69. & *Peyerus* de *rumin.* & *Rai.* *syn. quadr.* p. 49. omnino ovaria eximi dicunt , indeque animalia sterilesce. *Barbette* tamen *prax.* p. 83. suis uteros eximi mavult , & *Rouffetus* alias vasa spermatica, alias ovaria, a peritoribus denique uteros , etiam praegnantem excidi p. 116. 117. ut videatur in gallinis quidem certo ovaria eripi , de viviparis nihil adhuc firmum sit.

g Ovula in plerisque cadaveribus vegetae aetatis reperi , majora , minora , propiora membranae , vel profundius demersa , inaequalia , ab avellanae mole ad minutiam lentis. Minuta pingit *Bidloo* T. 51. f. 4. & semine milii non majora , tum

Ker

Kerkring. anthropog. f. 1. qualia lego *Ettmullerum* vidisse apud *Schurig.* de mul. p. 334. nimis magna *Bradley account of the works of nature* d. 169. Numerus incertus est. Duo tantum vidit *Bartholinus hist.* 98. Cent. II. septem, octo *Nigrifolius* p. 22. viginti ad triginta *ETMULLER*, viginti *Garmaun.* Plena sunt liquore, alias ex luteo pellucido, alias turpi opaco, alias mucis simili. Sero lacti comparabat *Vesalius* & in hystericis croceum viderat p. 658: Est etiam, ubi praeter liquorem flavum irregulare corpus intus reperi, de quo alibi. Membrana robusta est, sed undique adnata carni ovarii, a qua vasa habet, per membranas evidentes distributa *Swammerdam prodr.* p. 20. *Graaf* p. 227. *Berger* p. 456. qui etiam nervorum meminit. Nunquam autem ova ita dissoluta vidi, aut credo apparere, qualia pinxit *Swammerdam* T. II. III. & dicit se vidisse p. 20. Sedes in ovario ex maxima parte in ambitu est *Graaf.* T. XVI. ut casu fiat, si aliquando in medio majora, miliacea parva in ambitu fuerint, quod *ETTMULLER* & *GARMANNUS* habet in *SCHURIGII syll.* p. 112.

VESALIUS primum, l. c. p. 658. & *exam. obs. Fall.* p. 135., deinde, cum semen quae reret, aqueo vel luteo succo turgentes vesiculas vidit *Fallopianus obs.* p. 195. b. In ruminantibus testes vesiculis plenos reperit *COLTER* p. 124. quarum aliae aquam, aliae liquorem luteum continerent. Connatis vesiculis testes in femina constare *SAL. ALBERTI* p. 103. *RIOLANUS* muliebrem testem racemum esse, ex quinque vel sex vesiculis p. 119 *SPIGELIUS* verba *COLTERI* fere repetit p. 260. de *D. MAR-*
CHET-

CHETTIS eas pariter vesiculas vidit p. 44. multasque addit fuisse. Vesiculas in glandulosa materie ovarii habet *Wbarton* p. 225. limpidio semine plenas p. 222. Ova vero esse *Ni. Stenonis* auctor est, & *I. van Horne* l. c. nam neque *Drelincourtius*, de octimestri partu, neque alii, quos adeo multos excitat *de fem. ovis* p. 589. neque *Honoratus Fabri* vesiculas pro ovis & hospitio hominis habuerunt. *Baldus* autem *Angelus* utique viperarum ova vidit, minima, in duplici vulva longe disposita, & minime ignoravit viva inde animalia nasci *de vip.* p. 41. 54. ad quadrupeda vero inventum nunquam transtulit. Deinde praeter ea, quae in se dixi, peculiariter, densam ovi membranam, & sub ea vasorum rete *Malpighius* habet *ad Spon.* p. 31. facile visibilem etiam inanito ovo Eam alii in duas partiti sunt *Muralt.* p. 220. in equa, *Keil,* p. 105. *Stokhamer Bohn.* p. 22. *Nigrisoli* p. 22. exteram nam densiorem, interiorem subtilem; pellucidam **NIGRISOL.** & in asina denique **VALISNERI** duas membranas, vasque in primam, hinc in alteram euntia, & internam faciem villosae similem describit c. IV. p. 3. **NIGRISOLIUS** autem l. c. glandulas minimas internae superficiei addit; in quas vasa terminentur, microscopio visibiles, sed nemini praeter eum hactenus visas Vasculorum vero petiolum, ex quo penderet ovum, passim invenies *Phil. trans. Abr.* III. n. 212. **NIGRISOLI** p. 22. **LIEUTAUD.** p. 362. cum ego non petiolo aliquo, sed undique connexa reperiam. Cum ovis piscium summa adfinitas

tas est. His enim pariter duae membranae sunt, & humor intus crystallinus absque vitello STEN. *myol. spec.* p. 146. Similia etiam sunt in plurimis insectorum, ut cochleis *Ant. Felix Marsigli in epist.* n. 9. Dudum *Aristoteles* avibus ovum bicolor esse, piscibus unicolor *de gener. anim.* L. III, c. 1. & *Needhamus de form. fet.* c. 3. qui Rajam solam excipit, Hoc recte *Nigrisoli* monet p. 21. qui addit, trutarum ovis & similia esse, & aequalia p. 22. Ex *Nigrisolio* *Paitionus Disc.* III p. 14.

g* *Lymphatico, in Textu.*) Totum ovum facculus est liquore plenus, qui ad ignem coagulatur *Swammerdam* p. 45. *Drelin-court. parerg. de ovis* n. 4. *de fem. ovis* p. 591. *Muralt* p. 220. *Tauvry* p. 47. *Sbaragli* p. 349. 393. *Kerkring in antrop.* c. 1. *Peyer obs.* p. 37. *Graaf* p. 309. 310. *Verheyen* p. 130. *E. N. C. Dec.* III. ann. 9. 10. *obs.* 191. *Nigrisoli* p. 22. *Valisneri* c. 3. *Teichmeyer de generat.* n. 31. *Brendel in Schacheri diss. de virg. bydr.* Keil. I. c. *Douglas Phil. trans.* IV. p. II p. 116. *Manget. Theatr.* II. p. 63. *Gandolphe hist. de l'acad.* 1703. p. 33. ut omnino ova, uti in gallina, cocta indurescant *ELSHOLZ E. N. C. Dec.* I. ann. 6. *obs.* 191. idemque in plurimis quadrupedibus verum esse reperit *REDI degli anim. viv.* p. 78. Blandus est liquor & albumini similis *Manget* l. c. in sue, *Stenonis A. H.* II. p. 229. in asina: ut subausterus *VENETTI* sapor, aut subacris urinosus *GEUDERI* apud *SCHURIG. muliebr.* p. 341. & experimenta, in quibus *SBARAGLI* vidit liquidum ovorum non coivisse p.

Inclusa) Ut nullo nisi duplici tempore foramen in ea membrana reperiatur ^h.

Haud queat) Uti nemo masculini testis fabricam hætenus explicavit, ita neque femini testis structura exposita est. Testis masculus non potest in glomerem explicari, & erravit BELLINUS ⁱ, quando vas seminale credidit ejus longitudinis esse, quæ conficitur habita ratione ponderis totius testis ad breve aliquod filamentum, quod explicaverat, & lanci appenderat. Ita confecit, vas seminale trecentarum ulnarum florentinarum longitudine esse. Sed mille sunt vascula seminaria, brevissima omnia, quod per RUYSCHII præparationes nunc certo scitur. Verum in teste feminino longe difficilius est detegere quidquam: cum neque NVCKIUS artificiosa sua mercurii injectione, neque RUYSCHIVS felicissima sua cera aliquid de hac structura detexerit. Videtur, arterias ubique quasi desinere, venasque in superiori parte ovarii primum incipere, neque vasa alia reperiuntur, & tamen ex his ipsis vasis contextis certissime componitur ovarium. Quæ vero alii de fabrica testis muliebris scripserunt, ea fere ficta sunt.

Sphæc.

393. omnino ad putredinem referam, quæ & acres & volatiles reddit humores. Aliquando ita viscidus est, ut cum lente crystallina comparaverint EDMBURGENSES T. V. p. 337.

^h Vide proprio loco inferius.

ⁱ DCXLIII.

Sphaerulae) In omni ^k femina humana, aut bruta, in perfecta sanitate extincta, quando in vigore aetatis constituitur. Haec
solus

^k Omnino in omni animalium genere hujusmodi bullae reperiuntur, PARISINI *de tigr. avibus*, insectis, piscibus, minime excepta anguilla, uti ante VALISNERIUM *Phil. trans.* n. 231. ALLENIUS vidit, deinde in *A. Suec.* Vol. 1. p. 476. confirmatum est. In cochlearum omni genere LISTERUS vidit, & ANT. FELIX MARSIGLI l. c. & ponentes ova cochleas C. GESNER, in limacibus HARDER *apiar* p. 36. In quadrupedibus viviparis, & in feminis humanis plerumque reperiuntur, ut nihil sit, quare NIGRISOLIUS suam ovorum visorum historiam pro re memorabili recenseat p. 17. 22. uti non oportebat a CONTIO negari adeo vulgare experimentum GIORN. *de letter.* T. XII. p. 281. &c. Reperiuntur porro in cane, fele SWAMM. *prodr.* p. 19. mure l. c. ubi addit, in utroque genere valde protuberare, in leaena Parisini, Redi, lynce, tigride Parisini, ursa Redi, sue Peyer. *merycolog.* p. 49. simia Parisini, porcello indico Sten. taxo Idem ib. equa Peyer. *exerc.* p. 153. & Muralt. p. 220. asina Redi. Inter ruminantia in vacca Graaf T. XIV. f. 1. XV. Redi, in buffalo Idem, in cerva Idem in dama Idem in ove Leeuwenboeck *anat. & cont.* II. p. 165. & in omni demum quadrupedum genere Graaf p. 229. Peyer ad Muraltum in *vadem.* p. 400.

solus bene descripsit MALPIGHIUS¹: tribus nempe ova constant partibus, calyce glanduloso, duabusque membranis. In venere magis eminent, *Ca-*

- 1 In femina sana suspensa, ex ovario vidi quasi baccam protuberare, succo plenam, rimosam, acinosam, ex vasis de ovarii substantia suspensam, facile separabilem. In alia femina suspensa, cujus ovario tuba adhaerebat, bullam similem avellanae vidi, plenam aqua sordidi coloris, cinctam ad basin corpore ex luteo fusco, lacunato & granuloso. Deinde in gravida puella, 2 vel 3 mense, corpus luteum olivae simile, flavum, acinosum, sinu medio, sed caeco divisum, non pervio foramine apertum, sed caerulea, debili, membrana clausum vidi. In alia quinquagenaria muliere duos lenticulares sacculos flavos, duriusculos, cavos vidi, quartam partem pollicis longos. Sed in gravida quinto vel sexto mense, felicior corpus luteum vidi, magnum, rotundum, luteum, acinosum, membrana ovarii comprehensum, in medio cavum, inflabile per foramen externae membranae, subrotundum, inflammato circulo rubente cinctum. Totus iste calyx, nexus equidem ovario cellulosa tela & vasis, facile tamen enucleabatur. Satis adeo certum est in feminarum, etsi non omnium, ovariis reperiri, glandulosa cavata corpora, quae proprio canale cum foramine membranae externae communicent. Ea vero fibrosa esse, aut musculosa, aut demum villosa, cum meis experimentis non consentit. Glandulosa esse mecum *Morgagnus Adv. anat. IV. p. 78,*

Calyce) Calyx five capula glandis hujus corporis similis est. Quando sanæ vaccae ^m ovarium ex corpore resolvitur, im-

^m Primus COITERUS glandulas ovariorum vaccinatorum vidit p. 124. Diu neglectae, a GRAAFIO visae sunt in vaccis, globuli nempe, radiatis facti particulis flavis, in medio in membrana limpidum continentes liquorem, quo expulso fovea superfit p. 227. T. XLV. f. 1. IDEM ex ove cum cavea sua expressit T. XLV. f. 4. 5. tum eminentia cum foramine suo f. 2. ex cuniculis vero T. XXV. P. Q. & fuscè descripsit C. XVI. in his bestiolis vidit hos folliculos a coitu opacos fieri, & rubentes, & vasculosos, & ex ovario eminere p. 305. nihil enim aliud omnino sunt, quam lutea corpora. Porro HOBOKENUS in vaccis auream glandulosam substantiam descripsit de *secund. vitul.* p. 230. & pulchre depinxit f. 35. 36. SWAMMERDAMIUS apud SCHRADERUM in *Praef.* corpus fibrosum flavum, cum foveola in gravida muliere vidit. Deinde N. STENONIS in asinae ovario appendiculas calycum similes describit A. H. II. p. 229. & corpus triangulare multa ova comprehendens IB. in mula vero corpus glandulae conglomeratae simile, cavum, liberum, extrema parte existente p. 230. ELSHOLZIUS corpus, nuclei cerasti mole, spongiosum, rubens, in infanticida vidit l. c. & pingit, sed inclusum ovario f. 3. PEYERUS autem in ove tubercula rubicunda, globosa, fibrosa, sive papillas ad MURALT. p. 414. 415. tum in

immittitur tepidae, & diu inmergitur, tunc adparent vasa lymphatica. Ergo superficie exterior removeatur, quae fabri-

in damis DCLXXIX. not. 1. corpora glandosa descripsit *Merycol* p. 49. fibrosa, & ova globosa in porcis praegnantibus protuberantia non videntur differre, quae ibidem citat. Sed MALPIGHIIUS eorum naturam profundius introspexit, tum in vaccis, tum in mulieribus, glandosum nempe corpus esse, simile capsularum renalium ad *Spon.* p. 32. componi lobulis angulosis, quasi ad vasa appensis & ex varicosis propaginibus luteis compositis p. 31. cavea, pili mole excavari, l. c. plena diaphano humore concrescibili, patente in foramen papillae ovarii p. 33. extus habere tumores inaequales, & fibras carneas alte se insinuantes, & vasa sanguinea, propriamque membranam papillae excepta, quae sola membrana ovarii tegatur p. 31. cavum illud membrana tuc-tingi, quae instar ramorum, per substantiam corporis lutei deducatur, ejusque ramulis lobulos appendi p. 31. *Lincolntius* calyces nerveo-carnosos describit *Perioch.* 12. quibus ova immatura valide, matura levissime nectantur *Per.* 13. ovum expellere natos ib. carneis suis, quas tribuit, fibris: neque alia forte sunt corpuscula conglobata, quae in puerperae teste vidit *de femin. ovis* n. 15. COLLINS eadem recepit p. 606. 607. neque alia forte sunt minutae ovarii glandulae, quas ait succum pro vesiculis praeparare p. 590. 591. BARRATI ova
I 4 quan-

fabricam ovarii coerces, apparebit interior facies ovarii, scabra undique & plena tuberculis, sive corporibus luteis:
Ea

quantum ex VOGLIO video p. 22. cum intus varias protuberantias habere dicat, omnino corpora lutea sunt. Huc forte pertinet ovum olivae magnitudine, quod in hystericae virginis ovario vidit DENYS *conferenc.* p. 64. & ovum forte feminae, in magno ovario ita turgens, ut eximi posset C. BARTHOLIN. *exerc. miscell.* 2. p. 42. nisi hydatides fuerunt. TAUVRYS haec corpora lutea etiam carnis fibris mista describit, & papillam efficere pro expellendo ovo p. 56. 57. Deinde VERHEYEN. globulos eminentes in sue vidit ll. p. 316. & papillam in vacca ex coitu protuberantem p. 314. auctam in inpraegnatis p. 313. tum in ove p. 315. BOHNIVS recte, secundum mea quidem experimenta, negat musculosum esse p. 13. FERGERUS in puerpera cavum, & protuberans describit p. 457. SBARAGLI saepe vidit corpus ex teste erumpens, flavum, cujus capsula per graviditatem dehiscit, p. 453. BRENDLIUM lego in gravidae ovario unum vidisse. RUYSCHIVS apud ELSHOLZIVM & MANGETUM in *bibl.* p. 551. ovi in teste sedem, nempe luteum corpus, spongiosum, cavum, in cavea rubris villis oblitum, vidit. Porro in *Thes.* Vl. n. 32, in femina invenit calycem ovi egressi oblitum rubicunda materie, villosa, in medio vero foramen & exiguum cavitatem, quam globosam, lente

Ea MALPIGHIUS calyces vocavit: vitellorum autem minimorum similes sunt, quae-

lente coeuntem describit *Advers. Dec.* Ill. n. 11. ex qua credit ovum prodiisse delicto calyce, eamque addit, paulo post coitum intus rubere, & villosam & scabram apparere 18. alibi vero 'a conceptu cavitatem in ovario intus rugosam vidit *Adv.* I. n. 2. DUVERNEYUS addidit, cavitatem listam cum vasis spermaticis communicare, & flatum eo dimittere, non tamen semper succedere experimentum (p. 241.) *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 242. 245. cont. f. 7. 8. 6. 3. plinxitque corpus avellanae mole f. 3. eminens, perforatum f. 1. &c. In ovibus perinde fere rubentem ex superficie eminentiam, intus vacuam p. 245. 246. Cl. GOELIKE adhuc juvenis in cane corpora glanduloso-fibrosa vidit eminere apud SCHURIG. *syll.* p. 50. LITTRIUS in femina, carunculam cerasi similem, intus glandulosam, extus musculosam, cavam, cavea in foramen membranae ovarii communicante vidit *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 384. & foramen ducens ad cellulam sanguine plenam 1705. *obs.* 7. & alias in femina; per foramen ovarii in cellulam incidit, vicinis partibus ovarii per vasa nexam, exterius rubram, musculosam, interius glandulosam flavam ib. p. 145. Porro carunculum pisi mole in ovario vidit 1704. h. 21. anno 1706. vero *hist.* 8. calycem vasculosum ex glandulosa & musculosa parte compositum. VALIS-

quale in gallinarum gallimacearum ovariis reperiuntur. Fabrica horum calycum singularis est,

NERIUS plurimum in ipsis laborem posuit, & in plerisque animalibus reperit. In vaccis papillam eminentem, cavitatem magnam triangulam, fabrica conglomeratae glandulae c. III. n. 17. & foramen invisibile n. 19. In ove separabilia eadem corpora, cava, cavitatem vasis vestita n. 22. In equo & haec, & mista nigra corpora T. 2. t. 3. In porca numerosa, plurimis vasis ad ovarium nexa, quae inter eximendum rumpuntur, plena liquore albuminoso *specificae leviae* c. 3. n. 15. In cane tria corpora spongiosa, a coitu tumentia, papillaria, extra venerem vero minima papilla destituta c. IV. n. 15. viscido liquore turgida, cava, intus liquore lymphatico, alias albuminoso plena, exiguo ostio n. 5. 9. per illud & laterales poros fundentia liquidum n. 7. 11. quasi sphincteribus cinctos n. 10. foramen vero ducens in caveam corporis lutei n. 3. substantiam quasi intestinulorum forma n. 6. 8. quae intestinula tubulosa ex acinis sive globulis componi videantur, & vasa admista habeant n. 10. In eodem animale extra veneris tempus corpora lutea parva, paucio liquido plena, non eminentia vidit c. IV. n. 14. In capra pariter papilla eminente conspicuum, cavum, foramine patens, lobulosum, valde vasculosum C. V. n. 4. simile fere in rupicapra n. 1. In fele plura, manifesto perforata ib. n. 3. In mure denique pancreatis specie, in medio fissa corpora, quae

est, carnea aut glandulosa; figura cava, unde nomen est. Ex ea cavitate corporis lutei emer-

quae facile ex ovario eximi possunt n. 8. In virgine libidinosa papillam eminentem lymphâ pellucente plenam glandulosam, ex rubro flavam, ab ovario distinctam vidit n. 16. SANTORINUS fissam a corpore luteo turgido membranam ovarii reperit *istor. d' un feto* n. 24. & *obs.* p. 224. ejusque alibi insignem magnitudinem in praegnante, cicatricem parvam n. 16. & *obs.* p. 227. cavum autem membrana cinctum, & ovi petiolum forte continens. Fabricam etiam cum intestinulis comparat p. 222. VATERUS a partu vidit *grav. app.* n. 17. in femina cerafo aequale luteum & spongiosum HILSCHERUS *de oper. gener.* p. 17. tum in vaccis, pisi in cellula sua capacia, & canibus: in femina vero denuo MOEBIUS *diff. in obs.* 2. GALEACIUS perinde, ut MALPIGHIUS, induabus feminis & foramen ovarii, & sub eo latens olivare corpus, ejusque caveam, & caveae in foramen communicationem, & glandulosam fibrosamque naturam, vasaque, quibuscum ovario adhaerebat *Comm. Bonon.* p. 128. 129. BIANCHUS calycem ovarii sive rotundam cavitatem, ab ovo superflitem, & reticulum vasculorum absque glandulosa fabrica describit p. 418. T. I. * TREWIIUS papillam & cicatricem ex femina pingit *Comm. Nor.* 1735. hebdom. 39. Cl. NOORTWYCK paulo diversa ratione, tuberculum T. IV. f. 4. & cicatriculam ad tuberculum paulo distans

emergit vesicula ⁿ aqua plena, quae sedet in cupula, & ab ea tota amplexu obtegitur, neque superficiem ovarii contingit, quan-

distans poro communicantem, in gravida delineat *hist. uter. grav.* p. 8.

n Ambigua quaestio est, an haec lutea corpora vesiculas prius dictas, tamquam calyces comprehendant? In oviparis, quod calyx dicitur, est exterior tunica ovium cum vasculoso pedunculo, qui adfixus manet racemo, quando ovum delapsum est GRAAF p. 297. RUYSCH *Thes.* IX. n. 16. In struthione describunt PARISINI calycem instar glandis apertum, vasculosum, producentem caudam, ovo adnatam. Addit TAUVRAY l. c. p. 52. ova calyce suo firmiter adhaerere. In quadrupedibus oviparis fere similia sunt, ut in testudine TAUVRAY p. 38. Deinde MALPIGHIUS frequenter involucrum luteum capreolatum super minimas vesiculas obduci l. c. p. 31. & in recens natis adnatam vidit luteam materiam p. 32. GRAAFIUS in corpore luteo manifestum ovum icona expressit l. c. T. XIV. f. 4. In femina videtur admittere WINSLOW. ut cuilibet ovulo suis quasi a substantia ovarii calyx accedat: n. 605. VALISNERIUS etiam in vacca sterili vidit, luteam sub ovis materiem c. III. n. 20. si recte intelligo. VERHEYENIUS in vacca a coitu rubescenti papillae insidentem vidit vesiculam II. p. 315. N. STENONIS in lupa basin ovarum cingi glandulosa substantia.

quando ovum immaturum est. Quando vero femina ad venerem fervet, tunc cavea caly.

stantia, uti in avibus ACT. HAFN. II. p. 226. DUVERNEYUS junior in vaccis vesiculam ex calyce dimidia parte eminare vidit *Mem. de l' Acad.* 1701. p. 245. f. 4. NIGRISOLIUS, cellulas suas, in quibus vesiculae nidulantur, glandulis ait incrustari p. 16. LITTRIUS autem inclusum calyci ovum in femina fuisse describit *Mem. de l' Acad.* 1701. p. 147. & anno 1706. n. 8. ex calyce ad dimidiam exeuns, calyce tamen retentum. RUYSCHUS *Thef.* VI. n. 32. omnino corpus luteum pro calyce habet. HARTSOEKER ova faccos esse plenos gelatina, & in calyce crescere dixerat *suite des conj. phys.* p. 112. BIANCHUS p. 417. corpus luteum omnino pro calyce habet, cui interventu placentae adhaerescat p. 47. 418. & pingit villosum calycem, qui ovum completitur. Manifesta tamen diversitas est calycis oviparorum, & corporis lutei. Ille enim est ipsa exterior ovi membrana, quae dimissa interiori in ovario remanet GRAAF. 1 c. p. 247. 268. RUYSCHUS *Thef.* VI. n. 32. *Adv.* III. p. 16. In homine vero & viviparis, nihil membranacei habet calyx, sed ipsius ovarii pars princeps glandulosa est, neque satis certo haecenus vesiculas ovarii luteo corpore ambiri visum est. conf. not. p. Hinc factum est ut DUVERNEYUS major nullus in mulierum ovariiis calyces reperiri objiciat ZOD. GALL. *Ann.* II. M. Mart.

o Corpora lutea veneris tempore decimum generari

calycis lateſcit , & veſicula ita turgēt °, ut pene tota libera ex ovarii ſubſtantia emineat, calycemque ſoli baſi adpoſitum habeat.

Hoc

nerari & conceptus, neque prius adparere, ne in puellis quidem 13. & 16. annorum, GRAAFIUS p. 314. & BOHNIUS dixerat p. 10. KEIL p. 109. 110. atque in fetis vaccis ſolis reperiri HILSCHER l. c. GRAAFIUS denique poſt conceptum ex veſiculis generari, quas vulgo ova dicunt p. 231. atque adeo poſt coitum emergere p. 227. Verum omnino ante coitum dudum generantur MALPIGHIO jam obſervante p. 32. & repetit BERGERUS p. 458. non in virginibus ſolum SANTORINO teſte p. 223. ſed in ſue tenella VALISNERI c. III. n. 16. & in parvis muribus incipientia lutea corpora c. 5. n. 8. & in agna demum trimestri c. 3. n. 25. & in vaccis virgineis VERHEYEN II, p. 313. Deinde pauca ſucceſſive prodeunt VALISNERI c. 17. n. 4. & lente augentur c. IX. n. 4. verſus eam aetatem tamen, quae ad venerem apta eſt, majora ſunt c. I. n. 7. & veneris tempore inſtar papillae eminent c. IV. n. 7. 12. PEYER l. c. DCLXVIII. not. 1. ſuntque maxima VALISN. c. IV. n. 7. & in brutis, & in feminis, ut exemplum habet SANTORINUS *iſtor.* p. 24. ut toto ovario in adultis porcis majora ſint VALISN. c. 3. maximae vero parti ovarii in vacca aequalia IB. n. 17 & DUVERNEY *Memoire de l'Acad.* 1701. p. 241. & majora c. 3. n. 17. conf. MALPIGH. p. 32. In ove vero n. 28. & in cane catuliente c. IV. n. 7. ſimi-

Hoc clarissimi viri ovum femineum dixerunt, verum ovum non est pellucida bullula, ali-

simili mole observantur. In cuniculo ex GRAAFII iconibus citatis nihil in ovariiis praeter folliculos adparet. In femina duae cellulae consumserant ovarium LIT-
TRE 1701. p. 144. & in praegnante femina magnam ovarii partem luteum corpus tenere observat SANTORINUS viditque *istor d'un feto* n. 16. Sed & Lit-
trius vidit in praegnante, & fetum credidit continere non omnino minimum. *Mem. de l'Ann.* 1701. p. 147. Aliquo adhuc tempore ab inpraegnatione crescunt in ove Verheyen p. 35. Deinde paulatim decrescunt, & prima papilla promi-
nens retrahitur, atque evanescit TAUVER p. 58. sensim autem in graviditate etiam corpus luteum minuitur, ut magnum sit quando fetus parvus est Keil. p. 109. 110. VALISNERI c. 3. n. 22. & etiam intra quatuordecim dies decremen-
tum distingui possit VALISN. c. 3. n. 21. 22. Ipsa aliquando evanescit cicatrix Valisn. c. 10. n. 15. ut ultimis mensibus corpora lutea solida videantur Graaf. p. 228. tunc sensim evanescent Barthol. *specim.* p. 122. Malpigh. p. 32. Berger. p. 458. In porca praegnante corpora lutea jam inania & coacta, & foramine destituta Valisnerius vidit c. III. &c. In capra pariter decrepitem luteum corpus reperit Idem c. V. n. 4. contracta a partu in cane VAL. 5. n. 17. & valde diminuta Graaf p. 310. non tamen destrui in femi-

aliquot liquoris guttulis plena, uti descri-
pserunt plerique; sed cupula sphaerulam
conti-

feminis *Santorinus* recte observat p. 225. In puerpera vidit superites *Littre* 1705. *hist.* 7. & a partu papilla ipsa aliquando superest *Bohn.* p. 19. tum luteum corpus *VATER gravid. app.* n. 17. Quae ego vidi, eorum aliqua uno alterove anno ab ultimo partu superfuisse necesse est; uti duobus annis a partu superstitia, pallida, designantur cicatriculis *Santorin. obs. anat.* c. XI. n. 15. Pro iis autem, quae confu-
nuntur, nova sensim recrescunt *Valisn.* c. IX. n. 5. pauca simul & lente. Ita in mure post abortum septem nova renasci vidit *Idem* c. 5. n. 5. & in praegnante capra novum subcrescere *IB.* n. 4. & cum majoribus minora in equa simul adesse c. IV. n. 1. Videntur cum istis consentire observationes *Graaf.* ll. p. 312.

Numerus incertus est. In suis undecim, & ad viginti usque vidit *Valisnerius.* plura nempe, quam fetus *ib.* n. 14. uti sex in fele pro quatuor fetibus c. 5. n. 4. tum *Malpighius* p. 31. se plura vidisse testis est, quam fetus fuerint, & *Graafius* p. 302. In cane aliquando tot quot fetus *Valisn.* c. IV. n. 1. quinque nempe, & in ove n. 28. c. IV. sub finem, & in cane pariter *Hilfcher* l. c. p. 17. In ove praegnante duo *VAL.* c. ll. n. 24. & in universum in multiparis numerosa, in pauciparis & in femina imprimis pauca, & in istis, quantum video solitaria sunt. Non quidem definiri potest, tot omnino esse quot fetus: quam legem

Peyer

continens p, & eo major pro sphaerulae
 portione , quo animal longius a conceptio-
 ne,

Peyer ad Muralt. p. 414. 415. et Keil p. 110. habent ex Graafio p. 308, ortam. Sed numerus, quo lutea corpora excedunt, referri potest ad eos casus, per quos nonnunquam ova destruantur aut in abdomen effusa evanescent Drelinc. de sem. mul. n. 25 Vide mecum sentientem Verheyenium II, p. 312. per experimenta in cuniculis capta.

p Ex his vocibus adparet, Praeceptorem a *Malpighii* sententia non alienum esse. Is nempe ova vulgo dicta non pro veris ovis habuit p. 32. uti neque *Valisnerius* c. 9. n. 9. sed pro organis secretoriis, et plures vesiculas credidit in unum luteum corpus absorberi, cum maturum idem ovarium pene totum occupet, tuncque vesiculae fere evanescant p. 32. VALISNERI c. IX, n. 7. verum autem & genitale ovum contineri in papilla rotundum, ut MALPIGHIVS credit p. 31 milio aequale p. 32. 31, id sensim erumpere putat IDEM ex protuberante papilla, a carneis fibris expressa, per hiantem sulcum, & a reliquo ovario pene dissoluta p. 33. & aperta ante ovi exitum VALISN. C. 9. n. 6. qualia etiam in muribus vidit VALISNERI C. V n. 8. Luteum vero corpus filtrare pro ovulo, quod ex eo prodit succos, quos vascula ovi resorbeant MALP p. 32. Similia fere BERGERVS habet p. 458 Addit VALISNERIVS, eum succum prius in vesiculis praeparari, praeditis villosa fabrica vasculosa, qualis

distat, eo minor quo instat propior. Haec ipsa
cupu-

in intestinis est c. IV. n. 3. & eundem
succum in intestinorum similibus
tubulis lutei corporis secundo depurari
c. IX. n. 16. tum demum fetum alere.
Eadem sententia *Santorino* est, & *Morgagno*
Adv. anat. IV. n. 28. p. 51 qui tamen a
Malpighio diversi sunt, quod ovum verum
in luteo corpore profiteantur se nunquam
in tot experimentis vidisse, credant ta-
men in centro corporis lutei esse *Valisn.*
c. IX. n. 17. nimis forte tenerum ac
pellucens, quam ut sub oculos cadat in-
tegrum i. b. sub finem. Sed etiam *Graafii*
experimenta consentiunt, cum fateatur
ovum in tubis cuniculorum decuplo,
quam in ovario, minus reperiri p. 307.
& in T. XXVI. t. 1. collata cum T.
XXV. & nullibi ovum dicat se folliculo
circumdatum vidisse. *Paitonius* denique
fuse pro *Malpighio* dixit *Disc.* III.

Qui vero ante *Malpighium* scripserunt, &
recentiores plerique, non invisibi-
le aliquod ovum, ut *Valisnerius*, neque
minutum & a vesiculis diversum ut *Mal-*
pighius, sed ipsam vulgo notam vesicu-
lam ovarii aliquam calyce comprehendi
credunt, ipsumque corpus luteum esse
quidem filtrum, quod succos pro ovo
praeparet *Bohn.* p. 19. vi tamen comprimente
fibrarum vasa contringere, quae ovum
alebant, ut marcido petiolo sponte de-
abatur *Drelincourt Perioch.* 13. *Tauvry*
p. 53. 56. 52. *Bartholinus spec. anat.* p.

cupula cum sphaerula in uterum delata; excrescit ibi, abitque ovum in amnion & chorion a, aqua plenas, ita, ut fetus non in cupula, sed in expansa sphaerula sedeat; liquor vero contentus, tenuior equidem albumine, perinde tamen ad ignem cogitur.

Binis) Quae separari possunt. Earum exterior in chorion fit, interior in amnion: capu-

112. *Peyer merycol* p. 49. Hujus sententiae auctores dixi not. e. *Bianchus* praeterea, quod passim velle videtur *Praeceptor*, corpus luteum in placentam abire credidit p. 49. valde praeter veri speciem, cum in ovario maneat: hinc calycem a corpore luteo diversum fingere cogitur p. 47.

In obscurissimis quaestionibus, de lite quidem *Valisnerii* cum *Malpighio* nihil definitio, cum verum & ab omni hydatide diversum ovum nondum viderim, nisi forte D. W E Y G A N D I observatio in phocaena facta pro *Malpighio* definiat, ibi enim ova, semini papaveris aequalia, ex ovario, per foramen membranae externae ab auctore expressa leguntur *Breslau. suppl* IV p. 53. Pro corpore luteo vero contra ova vulgo dicta multa militant, quae dicuntur ad D C L X X. not. o. ut omnino credam, certo tempore, in vesicula una, ut *Santorinus*, vel pluribus, in medio liquido generari corpus luteum, tunc vesicularum, munere functionum, formam destrui, in luteo vero corpore subnasci verum ovum, in quo sedes futura est homuncionis. Ita fere *Santorinus*

cupula vero fit in placentum, quae ex ipso ovo nascitur, neque uteri productio est, licet in eo crescat. 1726. Semen denique in medio ovulo haeret, cinctum his membranis, et in infantem formatur.

Parva) Minima in puella tenera, sed ita, ut possint demonstrari.

Vieta)

p. 222. & utcumque *Graaf* p. 230. & *Malpighius*, ovum materiem esse ex qua forte corpus luteum excitetur p. 37. Vide mire consentientia experimenta *Graafii* c. 16.

q Ita olim *Graaf* p. 278. *Drelincourt de hum. fet. membr. de sem. mul.* n. 7. 12. *de conc. Perich.* 34. *Swammerdam prodr.* p. 20. *Kerkring ad T. I. Bohn* p. 22. Sed inferius plura sequentur.

r Vesiculas in fetibus murinis reperit *Valisneri* c. 5. n. 5. 9. & in minutis muribus c. 5. n. 8. In fetu vituli *Harder apiar. obs.* n. 8. In recens natis *Malpighius* p. 32. In cane ante biduum nata *Valisneri* c. IV. n. 18. In vitulis 4. 5. hebdomadarum magna & nihilo minora quam in vacca *Leeuwenboeck exper. & cont.* II. p. 174. In agnis teneris *Sbaragli* p. 490. In agno trimestri conspicuae *Valisn* c. 3. n. 25 & in sue tenera c. 3. n. 16. In fetu humano recens edito *Peyerus* vidit *exerc.* p. 100. in quinquenni virgine conspicua ova *Valisn* c. 5. n. 22. et in octenni *obs.* 2. et tredecenni *Harder apiar. obs.* n. 77 Non ergo recte *Bohnius* in junioribus vesiculas minimas esse p. 3. et sensim augeri per aetatem; neque *Nigrifolius* qui sub fecunditatis decimum tempus ait apparere p. 81.

Vieta) Femellis tum brutis tum humanis ovaria pereunt^s: viriles vero testes nunquam delentur. Nempe NATURA aetatem statuit, post quam nulla femina conciperet, pro maribus autem nullum ne effoetissimis quidem certum tempus sancivit, quo elapso generare nequeant. Britannus ille longaevissimus^t centum & viginti annos natus adulterii reus fuit, & coram tribunale debuit respondere, & non diu ante id tempus prolem generaverat, quantum quidem ex humana fide constare potest.

Veneris) Sive per ludibria insomniorum^u, sive per venerem naturae lege exercitam. Homines enim utriusque sexus, fecus

^s In femina quidem minuuntur, indurantur not. d. *Sbaragli* in annosa vacca ita non deleri ait, ut majora sint quam in vitula p. 419 & de vesiculis idem dicit p. 290. & corporum luteorum in vetula tenuia vestigia vidit *Valisneri* c. 5. n. 21. Gallinis autem utique tota evanescunt ovaria *Graaf* p. 247. *Harvei*. p. 8. & uterus p. 24. Rationem diversitatis exposuit *Tauvry*: viviparorum enim ovaria propriam carnem habent, ovaria oviparorum pene meri sunt racemi ovorum, ut nihil supersit istis destructis. Ita piscibus & lacteae vesiculae, & ovaria post coitus tempus perfecte inania sunt *Harvei*. de gener. p. 7. & in viperis *Baldus Angelus* p. 41.

^t DCLVIII.

^u Argumentum urserunt varii contra ovorum defensores, gallinas nempe & anseres & per di-

fecus, quam bruta animalia, in somniis eadem tentigine adficiuntur, quam per vigilias sentiunt, & perinde semen frugiferum viri ejiciunt, ovaque sua ex ovariiis mulieres, uti in robusta & legitima venere.

Emi-

ces (*Aristot. de gener anim. L. III. c. 1.*) etiam virgines *hisor. anim. L. VI. c. 2.* ova subventanea parere, feminas humanas minime *Vogli c. 2.* & fuisse *Sbaragli.* Verum recte *Valisnerius c. 20. n. 6.* gallinarum ova perfecta in ovario esse, feminarum ova post conceptum demum forte nasci & solvi ex ovo corpore: & rara esse in feminis, quae uniparae sint, & aegerime demum observari *c. 18. n. 20.* Deinde, si fides auctoribus, etiam feminae variis temporibus ova deposuerunt, non impraegnata solum, quae inferius dicentur, sed adfinia subventaneis. Ita KERKRINGIUS fieri credit referentibus etiam virginibus, *anthropog. p. 3.* & DRELINCOURT, *perioch. 19.* & ova cum mensibus egesta GARMANNUS habet in *epist. de ovo*: GOUÉY ex sola voluptate delabi in uterum, ibique fecundari, ut etiam a clystere irritatae aliquando vesiculas pepererint scribit *p. 76.* 77. in versione D. HOFMANNI, PAITONVS fere eadem ratione ova matura absque semine masculo de ovario solvi, inque uterum descendere credit *Discorsi IV. p. 82. 83.* Virgo lascivior ovum peperit cum mensibus BRENDÉL. *de embr. p. 36.* Bullula clara a femina in pollutione excidit DIEMERBROECK *p. 134.*

Emineant) Hae sunt mirabiles observationes GRAAFII x. Femella cuniculi ad marem admiffa fere certo concipit, ut raro omnino fallat, & quatuor quidem vel quinque fetus ex uno coitu fufcipit. Quot fetus concepit, tot poft coitum bullae in ovario prominent, quod certum eft ex plurimorum experimentorum confenfu. Hae bullae craffefcentes emergunt fupra ovarii fuperficiem, elevant ambeuntem membranam, eamque dilatant, donec ultimo bulla per foramen membranae ex ovario prodeat, & extus emineat, arctata intus, & ad calycem adhuc haerens y; Tunc vero actio-

x C. 16. centum vero cuniculos, & quadraginta oves fecuit p. 367. Nempe hora vigefima quarta ovorum fecundati folliculi opaci fiunt & dilute rubri, [Intelligit corpora lutea], & papilla incipit emergere. Vigefima feptima hora tubam ovarium amplexam, papillas manifeftas, liquorem ftillantes vidit. Quinquaginta horis manifeftius in folliculis glandulofam materiem, caveamque adparere T. 25. Z. Poft tria nycthemera papillare tuberculum glandulofum perforatum, & in oviductu ova minima, gemina tamen membrana cincta. Poft quatuor dies ova haec ulterius provoluta verfus medias tubas &c. Quae omnia cum VALISNERIANIS apprime confentiunt. Caeterum W. LANGLEY fimilia cum cuniculis experimenta fecerat, & exftabat codex obfervationum SCHRADERO teftes in
ebf

y Non habet GRAAFIUS, neque ovum vidit, nifi in tuba.

actione tubae fallopianae deglutitur, fertur in uterum, & fit in ovum in praegnatum, nisi tale prius fuerit, & relinquit in ovarii substantia cicatricem, quae, coalescente membrana ovarii, sensim evanescit. Hoc nunc admirationem meretur, quod hoc corpusculum de ovario separari possit, cum tamen totum ovarium ambeatur membrana^z, nihilo minus densa, quam faciei epi-

z Ex argumentis est, quae contra ova proponuntur a DUVERNEYO in ZOD. GALL. l. c. MERYO *hist. de l'Acad.* 1701. p. 48. eqq. LAMYO & aliis. Verum multa responderi possunt. Fissurae enim minimae sensim dilatari possunt, uti vasa dilatantur, quae, destinata vaporari, sanguinem transmittere debent, ab urgente ovulo & contra naturalem, sed minimum foris nitente. Ita DRELINCOURTIUS „ ova sensim membranam testis dilatare, non rumpere *de femin. muliebr* n. 13 & omnino lego „ vesiculam magnam, eminentem, ita intumuisse, ut membranam ovarii pene disruperit, eaque adtacta dissiluerit *E. N. C. Dec. II ann. 9. obs. 224.* Et frustra certe negatur membranam ovarii pro ovulo findi posse, quam infinita exempla docent omnino fissam reperiri not. *ff.* Ita etiam in ranis membrana communis ovarium continet, quas tamen nemo dubitat ova parere VALISN. c. XIX. n. 8. conf. PAITONI *Diff. III.* p. 14. tum in Rajis, canibus piscibus LITTRE *Mem. de l'acad.* 1701. p. 146.

epidermis. Deinde, quo modo exeat, quaeri potest. Verum etiam alibi leges naturae adeo admirabiles esse novimus, ut nihil addere possimus de ingenio. Tota medicina frustra explicaret vires ad conceptum, alimentum, aut partum fetus: nihil certe promoveret. Verum experiendo leges invenit, quae omni hypothese repugnant. Homines entia & eorum modos non intelligunt, uti CREATOR intelligit, neque a prima origine rebus adfuerunt, & tamen qua sunt superbia, ubique definire sustinent. Emite fetam gallinam, sanam, vegetam, inspicite uterum: videbitis ovarium, sive vitellarium, quod lumbis adpensum est, plenum luteis corporibus fere triginta; in eorum minimis solum fere ^{aa} luteum corpus adparet, absque ullo pene bullulae vestigio, quae in centro latet: majora vero habent vitellum ^{bb}, ex cujus centro albumen eminet, super utrumque autem & vitel-

^{aa} GRAAF p. 292. omnino ait solum albumen continere, quae inter ova minora sunt. Sed idem magis serio p. 247. post HARVEIUM p. 7. solo vitello ait constare: & omnino in majusculis gallinarum ovis ita reperio. Ita in struthione se habere PARISINI auctores sunt. Particulas tamen albuminosas in vitellis ovario innexas mistas adesse, etiam HARVEIUS auctor est p. 102. cum coacti in lamellas abeant.

^{bb} Non habent, omnibus fere consentientibus.

vitellum , & albumen membrana se expandit. Saepe triginta hujusmodi ova adfunt. Omnia autem ova , tum quae ab exitu remotissima sunt , tum quae proxima , una membrana communi involvuntur : quae a subnaacente ovo ita extenditur , ut exituro vitello aperta iter concedat : quomodo fiat ? quaeritis. Lex naturae est. Hi vitelli ex centro primum ^{cc} , deinde sensim omnes ex ovario promoventur. Primum in eo ovo , quod tubae proximum imminet , & inter reliqua magnitudine eninet , nascitur ex medio vitello corpus ^{dd} binis membranis tectum , ne npe albumen , id cum incremento ovi emergit , & circa calycem extenditur , fit in ovum , albumine contans & vitello , quod in tuba fallopiana cortice duro cretaceo ^{ee} cir-

^{cc} GRAAF p. 245. confer T. XVIII. ubi centralia ova minuta , in ambitu vero majora pinguntur : In columbis sola duo ova perfecta reperiri , cum duo tantum pariant , reliqua minora esse. In Raja, COLLINS T. XLIII. pastinaca HARVEI p. 6. & in aliis piscibus magna parvaque ova in racemum congregantur COLLINS p 657.

^{dd} Nondum invenio. Solum vitellum exire , & membranam suam , quae tamen totum non ambit , calycis nomine in ovario relinquere GRAAFIVS ait p. 246.

^{ee} In utero. Haec calx accidentalis est , potestque abesse ab ovis. Comorrae galinae fere solis animalculis palustribus vivunt , hinc ova absque teste ponunt
BRUK.

circumfunditur. Ergo omnino extra dubium est, legem in animalibus oviparis sanctam esse, ut omnia ova ejusdem ovarii una membrana fortissime coerceantur, neque eo minus omnia, sed suo singula tempore, in tubam exeant per membranam non laesam, sed dilatatam: sive demum gallina marem admiserit, sive abstinuerit.

Foetu)

BRUKMANN. *epist. itin.* p. 98. Aliquando etiam nostrates molia ova pariunt HARVEL *de gener.* p. 28.

ff Cicatriculam, in textu Cum maxime desint, qui etiam foramen in ovario ingent, ut DUVERNEYUS senior, & LAMYUS, & perfricta fronte SBARAGLI p. 03. & fateatur se nunquam vidisse VERHEYEN II. p. 316. 317. &c. rem istam uberius vitum est proponere. Certum est ante conceptum & turgescientiam corporis lutei nullam rimam adparere GRAAF p. 268. SANTORINVS p. 223. (de virginibus) & TAUVRY p. 10. [de non imprægnatis], eamque rimam, postquam enata est, sensim iterum evanescere, neque semper perinde conspicuam esse SANTORINVS p. 225. neque debere nos abuti, ut multi solent, vagis illis & subcoeruleis ovarii fissuris, GRAAFIO dictis p. 225. &c. nimis copiosis, quam ut omnes ovum transmiserint MERY *hist. de l'acad.* 1701. p. 50. cum etiam in uniparis plurimas repererit MOEBIUS *diff. cit.* n. 1. etsi multiparas inde agnoscere velit LIBUTAUD p. 364. & fetuum numerum BLANCARD, & LITTRE

1702.

Foetu) Hujusmodi casus in EPHEMERIDIBUS GERMANICIS, ACTIS PARISIENSIS & BRITANNICIS passim exstant descripti. Feminae fuerunt, quae conceperunt, & utero feliciter gesserunt, passae sunt

1702. p. 281. Verum nihilo incertius est, dum tumet a coitu luteum corpus, sensim, & una lamina post alteram secedente SANTORIN. p. 224. in virgine, solvi membranam ovarii, quam corpus luteum turgens diducit SANTORINVS *ibid.* n. 24. ut in vaccis etiam adtenuationem membranae ovarii DUVERNEYVS viderit *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 241. & nasci foramen in apice papillae MALPIGHIVS p. 32. VALISNER. c. V. n. 4. in capra, in cane vero c. IV. n. 10. & sub finem, tum GOELIKE l. c. in fele VAL. c. 5. n. 3. in vulpe *ibid.* in ove GRAAF. T. IX. f. 2. &c. & VALISNERI c. 3. n. 24. 26. in vacca minimum & invisibile, sed ut tamen liquorem pressum emittit VALISN. c. 3. n. 17. manifestum vero & lunatum apud DUVERNEI p. 243. 244. *Comm. Paris.* a 1701. f. 2. 6. 1. valvula ibi aliquando praeditum p. 245. GRAAFIO etiam visum p. 268. & HOBOKENO f. 2. rugis radiatis circumscriptum, in lepore vero WALDSCHMIDIO dictam & NENTERO *physiol.* p. 320. Ergo ubique & in omni animali, modo exiguum, modo non minimam fissuram apparere, constat, quae in cavitatem corporis lutei ducit. Hanc fissuram & subjectam cavitatem plerumque in mulieribus videntur WEPFER *de cicut.* p. 124. SLADUS
ex

sunt tormina naturalia in partum exitura ;
& diu cum his conatibus absque spe lucta-
tae, cum neque obstetrix, neque vir obste-
tricius, quidquam in utero reperiret, misere
per-

ex RUYSCHIO in *Aët. Hafn. ann. II.*
n. 1. optime, & apud *Diemerbroeck. p.*
135. & in *Bibl. Mang. p. 550.* *Berger.*
p. 457. *Ruyfch. Thes. VI. n. 33.* *Adv.*
I. n. 2. Thes. XI. n. 20. *Littre hist. de*
l'acad 1705. obs. 7 & a. 1701. p. 184.
manifestissime, & a. 1702. p. 281. *Nigri-*
fol. p. 22. *Sarracinus* apud *Voglium, Goe-*
like apud *Schurig sylleps. p. 71.* & ex
proprio experimento p. 73. *Douglas*
abridgm. IV. p. 115. five tunc pridem
foramen adfuerit, ab ovo tantum dilata-
tum *Hartfoecker suit. des conject. p. 112.*
Taurvy p. 58. 59. five ab ovo urgente
formetur, quod minus probabile, *Littre*
tamen placuit *Mem. de l'acad. 1701.*
p. 146. & *Kerkringio, & Elsholzio.* In
cane *Valisnerius* praeter majus foramen
minora lateralia vidit, sphincterulis quasi
circumdatus c. 4. n. 7, 10. qualem etiam
majori adscribit. In femina *Swammer-*
damus apud *Schraderum* in praef. cicatri-
cem etiam, sub ea corpus luteum vidit.
Cl. vero *Noortwyck* foveolam quidem
rugosam reperit, sed poro quodam ducen-
tem ad tuberculum prominens, quod
lateraliter a cicatrice distabat, p. 8. T.
IV. t. 4. in cujus basi fissura esset *b* cum
vertex non perforaretur. Deinde eadem
cavitas lente minuitur *Ruyfch. Adv. Dec.*
III. n. 4. ipso tempore imprægnationis,
ut aliquando evanescat, aperto foramine
sed

perierunt. Incisum abdomen est, & reperi-
tus perfectus novimestris fetus, qui vel in
ovario esset ^{gg}, vel in tuba ^{hh}, vel in ipsa
cavea

sed collapsio *Valisn.* c. 3. n. 22. (in ove),
& semper, si *Valisnerio* fides, cum tem-
pore deleantur c. XI. n. 6. qui omnes
cicatricolas praeter naturam esse docet.
Ita etiam *Tauvryus* in femina visu diffi-
ciles esse fatetur p. 54. nullasque in multi-
para repertas, lego in *Bresh.* 1723. m.
Jan. Saepe tamen diu superstes est cicatri-
cula *Santorino* teste p. 225. etiam a partu
p. 19 & in puerpera *Wepferus* pisi capax fora-
men vidit, & in puerpera pariter *Douglas*,
post duos vero annos *Santorinus* c. XI. n. 15.
In vaccis semiluna i figura conspicua fo-
ramina pingit *Duverney* l. c. f. 6. 8. &
semper reperiri *Littrius* auctor est 1701.
p. 146. & *Lieutaud* p. 262. Vidit etiam
cavitates, ubi ova fuerunt *Sawammerda-*
nius prodr. v. 29. & *Peyer exerc.* p. 78.
& *Golicke* apud *Schurig* p. 50. & pingit
ex femina *Trew Comm. Lit.* 1735. n. 29.
T. IV. f. 11. Ego. secus quam *Valisnerius*,
saepe & magnis a partu intervallis reperi,
neque tamen perpetuo. Nam remota
causa extendente, ut alibi solet fieri, ipsa
vicinarum partium pressio minutulum,
neque resistentem, hiatum perpetuo mi-
nuit, ut primo membrana tenera caveam
corporis lutei protegat, & ipsa denique
ea cavitas deleatur.

^{gg} Exempla satis rara sunt. *Littrius* in ovo hu-
mano, adhuc calyci incluso, fetum satis
perfectum, cum funiculo umbilicali vidit
Mem. de l'Acad. 1701. p. 147. sed huic
hi-

cavea abdominis ⁱⁱ, ut tamen placenta sua ad ovarium adhaereret, cum interim uterus inte-

historiae *Santorinus* parum tribuit, tum *Valisnerius* c. XI. n. 7. Fetus in ovario exemplum video citari ex *Journ. de médecine* a. 1663. *Valisner.* c. 17. n. 21. In suis ovario fetus putrefactus *Aët. M Balth.* 1699. p. 47. In ovarii stromate non pili solum, quod nihil demonstrat, sed dentes *Phil. Coll.* 2. & *du Hamel hist. acad.* p. 265. & ossa praeterea cranii similia *Sampson Phil. Coll.* n. 2. *Tylon* apud *Grew catal. mus.* p. 8. aut cum dente alveus *Phil. trans. abr.* IV. p. 110. aut dentes foli *Ruyseh adv.* III. p. 6. T. 2. f. 4. 5. *Adv.* I. n. 2. aut denique caput cum dentibus *Duverney* apud *Venette* p. 253. Ex rupto ovario effusus fetus est, quem *Riolanus* descripsit, quinque uncias longus p. 181. & apud *Straoussium*, & alter quem descripsit *D. de S. Maurice* apud *Blegny ann.* IV. V. m. *Jan. Phil. trans.* n. 150. qui idem videtur citari a *Böttgero* *diff. de fetu praexist.* p. 7. & aliud exemplum *Vieussenius* habet apud *Mangetum theatr.* II. p. 140. aliud *Nourse*, fetus ex ovario elapsi, & per rectum intestinum excreti *Phil. trans.* n. 416. Huc etiam historiam suam refert *Bianchus* p. 169. sed ex ovario prodisse non liquet. Mola denique, nempe carnosum per e pollicare corpus, in ovario feminae apud *Littrium* describitur *hist. de l'Acad.* 1703. obs. 14. & moles carnea & ossea & cartilaginea apud *Mulebancher* in epist. ad *Lancisium*.

hh Vide DCLXVIII

ii Hujus modi exempla innumera fere reperio.
Fetus

integer, & purus. & inanis esset. Naturalis autem partus fit, quando ovum in uterum fertur, & in eo adolescit.

DCLXX.

Fetus absque laesione uteri inter uterum & rectum intestinum sedens exstat apud *Monconis* It. III. p. 457. Fetus maturus in ventre materno, hepati insidens, placenta ad lumbos posita, utero tubisque integris *Hist. de l'Acad.* 1716. n. 4. *Santorini* fetum per 23 annos gestatum subsequens conceptus videtur demonstrare non in utero fuisse. Fetus *Mussipontanus* triginta annis gestatus, pene lapideus, rariter integro utero in abdomen effusus fuit: v. *Straussii & Lauthieri* descriptionem p. 1. sed ei rarum tribuit *Patinus* ad *Barth. Ep. Cent.* III. n. 83. & omnis fides derogatur *Cent.* IV. n. 51. *Senquerdus* etiam historiam *Dolensem* excitat. Fetus post quindecim etiam annos gestatus in hypogastrio, chorio suo ad mesenterium adnatus, apud *Bianchum* citatur p. 164. forte idem quem dicit *Rouhault obuse. filol.* VI. & addit ovario conjunctum fuisse. *Orthianus* etiam ille fetus 46 annos in sacco fuit, utero adnato. Aliud exemplum geminorum in tumore, ad uterum, sed integrum, adnato, post aliquot a conceptu annos reperorum, est in *E. N. C. Dec.* III. ann. 4. obs. 22. Aliud *Courtial* habet fetus integro utero & ovariis in abdomen expulsi. Fetus in abdomine excisus ex viva matre apud *Anellum* exstat. Huc *Cypriani* fetus pertinet, quem aegre tubis tribuo. Fetum etiam excisum ex abdomine, placenta sua ad tubam *Fallopian* adna-

DCLX.

Demonstrationem credo dari posse. Sumatur maxima inter aves magis parabiles, anfer

adnatum recenset *Cl. Trioen obs.* p. 64. Ex *F. Tertio de Lana* historiam fetus ex ventre exeunti *Valisnerius* habet, quem credit ex tuba excidisse, verum non liquet c. VI. n. 16. In genere in his graviditatibus ventralibus, & solis, *Bianchus* caesaream operationem laudat. Tolosana mulier, quae 27 annis fetum in abdomine gestavit, notissima historia est, quam *Peyers* habet *exerc.* p. 79. 114. & *Phil. tr. abr.* III. p. 217. & *Connor. diff. med. phys.* p. 56. Sed is ex uteri ulcere effusus fuerat *Blegny* in *propr. tract.* neque adeo huc pertinet. Fetus suum, per anum extractum, in tuba etiam vel ovario sedisse credit *Littrius Mem. de l'Acad.* 1702. p. 313. sed nullo, credo, certo fundamento nixus. Fetus canini, superfetatione geniti, in abdomen effusi, exiles *Phil. trans. abr.* II. p. 905. Ibidem agnorum & leporum similes historiae habentur n. 302 ovilli vero fetus *Bresl.* 1723. M. Nov. tum fusius apud *Vater Grav appar.* n. 7. Prope scrofae hepar tumor viscidus, in quo fetus corruptus *Act. Balth.* 1699. p. 79. Lepusculi *Rommeliani* vulgo noti sunt. sed dubia fides est; alia historia exstat in *Comm. Nor* 1733. hebdomada 27. Hos fetus, quotquot ex utero rupto, aut tuba, aut ovario, tractis non sunt elapsi, omnes ex ovo generatos fuisse videtur, quod ex ovario, per aliquod caecae forte, aut aberrantis tubae vitium, in abdomen elapsum, a vicinis vasis enutritum fuerit.

fer, aut cygnus, fanus, vegetus, in aetate ad venerem sufficiente. In his avibus, olim ARISTOTELE docente, ab eo tempore vero FABRICIO, HARVEIO, MALPIGHIO & BELLINO, sub pulmone machina oblonga sedet, figurae vix determinatae, quam multae inter linguas modernas vocant *Fyerflok* ^a. Huic circumponuntur tubercula numerosa, & omnia denique una communi membrana ambiuntur. Haec tubercula ova sunt, quorum aliqua majora sunt, & magis matura, alia minus: Sed inprimis eo tempore vitellus vastus reperitur, cum initio bullae liquore plenae. Hoc nunc ovum est, cujus fabrica ex corpore luteo

^a Ovarium HARVEIUS describit *Exerc. 3.* in lumbis situm, proxime renes, fundamento laxo, poroso, fungoso p. 8. In eo vitelli variae magnitudinis sunt p. 6. absque albumine p. 7. cum propria membrana, super quam alteram, dum separantur, ab ovario accipiunt *Ib.* quae ipsa delabente vitello in ovario manet cum vasis suis, estque calyx ille supra dictus *Graaf* p. 247. Albumen autem ex utero stillat secretum, & circumdat vitellum *Bellin. de motu cordis* p. 52. *Harvei* p. 23. 25. etiam in piscibus *Collins* p. 659. In utero etiam duro cortice obducitur *Harv.* p. 28. qui tamen in aere libero magis indurescit p. 29. ortum autem non ducit a renibus, neque cum urina advenit, aut excrementa pariter obducit p. 32. etsi id probabile videatur. Horum simillima adducit *Faber* ad *Hernandez* p. 762.

luteo constat, quod in infundibulo in vitellum abit, & ex bullula in centro posita, quae se ad omnem circumferentiam sensim expandit, & in albumen abit. Id ovum, quod haecenus descripsi, manet in infundibulo aliquamdiu, extra vitellum, & fovetur: vitellus interim parum crescit, albumen autem adeo velocia incrementa capit, ut intra breve tempus totus vitellus in albumine sepeliatur. Nunc ovum perfectum est. sed molle haecenus, si enim gallinam in hoc stadio aperueris, reperies duas membranas exteriores, deinde in centro, ad obtusum angulum, vitellum sedentem, cui albumen circumfunditur. In centro vitelli sacculus colliquamenti haeret, valde exiguus, qui in amnion & chorion abit, vitellus autem in placentam, ex qua vasa umbilicalia veniunt. In centro denique sacci colliquamenti pullus est. Haec nunc omnia per singulas horas, accurate observavit MALPIGHIUS. Sed humana femina ovum quidem nullum ponit, quod corticem habeat: neque enim testa ad ovum pertinet, & unice cavet, ne ovum, dum extra matrem incubatione fovetur, vel a matris pondere, vel a propria mole elidatur, aut laedatur. Neque cortex ^b in ovario

- b Haec celeberrima quaestio paulo fusius & pro dignitate tractanda est

Primus omnia, etiam vivipara, ex ovo generari *Harveius* dixerat p. 2. & exerc. 61. sed per ovum non intelligebat vesiculas ovarii; verum, membraneum saccum, in quo liquor contineretur, mediusque cresceret fetus. *Empedoclis* ortus anima-

ovario adfuit, sed in uröpygio generatur: ibi enim bursula est, creta plena, quae circa ovum ibi depositum undique adfundit gypseam materiem, & ipsam mollem sexta

lium ex ovo, ab *Aristotele* citatus de gener. anim. L. I. sub fin. nullo experimento fulcitur. Sed *N. Stenonis*, & *J. van Horne* primi docuerunt, viviparorum testes ovaria esse, & vesiculas, testibus contentas, vera ova. In hanc sententiam inciderant, ex consideratione anatomes comparatae, quae in omni insecto, pisce, ave, quadrupede, similes fere sphaerulas liquido plenas reperit, in eo fere diversas, quod in viviparis in glandulosa substantia lateant, in oviparis nuda & absque parenchymate concerventur. Deinde *Graafius* fufius hanc theoriam ornavit in praef. ex epistola ad *Schachtium* p. 211. tanquam novam ac suam, cum ovula illa viviparorum in apice papillae, deinde in tuba, denique in utero reperisset: ova denique humana, hippocraticorum similia, cum sacculis colliquamenti in praegnatis compararet. Cum hisce viris recentiores fere omnes senserunt, omnia nempe, & ovipara & vivipara animalia ex ovo generari *Drelincourtius* in conceptu de conceptu & alibi advers. class. 4. &c. *Parisini* in anat. Tigridis, *Collins* p. 591. *Corn. Consentinus*, *Connor* evang. med. art. 10. *Nenter* p. 329. *Peyer* apud *Muralt.* p. 421. *Harderus* apiar. p. 34. &c. *Verheyen*, *Everhardus* vel *Cosmopolita* p. 432. 433. *Palfyn*, *Maxinus* Inst. p. 211. le *Fevre* in physiolog. c. 29. 30. & plerique alii. Verum contra ea ova fusc ab *Italis* dispu-

ta ante partum hora, sed ab aere continuo in calcariam crustam abituram. Sed ne albumen quidem ad ovi essentiam pertinet, cum a pullo consumatur, & unice circumfundatur

disputatum est, a *Malpighio*, *Sbaraglio* *scops*. I. II. tot. *Valisnerio* in l. cit. & *Op. omn.* II. p. 41. *Voglio*, *Paitono*, tum a *Venette*, *Meryo*, *Mauricaeo*, p. 10. *Lamyo*, *Duverneyo* seniore. Ergo varia objecerunt, falsa aliqua, ad quae supra responsum est DCLXII. alia veriora: 1. Veliculas firmiter innexas esse carni ovarii, neque inde absque magno malo natove ulcere separari posse *Lamy*, *Valisneri* c. 4. n. 1. in equa c. 3. in sue c. IX. n. 8. c. XVIII. n. 15. *Vogli* p. 221. *Mery Comm. Paris.* 1701. *hist.* p. 47. &c. neque unquam ovum ab ovario solubile reperiri *Leeuwenhoeck epist. phys.* p. 209.

2. Ovum multo majus esse, quam ut a tuba recipiatur *Duverney Zod. Gall. ann.* II. m. *Mart. Leeuwenhoeck experim. & contempl.* p. 28. *anat. & cont.* II. p. 157. *Valisneri* l. c. c. 19, n. 12. *Voglius* &c. Ita ova vaccae avellanae mole ipse *Graafius* pingit, cum tubae angustissimae sint T. XV. & idem de asinae ovis cerasi aequalibus *Valisnerius* c. 4. n. 4. Addit *Valisnerius* ovum *Graafianum* nimis molle esse, quam ut tubam nixu suo dilatet, ubi in uterum dura & callosa inseritur.
3. Vesiculas in ovario majores esse, quam ova, quae in tubis aut utero aliquando reperta sunt, *Naturam* vero nunquam retrogredi, sed fetum a primo momento conceptionis perpetuo crescere *VALISN.* c. IX. n. 18.

fundatur nascenti animali, ne viginti diebus, quibus incubatur, alimento careat. Totum ergo verum ovum constat sacculo colliquamenti & vitello. Neque obscurum est, cur

- c. X. n. 6., factumque esse GRAAFIUM, cuniculi ova in ovario decies quam in tubis majora esse p. 307. T. 26. f. 1. Et urget *Leeuwenhoeckius* „ ova vulgo dicta in ove majora esse, quam conceptus septimi diei *anat. & cont.* ll. p. 165.
4. *Sbaragli* addit, ova Graafiana non respondere fetuum numero, & pauciparis vaccis numerosiora esse, quam multiparis canibus; felibus, scrophis *sceps.* p. 312. 335.
 5. Ova Graafiana non incipere sub tempora veneris, & in vitulo 4. 5. septimanarum aequae, quam in vacca, magna esse *LEEUEWENHOECK anat. & contempl.* ll. p. 174. conf. *DCLXIX.* not. r. imo minui in praegnantibus *Stenon. act. Hafn.* ll. p. 231. *Littre l. c* p. 383. conf. *Santorinum* p. 222. &c.
 6. Sed neque evanescere pro numero fetuum, qui pariuntur, verum in ipsa graviditate omnia una fere deleri *VALISNERI* c. 10. n. 6.
 7. Ova viviparorum animalium verorum ovorum omnino dissimilia esse *Sbaragli* p. 289. &c. *Valisn. c.* 18. n. 27.
 8. *Papi & Voglius* p. 96. objiciunt, nullam rationem dari, quare non uno initu totum ovarium fecundetur.
 9. *Nabothus*, se saepe ova morbosa, tubas clausas, & similia vidisse in feminis, quae certissime peperissent: ut in gravida tartarea vidit *Sbaragli* p. 393. *Morgagnum* etiam

cur ovum humanum albumine destituatur, & cortice. Non corticem habet, quia ovum in molli matris utero loco tuto foveatur: non albumen, quia toto tempore gestationis

etiam fateri, frequentissimo se ovaria varie morboſa reperire *Adv. I. p. 35.* & *VALISNERIUM C. 12. n. 5.* ex veneris, ut credit, intermissione, quod quidem innumerabilibus exemplis confirmari video, hydatidum, hydropis, atheromatum, pilarum, etiam meis non infrequentibus experimentis. Vide dudum *Sbaragli p. 304. 393.* & olim *Riolanum p. 365.*

Non ignoro quae soleant responderi: 1. Nihil difficilius ova viviparorum solvi ab ovario, quam placentam de utero, fructus de petiolo *Graaf. p. 169.* aut vitellus de calyce in oviparis *Berger ad Valisn. C. 9. n. 6.* & omnino hunc in gallinis ovi cum calyce nexum validum esse, quem tamen certum sit abrumpi *Tauvry p. 52.* in testudine denique ova in calyce ita mergi, ut in immaturis nullum foramen appareat *Tauvry p. 38.* Et inter vivipara aliqua esse, quae ova perinde, uti in avibus, separata habeant, exemplo erinacei, & porcae *Dionis p. 283.* (sed de istis dubito) eaque aliquando libera etiam in muliere reperiri *Swammerdam prodr. p. 20.* Omnino denique separari posse, cum separata visa sint, & ova ex ovario emerſisse viderit *Blasius obs. anat. L. V. n. 4.* & vicinum cicatrici ovum *Duverney junior comm. paris. 1701. p. 245.* Sed & lutea corpora juniora innata ovario esse, maturescendo solvi.

stationis a matre alitur. Vitellum autem habet, nempe placentam, & colliquamenti sacculum, nempe amnion. Ergo ovipararum feminarum & vivipararum ovis non aliud

2. Tubas facile dilatari, etiam leni flatu *Paitonus disc.* ll. p. 43. atque adeo ab ovo, vi peristaltica impulsio, superari. Addi potest, rigere forte in coitu tubas, & dilatari, idque valde probabile esse, ex fibrarum dilatatione & accessione ad ovarium. Porro *Tauvryus*, ovum in ovalem figuram fingi posse, sic diametrum minui credit p. 55. Sed etiam in *Chamaeleonte*, evidenter oviparo, oviductus ne setam quidem admittit, *Valisneri oper.* T. I. p. 420.
3. Responderi posset, Ovum abruptum de ovario vasisque nutritiis aliquantum minui, donec, ex celeritate corculi aucta, insertae in uterum radiculae placentae, alant redantque liquores, quibus distendatur ovum *DCLXXV. not. k.* Sed potest etiam cutis aliqua abscedere, neque absque exemplo est, infecta ante metamorphoses suas mole minui.
4. In iis femellis, quae plures fetus pariunt, ova forte per series sensim expediri, neque plura simul adparere, quam necesse sit, uti de luteis corporibus certum est. *Valisnerius* ex sua hypothese respondet, plures esse in vaccis vesiculas, quod plures in unum corpus luteum absumantur c. 19. n. 8.
5. Hoc difficile videtur, & hic facile vincunt corpora lutea, quae adeo evidenter sub veneris tempus & a conceptu tument. Possent

aliud discrimen est, quam in albumine alimentario, & defendente testa, quibus viviparae destituuntur: reliqua omnia in utrisque perfecte eadem sunt. Miror adeo fuisse claros viros, qui negarent, aliquam inter ova viviparorum animalium & oviparorum ova similitudinem intercedere.

DCLXXI.

Possiet tamen *Leeuwenhoeckio* reponi; etiam magnorum, & parvorum piscium, qui certo ovipari sunt, tum adultiorum & juniorum ova eadem mole esse *Epist. phys. p. 166. & Baker p. 159.* idemque de animalibus spermaticis verum esse *Id. ib.* Deinde ego quidem in fetibus, & teneris puellis vesiculas ovarii non reperio; conf. *Ill. Teichmeyer* simile experimentum *de gener. n. 17.* In vaccis vero & animalibus brevis vitae, ita praeceptus est tempus pubescentiae, ut non mirum sit ova recens natorum ab ovis juvencae unius anni parum differre: hinc in iis animalibus, etiam lutea corpora ante tempus veneris adparere *DDLXIX. not. o.*

6 Ova praegnantium aliquantum comprimi, neque ideo destrui, nova vero augmenta minorum detrimentum sarcire,

7 Infirmum est. Piscium enim ova vesicularum similia sunt. Avium autem ova ideo a viviparorum ovis differunt, quod alimentum fetus, nempe vitellum contineant *TAUVRY p. 45.* Ab hydatidibus autem, a quibus negat distingui posse *VOGLI c. I.* vel sola perpetuitate satis distinguuntur.

Ad 8. facile respondetur, unicum tantum maturum esse. *VALISNERIUS*

autem reponit, in oviparis multa uno coitu ova fecundari, quia nulla in ipsis lutea corpora sunt, haec autem in viviparis semper pauca generantur c. 19. n. 6. Plura tamen aliquando uno coitu fecundari, dicetur ad DCXCIV. & exemplum mirabile *Ruyfchius* habet, massae cum variis artubus egestae, qui pro multis fetus sufficerent *Thes.* 11. aff. 3. n. 6.

Tum ad 9. ea mala, quae reperit *Nabothus*, potuerunt intra novem graviditatis menses nata fuisse.

Sed rationes, quare in sententiam *Valisnerii*, aut certe *Malpighii*, pronior sim, hae sunt. Corpora lutea veneris tempore apparere dixi DCLXIX. & ab ovario manifesto separabilia esse ib. & numero fetuum proxime respondere not. o. & certissime foramini ovarii obponi not. ff. Deinde haec princeps ratio est. Si vesiculam corpus luteum ambit, vicerunt **GRAAFIANI**. Nunc ego invenio corpus luteum intra vesiculam nasci. Sequitur hoc corpus veneris tempore maturari, adeoque omnino vesiculam praeparare aliquid pro corpore luteo, hinc evanescere, quando corpus luteum maturum est, neque immediate tetui inservire. Nempe jam **GRAAFIUS** vidit, post coitum inter ovi membranas subnasci flavam materiem p 231. Deinde *Ruyfchius* coagulatum cinereum corpus in majori vesicula in ovario adhuc inclusa depingit *Thes.* VI. n. 5. T. 4. Adv I. T. I. f. 2. & *VATERUS* repetit de *uteri polyp.* n. 5. „ cavum nempe ovum medullare. Denique **VALISNERIUS** in virgine reperit, in eminente vesicula intus nasci lute.

DCLXXI.

An ovum humanum omnino in uterum feratur, dubitari potest. Certum enim est, tubam ita non continuam ovario esse, ut etiam remota sit, neque videtur tubam ovarium amplecti posse, nisi animam aliquam habeat, quae tubam adfurgere jubeat, ut ovarium amplecti possit^a. Sed id non videtur probabile. Adeoque tota res figmento proxima videtur. Verum philotophus nullum phaenomenon pro impossibili habere debet, nisi quod notae demonstrationi repugnat. Neque nos homines naturam discimus ichnographiam ex idea faciendo, sed sensim & diligenter observando phaenomena. Gallinae vitellarium
ad

luteum corpus lunata figura c. V. n. 16. si recte intelligo. Haec etiam mica forte est, candidior, quam in medio ovi liquore reperit SCHRADER in *praef.* Ipse autem intra dissectam vesiculam vidi flavum, glandulosum nucleum. Si tamen experimenta DCLXIX. not. *n.* satis firma essent, tunc utique GRAAFIANAM praeferrem sententiam. Nunc ad alteram pronior, puto tamen repetenda esse experimenta.

- a Conf. DCLXVIII. not. *x.* & DCLXX. *b.* Neque quidquam juverit SBARAGLUM, si mechanismum adplicatae tubae minus bene explicaverimus, phaenomenon enim demonstratum otium facit explicaturis rationem phaenomeni. Addit ingeniose TAUVRYS, omnino tubas non oportuisse ovarium perpetuo amplecti, ita
enim

ad lumbos haeret, inde vero longe distat uropygium, & infundibulum, quod ova recipere debet, pendulum in cavea abdominis fluitat. Et tamen igne venereo incitata tuba gallinae erigitur, & amplectitur ovarium, atque adplicata resorbet ovum, retinet per dies aliquot, alit, ducitque ad exitum naturalem. Inde nunc certo scimus, NATURAM facere, ut tuba flaccida, remota, se ovario adplicet, inde vero vitellus decidat, neque

enim non potuisset eo se adplicare, ubi ovum maturius eminet p. 57. neque nisi unum, alterumve, recipere. Sed alia gravissima objectio est, quam minime oportet dissimulare. GRAAFIUS & alii not. u. ad DCLXVIII. viderunt, continuo a coitu tubam ovario non cohaerere, sed aliquo demum a coitu tempore. Tubarum enim adplicationem omnes solemus orgasmo venereo, & irruenti sanguini tribuere. Quae ergo, si nequidem orgasmi tempore admoventur, admoventi causa est; qua via eo semen advenit, si tuba veneris tempore ovarium non attingit; Hanc difficultatem VOGLIUS urfit. Sed omnino experimenta pro tubae a recente coitu ad ovarium adhaesione superare videntur illa pauca contraria maxime, si integram oviparorum analogam historiam adhibueris. Aves enim ex sola titillatione dorsi absque maris semine ova concipiunt HARVEI p. 13. qui in Casuario etiam vidit ova concepta ex visa struthionum venere p. 15. & in vetusto plittaco PARSINI 1726. *bist.* 2.

neque unquam in abdominis caveam elabatur, quod naturale videtur, sed in fauces tubae perpetuo defluat, quae tamen adeo remota est: nihil enim certius esse potest, quam ovi, nihil morantibus istis difficultatibus, receptio ex ovario in tubam, etsi non negaverim, flaccidis tubis hanc resorptionem impossibilem videri.

Oculis) HARVEIUS tubas rigidis suis finibus ad ovaria admotas vidit, & humanum uterum, in quo fimbriae tubarum cum ovario concreverant. Ergo non repugnat naturae, recipi per tubam ovum, & ad uterum descendere. Alia ecce experimenta. In foro porcario singulis sabbati diebus, centum forte porcellae castrantur^b ut eo abundantius ex sagina pinguescant. Haec operatio est hujus modi. Veterinarius incidit abdomen paulo supra cristam
offis

^b DCLXIX, not. f.

^c HIPPOCRATES in omnibus scriptis semen muliebne recipit debilius virili *περὶ γυναικ.* n. 7. sed necessarium &c. ARISTOTELIS semen feminis vix ullum concesserat *de gener. anim.* L. I. c. 20. & negaverat humorem libidinosum, quem in femine excernunt, ad conceptum facere *de gener. anim.* L. II. c. 4. Sed tuse contrarius GALENUS, utique semen in feminis esse contendit, paucius equidem masculo *de semine* L. I. quae etiam SPHAERI sententia est apud LAERTIUM L. VII. c. 1. & imperfectius *de utilit. part.* L. XIV. c. 10. id per cornua in uterum venire l. eod. & *de utilit. part.* L. XIV. c. 10. & in vidua quadam crassum cum maxima voluptate post irritationem pudendi excretum fuisse L. II.
alias

ossis ilium, inserit digitum, tubam adripit cum ovario, educit,eductam adspicit, & refecat, reliquam recondit, vulnus confuit, ita efficit, ut nunquam ea porcella utero concipiat, & tamen uterum non attingit.

alias per somnum elabi, ad libidinem autem praeterea facere *de util. part.* L. XIII. p. 11. AVICENNA simillimum GALENICO exemplum citat viduae, quae tacto pudendo vim seminis excreverit FEN. I. p. 649. COLUMBUS verum semen contra negantem FALLOPIUM se in testibus mulierum vidisse adseverat p. 246. quod video nuper repetisse D. VENETTE p. 222. abusum fero vesiculae alicujus turgidioris, & contentum in ovis liquorem semem tenuius esse repetit MAURICEAU p. 10. additque D. de MARCHETTIS, semen ex testibus per quaedam alba vasa in tubas venire p. 45. Inter recentiores Cl. HENRICI *de vesic. semin. mul.* p. 18. liquorem glandularum Nabothi pro semine muliebri habet, quod commistum virili fetum constituat. VOGLIUS autem semen in testibus muliebribus generare docuit, & eo citante D. PAPI. SBARAGLI vero & PAITONI *Disc.* III. p. 34. feminis liquorem spirituosum in testibus credit generari, qui in sanguinem resorbeatur, & ea fere faciat feminis, quae viris suum semen praestat ex DCLVIII. Eadem omnino olim GALENO sententia fuerat *de semine* L. I. Deterius ATHENAEUS apud GALENUM *de semine* l. II. c. 1. &

tigit. Objicies forte ., animal sterilesce-
 re, quod ovaria semen generent ^c. Verum si
 haec ovariorum functio est, quomodo fit
 ut id semen in uterum potius ^d, quam in
 caveam abdominis veniat? Ergo eo rede-
 undum est, CREATOREM sic voluisse ne-
 que aliter rem possibilem concipio, cum
 adeo manifesto ostium tubae in cavum ab-
 domen pateat, neque tamen ovum in
 caveam abdominis unquam effundatur :
 quantum quidem ex observationibus didici.
 Ergo satis abunde constat, feminam testes
 suos ideo nascam esse, ut ova praeparent,
 quae matura, tempore orgasmi venerei, in
 tubam fallopianam, ovarium expansis
 tubis undique, quasi viginti digitis, ample-
 xam absorbeantur, recondantur, & per
 con-

& nuper LEEUWENHOECKIUS ova-
 ria omnino inutiles esse imitationes te-
 stium virilium *Epist. phys.* p. 210.

d Ita omnis vetustas, nullum conceptum fie-
 ri, nisi mas & femina eodem tempore
 semen emiserint *Arist. hist. anim.* L. X.
 c. 4. & semen muliebri cum virili misce-
 ri, atque ei quasi pro alimento esse *Gale-
 nus de semine* T. I.

c *Propellere, in Textu*] Haec maxima difficul-
 tas erat, ut ovum reciperetur in tubam.
 Promoveri facile intelligo, fibris circula-
 ribus successive contractis, etiam respi-
 ratione adjuvante, dum ovarium tubae
 adhaerens superne reditum impedit. Ita
 DRELINCOURT *de conceptu perioche*
 t. 6. 15 R E D I vol. VI. p. 262. 263.
 DIEMERBROECK. p. 134. &c. In
 cane

constrictionem tubae coercita adigantur in tubam, & in uterum deponatur. Tunc, si in uterum ova descenderint, quando semen masculinum in uterum advenit, constricto utero ovum in utero manet: nisi hoc semen adfuerit, idem ovum ex

cane GOELICKE ova matura in ovario, in tuba, in utero denique vidit, etiam in eadem cane, & repetitis experimentis SCHURIG. *syll. p.* 49 50. Hoc iter intra triduum a cuniculis perfici GRAAF p. 315. VERHEYEN. L. II. p. 328. in ove vero die undecimo ID. In ranis ova in. aprili in ovario, maio in oviductu & utero, junio fere in utero, julio in aquam effusa VALISNERIUS vidit *Opere T. I.* p. 445. Frustra reclamatur, nunquam se ovum extra ovarium vidisse *Leeuwenhoeck. ep. phys.* p. 296. Cum in cuniculis ova in tubis toties viderit *Graafius*, numquamque testium adlegaverim not. gg. ii ad DCLXIX. Id dubium manet, an totum ovum de ovario migret? Ita vulgo creditur *van Horneo p.* 45. & *Swammerdamio auctori prodr.* p. 23. *Drelincourtio de sem. muliebr.* n. 11. 12. & *de concept. Perioch.* XI. & *Graafio ep. ad Schacht.* p. 212. & *Cowpero in introd.* & omnis secta *Graafii* consentit, rumpi nempe de ovo petiolos, maturos, aridos *Drelincourt de sem. mul.* n. 16. sic ovum delabi, tubaque recipi. Contrario modo solum fetum in ovo latentem exire *Valisnerius* sentit C. 13. n. 5. & ovi contentum solum, relicto in ovario calyce, ut in gallinis *Ruyfch. Thes.* VI n. 21. Nupe

ex corpore feminino sine sensu dilabitur.

DCLXXII.

Adparebit) Quis unquam crederet, nisi qui vidit, cutem abdominis feminae gravidæ adeo enormiter distendi posse? Demonstrat autem eventus, quam extensiles membranae sint.

Alienus) Maçletur sexto a partu mense vacca, si unum fetum pepererit, reperies unam in ovario cicatriculam, duas si duos, & duodecim omnino, si raro exemplo duodecim ediderit fetus. Deinde vaccam fetam jube maçtari tertio post coitum die, apparebit in ovarii superficie eminens bullula ^a. Ergo eo tempore, quo lasciviunt femellae, latens ovulum crescit, tumet, vergit extrorsum, dilatat eam, qua ambitur, ovarii membranam. Inferior pars hujus bullae semper crassior est, nempe
pla-

Nuperus denique *Auctor von der natur* ovulum minutum, verum ovum, latere in majori, vulgari vesicula, eam rumpi in conceptu, verius autem ovulum exire proposuit n. 275. 880. Verum ova humana majuscula, toties reperta undique integra, clausaque membranis, & sacculi colliquamenti ovi fimillima, satis opinor demonstrant, totum ovum de cortice luteo solvi, & descendere.

a Nempe corpus luteum not. l. ad DCLXIX.

placenta ^b: superior, tenuior, est chorion & amnion. Nunc quomodo fetus isti, qui foramina in ovario reliquerunt, in uterum veniunt? Non alia certe, quam per tubas, via.

Cave abdominis) In hominibus eandem legem obtinere, discitur ex actis Parisi-
nis ^c. Parisiis enim mulier concepit, utero
gessit, parturivit, sed in ipsis nixibus
periit, aperta est, reperta tuba fallopiana
ovario adnata, & ingens in cavea abdominis
fetus.

DCLXXIII.

Spirituum) Fuerunt inter veteres, qui
sedem libidinis venereae in orificio superiori
ventriculi, & circa mesenterium lumbosque
ponerent. Non male, nam in hominibus a
venere exhaustis & in eo ventriculi orificio, &
in lumbis vitium accedit, & omnia ibi rela-
xantur ^a.

Inflammatione) In eo statu calor ^b sem-
per adest, tum in maris, tum in feminae
genitalibus partibus, omnino inflammato-
rius,

^b Proxime dicetur, ex teneri embryonis
amnio undique vasa, nempe placentae
rudimentum erumpere.

^c Conf. not. gg. ii. ad DCLXIX.

^a De deliquiis animi aliisque morbis nervo-
rum ex venere conf. DCLVIII.

^b Qui in glande masculina etiam thermome-
tro potest explorari: sed uti glans &
penis, ita clitoris sanguine turget, &
nym-

rius, summusque, quem homo ferre posset, ab irruente & agitato sanguine arterioso ortus. Omnis enim coitus, & in mare, & in femina, cum inflammatione fit, quae in gangraenam abiret, si diutius duraret. Sed & elementa geniturae masculinae, & ovum muliebres tunc intense calent, & agitantur velocissime: deinde semen maris exit in uterum, & tunc actum est a mare id omne, quod in generatione agit.

Irroratum) In omnibus animalibus, quae

nymphae GRAAFIO observante p. 144. & vagina demum, quae & ipsa, jam VESALIO docente, turgescit, penemque fungosa constringit p. 657. RUYSCH. *adv.* III. n. 4. Totus etiam in coitu uterus ita sanguine inebriatur, ut vel a morte rubeat. Uterus, qui concepit, rubet, major & villosior fit, ut hiat RUYSCH. *Thef.* VI. p. 32. & apud DIEMERBROECKIUM. VERHEYENIVS II. p. 314. in vacca rubentem vidit a coitu uterum; & in cuniculis hoc signum est cupidinis venereae COSMOPOLITA p. 45. Ipsa denique corpora lutea post conceptum rubent & villis scabrescunt, DCLXVIII Sed etiam ante venerem avium uterus insigniter mutatur, & carnosus fit HARVEIUS p. 23. in damis vero crassior *exerc.* 66. Aliquando equidem legimus, uterum a venere non mutatum repertum fuisse *Phil. Tr. abr.* III. p. 212. sed longius a coitu & post aliquot, ut videtur, dies.

quae coitum adpetunt, bullae e lentum
smegma habentes de inguine stillant,
&c

c Haec menstrua sunt, quae canibus septem
diebus fluere ait ARISTOTELES, cum
genitalium protuberatione *hist. anim.*
L. 6. c. 20. & humor, geniturae similis,
quem equae venereae emittunt IB. c. 18.
Uterus sub veneris tempus mollescit &
sudat humorem albugineum HARVEI.
p. 294. 295. Uterus a coitu secundo
plenus humore limpido RUYSCH. apud
DIEMERER. & SLADVS in ACT.
HAFN. *ann.* ll. n. 4. In vacca praegnan-
te uterus liquore albugineo plenus I. SYL-
VIVS. In cornu uteri cervini a conceptu
copiosus liquor albugineus LUDOVICI
BIN. c. Dec. I. *ann.* 8. *obs.* 17. In utero
paucis a conceptu diebus, lymphæ
RUYSCH. apud MANGETVM in *biblioth.*
anat. ll. p. 550. De vaginae vero, &
extremi pudendi liquore spumoso, quo
per venerem irrorantur, hic loqui super-
fedeo, quem vix credibile est in uterum
venire.

d *Apertius, in textu*) In recenter impraegnata
muliere os uteri hians RUYSCH. apud
SLADUM & MANGETVM l. c.
Tum in vacca VERHEYEN. ll.
p. 314.

c *Papillis*) His omnino videtur abundare or-
ganum muliebre. In nymphis papillae
SANTORINVS dixit p. 211. in interiori
facie vaginae SANTORIN. *obs.* p. 212. Papillas
nervæ agminatas, prope vulvae ostium
FEYERVS habet *obs.* 3. in hymene &
rugis SANTORIN. p. 212. ibidem &
id

& eo signo de vaccis cognoscitur ad ferendum taurum idoneas esse.

Ve-

in osculo uteri *Ruysch. Thes. IV. n. 9.* Et istae quidem sensum veneris percipiunt. Quas vero papillas *Praeceptor ex Morgagno citat adv. l. p. 10. IV. p. 45.* cae utique carnes sunt, subcartilagineae, maxime in vetulis, pene conicae, quae agminatae rugas vaginae faciunt, ipso *Morgagno* teste ita inclinatas, ut deorsum aciem convertant, penique resistent l. c. Hae papillae in duas principes series ordinantur l. d. ib. *Garengeot splanchnol. ed. nov. ll. p. 58.* anteriorem & superiorem majorem, substratam urethrae, dictam *Vesalio* p. 653. 654. & cum palato recte comparatam etiam a *C. Stephano* l. III. c. 7. uti recte *Pinaeus* vaginam superne magis rugosam dicit p. 99. & *Bourdon* p. 119. & *Verheyen* p. 146. & *Graaf.* p. 170. & *Santorinus* p. 212. Haec ruga sub urethrae osculo protuberat, saepe fissa, & saepe procidit, perque vaginam turpiter eminet. Altera obposita, minor, inferior, ad anum respicit, dicta *Verheyeno.* Vidi etiam duas medias intercessisse. Omnes ad dimidiam vaginam uteri desinunt, & reliqua pars vaginae utero propior, mollioribus & ramosis rugis exaratur, quales pinxit *Verheyen.* T. 17. f. 2. quam iconem contra *Morgagni* censuram l. v. p. 45. omnino excuso. Sed & ipsae duae columnae emissis transversis jugis varie conjunguntur. Vide iconem meam ad naturam factam. Caeterum per senium adeo non deteruntur, aut per

Verum hic theoriae nostrae obponit se
HARVEII auctoritas ^f, quae nos pene ad
 scepti-

partum, ut *Graaf* p. 171. aut per coitum ut
Morgagnus l. p. 10. *Linden. phys.* p. 316.
 certe meis in experimentis, ut in vetustis
 corporibus pulchrius adpareant. Vagi-
 nam utique ardeant *Morg.* & sedes sunt
 voluptatis l. p. 10. certe augent adfri-
 ctionem, ut non male Medici *Uratista-*
vienses inter causam deficientis voluptatis
 venereae harum rugarum absentiam recen-
 seant. Denique dilatationi in partu fa-
 vent. Hinc in recente puerpera nullae
 cervicis rugae *Rislan.* p. 366. Sexta a
 partu septimana nullae in vagina rugae
Barthol. Cent. 1. hist. 32. & in collo
 uteri vaccini rugae, quibus extensis mire
 dilatatur **ALDES** p. 546. Non ignoro
 passim exempla legi feminarum, quae
 absque voluptate conceperint *Pechlin.*
obs. 45. L. 1 *Lanzoni* *unim.* 32. *Schurig.*
congress. hist. p. 81. & p. 302. *spermatol.*
 p. 243. ubi multa exempla conpilandur.
 Sed certum experimentum capere difficile
 est.

^f *Harveius* in damis inprimis semen crassum
 nunquam reperit *exerc.* 48. 66. p. 226.
 ex. 67. tum in canibus & cuniculis *exerc.*
 67. in quibus consentit *Graafii* observa-
 tio p. 305. Negat etiam advenire semen
 ad ovaria *Schrader de microsc. util.* &
 plures alii. Porro galli semen & a viae
 arctitate ab utero excludi, & demonstra-
 ri alio modo inpraegnationem peragi,
 quod multa ova uno coitu fecundentur
Harveius monet *exerc.* 5. *Tauvry* p. 71.
 Et.

scepticismum ducit. Vir iste omni fide dignissimus, & in experimentis primarius, nar-

Etiam crassam testium muliebrium tunicam contra semen adlegat *Graaf* p. 266. Praeterea negant causam dari, quare semen virile ad tubas veniat *Lamzweerde de gener. molar* p. 76. Deinde adducuntur a *Bohno* p. 6. *Tauryo, Harveio, Raio, Harveii* argumenta repetente *syn. quadr.* p. 37. atretarum numerosa exempla, quae absque immissione penis conceperint, manifesta demonstratione, feminis crassamentum ad conceptionem non necessarium esse. Ita *Carpus* in *Mundinum* p. 661. 662. ex *Foroliviensi* & *Thoma de Garbo*, & *Zabarella*, & *Riolanus* de femina vix specillum admittente p. 197. & de aequae angusta fere *Sorbait.* E. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 273. atque *Paulini* Dec. II. obs. IX. post Dec. II. ann. 7. & *Schenck*, & *Mauriceau* obs. 835. & *Moinichen* obs. 13. ubi necesse fuit membranam incidere ut pareret. Simile exemplum habet *la Motte* obs. 243. 244. Coalita vagina conceptus felix, qui vaginam aperuerit *ID.* obs. 341. Sed & *Harveius* similia habet p. 268. & *Parisini* 1712. hist. 2. & *Paulini* l.c. Hymene integro conceptus E. N. C. Dec. III. ann. 28. obs. 83. 489. Atretas porro, quae conceperunt *Riolanus* recenset *enchirid.* p. 173. *Zod. Gall. ann. I.* p. 173. *Ordo Lipsiensis* apud *Schacher* in *prog. a.* 1728. edito, *Ruyseh.* obs. chir. 22. & ex sua etiam observatione *Schurig.* *Gynaicol.* p. 166. 168. Vulva vix calami capace femina impraegnata *Waldschmid de vat. med. bod.* p. 5. Semiclausula vulva

narrat, in adeo numerosis femellis, quas ipse secuit, statim a coitu, nunquam semen in

conceptus & mors, cum parere non posset *Triotn. obj.* p. 64. & simile exemplum *Diemerbroeckii*. Imperfecta atreta concepit *Act. Berol.* III. n. 1. Alia, quae vix denarium admisisset, a partu secundo virgo ex *Nicolo* apud *Marc. Donatum* p. 617. Alia clausa, ita tamen ut mentes fluere, concepit *Phil. Trans. Abr.* III. p. 26. Absque immisione conceptus *Zacchias* L. X. c. 43. *Mauriceau* p. 64, *obs.* 211. 49. *Lanzoni anim.* 32. *Fabricius* ab *Aquapend.* *Schurig. sylleps.* p. 141. infibulata equa peperit *Harvei* p. 268. *Borellus* Cent. IV. *obs.* 26. Conceptus per pessaria *Roussel.* *Mauriceau obs.* 217. Ex *Lechelio* ex *Nouv. de la rep. des let.* 1686. exemplum citat feminae, quae concepit, cum vaginam carne plenam haberet *Schelhammerus de part. gener.* n. 27. Porro in papillione tubam liquore plenam esse *Malpighius* observavit *at Spon.* p. 34. & in vacca uterum mucosum plenum idem obstaculum praestare p. 33.

Sed contraria nunc experimenta sequuntur. Semen in utero in brutis semper reperit *Galenus de semine* L. I. c. 2. In utero vaccae semen vidit a coitu *Verheven.* II. p. 314. I. p. 135. In cuniculi tubis 48. horis a venere semen & animalia *Leeuwenhoeck. anat. & cont.* II. p. 170. 171. & in matrice 15. minutis a coitu p. 166. In feminae tubis semen *Fallopianus* p. 196. b. *Graaf* p. 276. *Riolanus* p. 179. In utero vero suspensae, quae

quar-

in utero repertum fuisse, cum tamen equas, damas, cervas, numerosas secuerit, in quas masculi tantam vim seminis injiciunt, ut vide-

quarto ante die coiverat, semen invenit *Carpus* p. CXCl. in utero feminae & in tuba *Ruyfchius Thes.* Vl. p. 13. n. 21. *Adv.* 1. n. 1. T. 2. f. 3. & *Postellus* apud *Tauvry* p. 179. & *Cheselden. anat.* L. IV. c. 2. Addit *Comperus* „ in oposito ad duas vaginas penem bifurcum reperiri *Libr.* V. p. 335. cui addi potest, toti generi oviparorum (piscibus exceptis) pro duplici utero duos etiam penes esse. Ergo verum semen ad ovaria venire *Kerkring anthrop.* p. 2. & *Collins* p. 600. & *Comperus* sentit in introd. & *Valisneri* c. 10. n. 3. *Graafius* autem semen quidem ad ovaria non venire in cuniculis, leporibus &c. p. 263. in vaccis vero & ovibus & muliere utique etiam in tubas penetrare posse credit p. 264. & aliquando admittit *Bergerus* p. 465.

Sed instant aurae fautores, humorem in puerperis in tuba reperiri feminis similem *Bartholino* observante p. 259. & *Santorino* c. XI. n. 18. & hunc humorem imposuisse forte *Ruyfchio*, addique posset, ipsum *Ruyfchium* in vetula hanc mucii uterini cum semine virili similitudinem admittere DCLXVIII. not. i. Verum in ordinario coitu nihil video, quare semen aut omne, aut ex parte, uterum non subeat, maxime si comparerim vim illam *suctricem* pudendi muliebri, etiam in acubus cum magno feminarum malo observatam, & in conceptione a *Galeno* adductam de semine L. I.

videatur non posse fieri, ut visum fugiat, si omnino adestet &. Sed contraria experimenta RUYSCHIVS obponit, qui tot praesentibus testibus etiam medicis, in duobus crudelibus casibus feminarum, continuo a venere obtruncatarum, contrarium vidit. In priori historia classiarius miles a pulchra meretrice magna industria exoraverat admissionem, post coitum vero miro furore motus, absciderat miserae carotides. In altera vir adulterum in ipso inhonesto actu cum uxore comprehenderat, & necaverat deprehensam. Cum ergo RUYSCHIVS jussu magistratus vulnus undique exploraret, vidit, in cavitae uteri, verum muliebrem semen, idemque continuo alcohole vini immissum, induratum, una cum utero adservavit, ut hac ipsa

Neque mucum credo in alcohole obrigescere, & indurari, uti *Ruysschii* semen ex utero sumtum, & animalcula demum demonstrant semen fuisse, & nimis universalis est organorum marium introductio in feminea in quadrupedibus, avibus, insectis, quam quae frustra sit.

- g Comparatio cum feminis demonstrat, extra conceptum semen de pudendis continuo effluere: & omne denique evanescere locali calore & resorbentium venarum efficacia, hinc aliquot post venerem horis non reperiri. Damas autem *Harveius* serius a coitu forte incidit, & ob eam rationem uterum reperit inanem, uti tertio die *Brendelius* catterellam de embr. praexist. p. 38. & *Everhardus* cuniculam uterum semine vacuum viderunt habere, aut demum eae damae non conceperant *Diemerbroeck* p. 181.

ipsa die in thesauris Imperatricis Russiae spectabile superfit. Sed neque HARVEIVS aut fallere potuit aut falli, cum certa sit ejus viri ingenuitas, & copia experimentorum, in vastis animalibus captorum. Conciliare^h adeo oportet contraria ipsius, & RVYSCHII experimenta: Nempe HARVEIVS sua pericula fecit in animalibus bifulcis, quibus uterus in duo brachia dividitur, & per eam longitudinem semen facile ita dispergi potuit, ut paucissimum in utero reliquum esset: RVYSCHIVS in mulieribus, quibus unica uteri cavitas est. Pro RVYSCHIO etiam pugnant feminarum experimenta, quae ex hoc unico signo norunt se concepisse, si semen post venerem de utero non effluxeritⁱ. Et veterinarii similem observationem conferunt: ii enim, ut equa ex precioso caballo, magno saepe conducto ad unum initum, certo

h Ut memores simus adfirmantium contra negantia argumenta maximam efficaciam esse.

i Animalia omnia concipiunt, si semen retinuerint, & ne unicum, quod ejecerit *Galenus de semine* L. I. Semen quae retinet, concepit *Hipp. de genit. & de natur. pueri*. Quando non concepit, semen excidit *de genit. n. 6*. Vide *Venette p. 211*. Sed recte *Aristoteles*, non totum semen ad conceptionem necessario retineri *hist. anim. L. X. 3.* & l. c. *sub fin.* eamque cautelam repetit *Valisnerius c. 9. n. 2. c. 10 n. 3*. Sufficit enim unicam guttam animalibus praegnantem, ad uterum venire. Idem respondetur ad atretarum historias.

certo concipiat , habent pro certissimo praefidio, si genitalibus equae, quamprimum cabbillus defluit, situlam frigida plenam superfuderint , ita uterus constringitur , neque semen effluit, nisi pauculum quid , quod diu post coitum elabatur, jam functum officio.

Constrictione) Post conceptum uterus clauditur. Quo momento bruta animalia conceperunt , eo lumbi concidunt, uterus clauditur ^k.

Occurrens) Hoc enim temporis momentum pro conceptu opportunissimum est, quo calor in utroque sexu maximus , febrili certe vulgari multo major est : ita enim actuosissima seminis principia etiam magis actiosa ^l redduntur : tuncque fit conceptio,
 si

^k In erinaceo os uteri a conceptu constrictum *Muralt. vadem.* p. 266. & in vacca *Faber* apud *Hernandez* p. 617. *Severin* in *Zootom.* p. 297. & in cerva *I. M. Hofman* E. N. C. Cent. X. app. obs. 46. Uterus post coitum se contrahit *Arist. hist. anim.* L. VII c. 4. *Gal. de semine* L. II. c. 2. Signum conceptus os uteri clausum , & tamen molle *Mauriceau* p. 91. 106. & unicum signum conceptus os clausum *Panarolus Pentec.* III. obs. 21.

^l Maxime, si revocemus ex DCLl. animalcula spermatica frigore perire , modico calore conservari, & animari, ut omnia insecta solent. Hic ipse calor videtur facere , ut coitus tempore id animalculum , quod fortunatius ovum adtigit , maturum, accelerato motu corculi sui , invisibilia hactenus vasa umbilicalia exferat , et arterias
 suas

si principium genitale maris in eo momento ovulo occurrerit, atque adeo vis aliqua ex mare ad sacculum colliquamenti penetraverit.

Poros) Ovum femininum oritur ex ultimis finibus capreolorum arteriosorum, distributis ad ovaria: ita SWAMMERDAMIVS docet, & post eum RVYSCHIVS. Calyx ^m,
five

suas ovi venulis inferat: uti vicissim calentis ovuli (quod ex utero & corpore luteo calere aestimatur not. *b.*) elongata arteria venam umbilicalem animalculi obposita ingreditur. Quae vero animalia ova non matura ingressa fuerint, aut inertiora fuerunt, quam quae vasa sua potuerint vasis ovi obponere & infigere, ea, etiam si tubas & ovarium adtigerint, mori necesse est. Ex hoc calore venereo forte explicari poterit, quare animalcula in teste virili non excrescant? sed in muliebri demum ovo incrementa capiant? Quod absque hac vi expandente solida, fluidorum motum accelerante, vasa animalculi corculi inpetui vi pari resistere videantur, cedant vero ab hisce duabus causis debilitata. 2. Quod radicalia vasa nullibi cum spe insitionis, & proventus, emittere possint, nisi in paria ovuli intus fluitantia vasa. Ita quorundam fungorum semina in solo fimo equino radices agunt &c.

m Supra demonstratum est, calycem & in homine, & in avibus in ovario manere; ovi autem ambitum floccis obduci, quibus cum ovario in vulgari, aut cum luteo corpore, in *Malpighiana* conjunctum fuit,

five corpus luteum in homine placentae rudimentum est, in brutis vero animalibus cotyledonum initium. Per calycem, non per interpositam sphaerulam, intercedit commercium inter ovum & ovarium, & calyx ovi initium est, finisque vasorum conglomeratorum. Separatur tamen de ovario ovum absque laceratione vasorum ovarii, sed ita, ut ea pars ovi, qua ovario necelebatur, debilissima sit.

I. GESN.) Quando nunc stimulis venereis turget ovum, & calescit, & in ampliorem molem intumescit, tunc in ea parte, qua ovum ad ovarium nexum fuerat, & in qua omnia vasa nunc abscissa sunt, per ea ipsa vasa ⁿ, qua olim materies nutritia subibat, (in

& olim cum utero conjungetur. *Vituss. nov. syst. p. 52.*

ⁿ Abrumpi de calyce ovum, non difficulter concipitur, si, quod omnino probabile est, in coitu secundo intumescere posueris, ita enim, dum in brevitem se colligit, attrahit vascula, per quae alebatur, & avellit, conjuncta forte vehementi & convulsiva pressione externa ovarii DCLXVIII. Conf. *Auct. von der Natur* n. 851. Tunc demum, & per ea ipsa avulsa vasa, *Praeceptor* vult irreperere vermiculum, & adfinia docet *Valisneri* c. 13. n. 4. Sed obstat galorum exemplum, qui plura & diversae maturitatis ova fecundant uno initu, manifesto argumento, in ova nondum avulsa vim masculinam subire. Decimo enim, & vigesimo die a coitu secunda ova a gallina pari *Narvicius* testis est p. 19. Sed quam parte

(in meo codice), advenit id de mare, quod ovum femineum fecundum reddit: sive id sal volatile invisibile esse malueritis o, sive flatum

parte ergo subit? Frustra quaerunt, qui ovum ipsum nondum certo viderunt.

- o Qui semen masculum ad uterum venire negarunt, ii feminalem auram volatilem de semine exhalare & inpraegnare feminam consentiunt, & eo manifesto inclinatur GRAAF *ep. ad Schacht.* p. 212. CORNELIUS CONSENTINUS p. 177. & alii. Sed vias varias huic aurae fecerunt. C. BARTHOLINUS *spec.* p. 112. per vasa sanguinea resorbant ad ovaria venire statuit. Sic FANTONUS *diff. anat.* p. 211. SCHELHAMMERUS *diff.* 12. AUCTOR L. *von der natur* n 878. HANDLEY *Ess. of anat.* p. 40. &c. Per tubas eo ipso tempore ovario se adplicantes VERHEYEN L. 1. Tr. 2. c. 20. & L. II. p. 324. & VATER *phys. exp.* p. 720. & VALISNERIUS c. 13. n. 3. qui et ipse id solum, quod in semine subtile est, ad inpraegnationem facere credidit c. 10. n. 3. quod animalculum in ovo latens suscitetur, ut humores ejus celerius circumeant c. 13. n. 4. Spiritus etiam solos de semine ad ovum subire DRELINCOURT *periœch.* 30. I. W. PAULI & alii. Per membranarum poros filtrari TAUVRY p. 73. Per vasa, quantum video, sua muciflua, vacis propria MALPIGHIIUS p. 34. Alii ne auram quidem, sed causam aliquam fermentationis sufficere malunt, ut PERRAULT *mecan. des anim.* p. 484. & CON-

flatum *ανεμονοειδ* seu, spiritumve MOSAICVM, qui praegnans incumbibat aquae, uti VAILLANTIVS, sive denique LEEVWENHOECKII P animalculum admiseritis, quod decies

CONNOR *evang. med.* p. 6. & Maitreiean & immateriale principium, vel motum, *Harveius* sub finem. BORELLUS autem nescio quid organizati in semine virili ponit ll. *prop.* 173. Verum plus quam auram esse motumve, vel mutatio coloris demonstrat. quam in ovis bombycum ipse MALPIGHIUS observat, sterilia enim sublutea, fecunda violacea sunt *de bomb.* p. 36. 42. Sed ranarum etiam ova impraegnata ex albis nigra fiunt, & similia in erucis observavit RAIUS *syn. quadr.* P. 450.

p Id superius dudum, nisi fallor, valde probabile factum est. Addo nunc, quicumque hominem in ovo humano suspensum viderit, qualem passim, in VI maxime Thesauro RUYSCHIUS habet, illi sponte certe visurum, nihil huic fabricae aptius respondere, quam vivum animal, quod in ovum irrepfit, & emissa radícula se inseruit huic nativo solo. In ovo primo quemdam quasi vermiculum adparere MONROO *act. edimb.* ll. p. 212. Qui vero ex DCL, ante incubationem hominem, aut animal in ovo latuisse volunt, ii & minutius vermiculo feminali faciunt, &, cum solum motum ad vitam hujus ovi sufficere volunt, non satis respiciunt ad summam illam necessitatem masculi sexus, quae per omnia animalia dominatur, & ad ova subventanea, quae perinde emota

decies millies minus grano fabuli: semper utique eodem res redibunt, ut principium inpraegnans per hanc, neque aliam, viam ad ovum adveniat: cum vero semen maris absque omni dubio communicetur cum ovo, pars vero seminis maxime actiuosa sit omnino animalculorum congerles; hanc ipsam veram fecundationis causam esse probabile fit.

DCLXXIV.

Tale] Ubicunque demum pars seminis fecundans ovo potuit adplicari.

Ovario] In homine fetus inventi sunt, in ovo nati, qui ovario adhaererent. In iis casibus oportet omnino semen masculinum ad ovarium venisse: sive per uteri cavitatem in tubarum caveam, & per eam ad ovum venerit, quae opinio vulgo recepta est; sive juxta HARVEII doctrinam aura feminalis mascula se venis in uterum hianti-

emota, & ovario pariter, ut fecunda excussa, ex simili libidine; simili acceleratione motus humorum ovi, nihil tamen fecundi habent. Sed vermiculus, quem nunc admitto & qui ovum subit, non per cicatricem advenit, ut GEOFROI *an bom. prim. ordin. vermis*, haec enim per inpraegnationem demum nascitur; neque cauda se adfigit, quae videtur ejus spina dorsii esse, sed vasculis, quae invisibilia fuerunt.

a Conceptus sedem in utero plerique ponunt.

Olim GALENUS, feminam concipere semine in vasa subeunte, quae menses fun-

antibus insinuavit, hinc in sanguinis mas-
sam

dunt *de vulv. dissect.* Inter nuperiores ita defendit DRELINCOURTIUS *advers. dogm* 12. & BERGERUS p. 460. & HARTMANNUS E. N. C. *Dec. III ann.* 9 10 *obs* 161. Ita fusc maxime PAITONUS *Discorso* IV. & nuper GOUEY, qui credunt ex libidine ova ad uterum descendere, ibi demum poros a semine subire PAITON p. 79. Addit rationem PAITONUS; quod tuba continuo a coitu ovario nondum adplicata reperitur p. 32. GRAAFIUS vero BOHNIUS p. 21. VALISNERI c. 13. n. 4. VIEUSSENIUS *nov syst* p. 48. & plerique in ovario ovum fecundari statuunt. Hanc sententiam ut admittam, faciunt 1 ova humana in ovario reperta not. gg. ad DCLXVIII. 2. ova humana in tuba reperta, quale exemplum S L A D V S ex RUYSCHIO habet ACT. HAFN. 11. n. 4. & DIEMERBROECK, & manifestius EDIMBURGENSES. qui a recenti venere corpus album, ovale. pisi forma, cum multo semine ex pressa tuba viderunt exire, in quo, ut nemo subventaneum, aut nondum fecundum esse dicat, rudimenta erant corpusculi *Ed. Soc. V.* p. 336. Plura vide ad DCLXVIII. not. u. 3. Gallorum vis, qua multa ova eodem tempore inpraegnant, ubi manifestum est, in ipso ovario oportere inpraegnata fuisse. Uno enim coitu multa ova fecundantur, HARVEI p. 18. etiam vigesimum *exp.* 39. & ovorum inchoata rudimenta

sam ^b, & cum circulante sanguine per arterias ad ovum venerit. Verum hic quidem modus mihi conceptu difficilis videtur. Si enim vis feminis fecundans per cor & pulmones feminae transire debuit, facillime utique aberrare poterit, ut ad aliena loca, longe ab ovario remota veniat, nisi adjumenta alia gratis finxerimus.

Uterum) Queritur, num fecundans femininum adunatio in utero fiat: Ita GRAAFIUS ^c, qui multa dubia in his rebus expedit. Sumfit domesticos cuniculos, mares, & feminas, sed hujus animalis tanta fecunditas est, ut fere ab omni coitu concipiat, & plurimos quidem fetus, vix unquam vero aberret. Ergo eadem hora plures feminas ad mares admisit, deinde easdem diversis temporibus aperuit. Quot nunc fetus concepti fuerant, tot semper in ova-

dimenta p. 90. III. & in indica gallina omnia omnino ova unica venere fecunda redduntur MAITREJEAN p. 5. In apum denique regina fecunditas ad octavum & nonum a viduitate mensem superest REAUMUR *Hist. des Insect.* V. p. 564. 4. Mutatio manifesta corporum luteorum, quae a fecundo coitu tument, rubent &c. Sed ea ovarii partes sunt, non uteri.

^b Cum crassamentum feminis in uterum veniat tubasque, minime laborandum est de parte mobiliori. Vermiculi non videntur in sanguine, alieno sibi elemento, supervivere posse.

^c Argumentum maximum pro sententia nostra est, si satis firmum, tertio demum

ovario reperit cicatrices ^d, five foveolas, ex quibus corpus luteum ejectum fuerat. Sed in vaccis, uti totidem, quot fetus, in cornubus uteri crenae sunt, ita totidem pariter in ovariis cicatrices. Ita suis aliquando sedecim, quos simul concipiunt, fetus in cornu sedent, vigintique in muribus. Deinde GRAAFIUS ova ab ovario in tubas venisse vidit; ut aliquot horis ^d, post eam qua primum ovum in tubam venerat, secundum adveniret, donec quatuor v. g. fetus ex ovario dextro pulsi, quatuor in cornu cellulas occuparent, id enim semper in tot cellulas dividitur, quot fetus concepti sunt. Ex his experimentis collegit GRAAFIUS, etiam in humani generis femina in ovario ovum inpraegnari, inde in tubam & uterum deferri. Si in itinere impedimentum aliquod occurrerit, tunc in tuba fetum crescere, vel in ovario. Verum vir clarissimus experimenta sua unice in bicornibus uteris inpraegnatis fecit, in quibus fetus in cornubus geruntur. In homine vero & equa, fetus in cavea uteri sedet. Ea ergo, quae observavit, in bicorni utero valere videntur; in homine vero conceptum potius in utero contingere. Neque tamen negavero, etiam in tubis, & in ovario conceptum posse fieri ^e.

DCLXXV:

die a secundo coitu tubas ovario admove-
 veri p. 307. Oportet adeo pridem ovum
 fecundatum fuisse, nam triduo omnino
 semen vim suam amisit. Sed vid. DCLXVIII.

^d Not. a. ad DCLXVIII. not. x.

^e Fatetur etiam PALTONUS, in tuba, etsi
 raro,

DCLXXV.

Clauso) In fecundo & felici conceptu, infiniti enim casus sunt, in quibus ovulum iterum elabitur ^a. HIPPOCRATES in libro *de natura pueri* hujusmodi historiam describit,

raro, & in ovario, etsi rarissime, fecundationem contingere posse l. c. p. 99.

- a Inde numerosissimae historiae ovorum humanorum de utero excussorum. Bis mihi oblata sunt ovalia fere, alba cincta membrana, quae undique radículas albas ramosas educeret E. N. C. *Dec. III. ann. 9. 13. obs. 191.* multo sanguine mistam, liquore plena limpido. Sed hanc lanuginem altera crassior continebat membrana, intus levis E. N. C. l. c. Celeberrimum ovum est illud HIPPOCRATICUM, quod ex saltatrice saltu jussit expelli, sexto die, ut credit, simile ovi absque testa, cum fibris albis exeuntibus, humore intus pellucido, & in medio quasi umbilico HIPP. *de natura pueri*, & denuo *de aetate* IDEM ait meretrices depellere quasi carunculam, in qua, si in aqua inspexeris reperias partes distinctas. Porro ARISTOTELES pro animalis initio etiam ovum, membranam nempe, intextam venulis recenset *hist. anim. L. VII. c. 7.* Pelliculas a femine muliebri produci, quae fetum amplectantur, ait GALLENUS *de semine L. I.* & eam „ ex utero pendere ex loco, ubi vasorum sunt oscula; Hanc autem pelliculam fieri in secundam 18.

Haec ova humana aut subventanea sunt, quo inutilia illa referuntur, quorum fe-

tus casu aliquo periit, aut bono fetu plena, fecunda. Illorum ecce exempla Talia habet GEMMA *Cosamocrit* f. 2. p. 86. pro fecunda specie. Abortus trium, vel quatuor septimanarum, nempe bulla aqua plena in amnio, quod chorion cingebat DIEMERBROECK p. 185. Ovum columbini mole liquore non coagulabili plenum cum appendicibus apud VALISNERIUM *opp.* ll. p. 38. Ovum gallinaceo aequale plenum albumine MAURIC. *obs.* 180. Altero mense in utero sacculus fetu destitutus GALEACIUS *Comm. Bon.* p. 127. Secundo etiam mense ejecta ova subventanea HARVEI, p. 230. Vesiculam tertio mense gravida pepererat femina dicta GRAAFIO p. 191. Nova nupta ovum egerit exiguum BARLES *nouvel. decouv.* p. 23. Hydatis a conceptu dejecta BRESL. 1725. M. nov. Bursula absque fetu in abortu SCHRADER *obs. dec.* III. n. 6. Cum legitimo fetu ovum externe carnosum, intus grumum continens VIEUSSENS. Iconem etiam placentae cum membranis absque fetu habet BIANCHI T. II. f. * 7. 8. T. I. f. XI. p. 130. 131. & TRIOEN T. 5. f. 2. 4. simillimam genuino ovo & pariter villosam, & RUYSCHIUS *Thef.* VI. 39. 40. 41. T. I. figuris 2. 3. 4. 5. ut videtur.

Sed vera ova conceptu intus ditata, etsi non rarissima, non tamen vulgaria sunt. Minima in tubis, citavi ad DCLXVIII. Tale etiam ovum in utero liberum, necdum adnatum, NIGRISOLUS ex fovea uteri exemit p. 22. Nunc alia fecunda, minima & majora, ad diem novum usque GRAAFIUS pingit T. X. f. 1. ad

1. ad 7. ex cuniculis. Ovulum pisī mole jam villosum ex femina *Vaterus* habet *mol praegn* n. 4. majus autem *BIANCHI* T. I. f. 3. ex femina. Embryo tridui & quadridui aetate in magno ovo *BIANCHI* T. 1. f. 4. Biduo triduove cessasi mole ova *KERKRING antropogr.* p. 3. Tridui quadriduive ovum nuci aequale cum minimo fetu *ID.* f. 2. p. 4. Sexto die a venere bullula in cornu cuniculae *LEEUWENHOECK Anat. & cont.* ll. p. 171. Septimo die ovum undique villosum avellana majus *BIANCHI* f. 5. Nono die a coitu conceptus ex tunica, liquido crystallino plena, in quo nubecula, & alius minimus fetus *COSMOPOL.* f. *EVERARDUS* p. 48. 49. In sue decimo a conceptu die in medio utero vitrea substantia membrana clausa, in ejus medio fetus cum venis ramosis *COITER* p. 124. Die duodecimo ovum humanum aequale pinei putamini, jam circumtusum vasculis, cum fetu milli grani simili *SANTORIN. istor. d'un feto* n. 5. Decimo tertio die ovum (cuniculi) avellanae mole, cum multa aqua amnii fetuque adhuc informi *COSMOP.* p. 54. Ovum humanum juglandis mole, fibrosum, cum fetu jam satis formato *E. N. C.* Dec. ll ann. 1. *obs* 119. Ovum humanum columbini simile, villosum, cum semine papaverino non majori fetu, & funiculo *E. N. C.* Dec. III ann. 3. 10. *obs* 111. Ovum muci aequale cum fetu apīs mole *TREW.* l. c. f. 4. 5. 6. Ovum nucis moschatae mole cum placentulae initio *RUYSCH. cur. renov.* n. 56. Ovum galinaceo aequale, in eo fetus magnitudine

feminis cannabini *Mauriceau obs.* 485. Ovum humanum nucis mole, externe partim fibrosum, partim leve, intus fetus muscae magnitudine *Vater de grav appar.* p. 13. & pulchre *Trew. Comm Lit.* 1739. p. 117. T. 3. f. 7. 8. 9. Ovum undique fibrosum *Ruyfch. mus.* p. 170. Ova cum fetu hordei grano non majori 10. *Thef.* VI. T. 2. f. 1. 2. Ova albuminosa cum fetu puncti simili *Mauriceau obs.* 233. die decimo octavo, & vigesimo. Sacculus in quo gemelli formicae mole *Brendel. de embr praecexist* p. 38. In vesica fetus apis mole *Malpigh. posth.* p. 86. Vigesimo primo die enorme ovum cum minimo fetu *Pineus* p. 8. Ovum 21. dierum, in eo fetus lunatus cum partium initiis *Langley* p. 161. Abortus trium vel quatuor septimanarum, bullae similis aqua plenae: cum amnio, chorio, & in membrana externa carnea massa *Diemberoeck* p. 185. si quidem hoc secundum fuit. Ovum humanum cum membranis duabus fibrarum ope conjunctis & fetu intus mucoso *Hartman. E N C.* Dec. 11. ann 10. *obs.* 157. Tertia vel quarta septimana ovum cum fetu faba non majori Ovum 25 dierum cum fetu, nimis puto, perfecto *Bidloo T.* 57. Ovum anserini mole, in quo fetus acephalos *Malp.* l. c. p. 87. Vix avellana majus ovum quatuor septimanarum cum vermiculo intus contento *Heister. Comp. anat.* f. 27.* Ovum unius mensis, simile gallinaceo, extus tomentosum, intus ampullas tres continens *Riolanus* vidit p. 388. Ovum 32. dierum magno fetu & placenta *Bianchi* f. XI. Quinta septimana fetus apis

apis mole in ovo la MOTTE II. c. 24. Eadem aetate fetus, ungue non major, partibus jam formatis MAURICEAU *obs.* 246. Aliquot septimanarum digitale ovum, cum (valde magno) fetu Schurig. *sylleps.* p. 105. Sexta septimana ipse vidi ovum gallinaceo majus, totum obductum placenta, & chorio, cum qua amnios numerosis necessebatur vasculis, funiculo, hydatidi simili, embryoni informi insertum. Sexta septimana ovum juglande non majus, cum duabus membranis, fetu, funiculo, artuum rudimentis MURALT. *coll. anat.* p. 623. Sexta septimana abortus membraneus columbini ovi similis, albumine plenus, cum fetu vix distincto MAURICEAU *obs.* 233. Eodem tempore in sacculo fetus ape non major *obs.* 265. Sexta septimana vesica in qua fetus apis magnitudine la MOTTE *obs.* 265. Ovum gallinaceo paulo minus, cum embryone pisi mole, DIEMERBROECK, p. 184. Aliud, ejusdem fere molis, cum fetu carinato formicae magnitudine p. 184. Aliud aequale gallinaceo, cum chorio villoso, amnio separabili, fetu pisco aequali p. 183. Aliud eadem magnitudine, cum placenta, chorio, amnio, & in eo bulla I D. p. 186. Ovum cum crassa chorio, fetuque in amnio, pene perfecto E. N. C. *Dec. I. ann. III.* p. 68. Ovum duorum mensium cum funiculo fili aequali, una extremitate membranea, in altera sanguine coacto la MOTTE I. c. p. 247. Bimestria ova cum vel sine fetu, placentae parum, nisi radículas aliquas habere, cum fetu unguis magnitudine Harvei p. 184. 230.

Ovum bimestre in quo, mediis in aquis ;
 rubrum corpusculum *Collins syst.* p. 627.
 Bimestrem fetum in folliculo, pro mon-
 stro habuit *Iason a Pratis de uteris* p. 47.
 Ovum bimestre, gallinaceo aequale, cum
 fetu scarabei mole la *Motte obs.* 134.
 Bimestre etiam ovum cum fetu pisi
 mole, tuniculo praeditus, in quo aliqua
 artuum apparitio, & radiculæ externæ
 BURGGRAB. E. N. C. *Vol. V obs.* 79.
 Ova duo perampla cum fetu fabae mino-
 ris & majoris magnitudine RUYSCH.
Thes VI T. II f. 3. 4. Novem septima-
 narum conceptus cum filamentis ex ovo
 rubescentibus in parte acutiori BACH.
in alloq. p. 42. Sesquitertio mense ovum
 carneum, cum fetu apisi mole, solito
 minus MAURICEAU *obs.* n. 108. In
 abortu 50 dierum ovum gallinacei mole,
 fetus fabae magnitudine HARVEI *exerc.*
 p. 68. Ovum humanum cum rudi mas-
 sula fabae mole E. N. C. *Cent. X. obs.* 3.
 & simile tere TRIOEN, vertice acuto,
 informi fetu T. V. f. 3. Ovum huma-
 num sphaericum, anserini mole, cum
 fetu faba non majore, & tenui funiculo,
 tertio mense E. N. C. *Dec. III. ann. 9. obs.*
 159. Eadem magnitudine cum puero
 scarabeo aequali la *MOTTE obs.* 134.
 Mense tertio elegans ovum ab altera
 parte villosum, anserino majus HEIST. f. 27.
 Magnum ovum tertio mense cum mini-
 mo fetu RUYSCH. *Thes.* VI. n. 49.
 T. 3. f. 3. Mense tertio duae membranae,
 cum aqua viscosa, hydatidibus & informi
 fetu MURALT *coll. anat.* p. 663.
 Mense quarto ovum integrum editum,
 & in eo puella viva REIES, Mense $4\frac{1}{2}$

mem-

scribit, docetque, qua arte ovum excuti possit ^b, quando fetus jam in ovo oculis dignosci potest. Tales abortus frequentissime

membrana ovi similis, in qua aqua & filamenta alba, tresque ampullae pellucidae L. BOURGEOIS p. 26. Nempe, ova humana saepe vidit PLATERUS amnion habentes, in qua tres bullae *quaest. physiol.* p. m. 238. eae vero bullae sunt cerebellum, duoque cerebri lobi DRELINCOURT, in *advers.* vide DCXCIV. Aliud ovum humanum in quo duo corpuscula incurva parum figurata PLATER l.c. Ovum exiguum, columbino non majus, cum paradoxo fetu incredibilis magnitudinis RUYSCH. *Thef.* X. T. I. f. 3. Ovum eadem magnitudine cum fetu faba non majori, mense quarto MAURICEAU *obs.* 259. Ovum eadem mole cum maturo fetu editum, in quo embryo formicae aequalis BERGER p. 458. & intra molam amnios minor, & fetus NOORTWYCK p. 121. In massa sexto mense edita, placenta, membranae fetus phaeoli mole, cum artuum rudimentis ANEL. *hist. de l' Acad.* 1714. *obs.* 3.

Ergo & in homine & in brutis (mantica etiam in damis generationis primordium est HARVEI) fetus naturaliter ab ipso conceptu semper in ovo reperitur, ab initio leviori, sensim magis undique villosus, liquore pleno limido.

- ^b Motu magno aut venere tunc ovum excuti posse, aut supervenientibus mensibus, credibile est, DRELINCOURT *de sem. muliebr.*

fime fiunt, non sentiente femina, ob incredibilem parvitatem. Abortum trium mensium demum percipiunt c.

Musculorum) Non vi musculosa vera,
sed utero per inflammationem aliquam
robur

muliebr. n. 30. cum ovum in his primordiis nondum adnexum sit. Caeterum HIPPOCRATIS historiam carpit VALISNERIUS, quod fetus 7. dierum multo minor sit, quam ibi describeretur c. 21. n. 16.

c De anthropogenia pauca hoc loco decerpam.

In recenter inpraegnata corpusculum album mucosum in utero RUYSCH. apud SLADUM l. c. Embryonem capite aciculæ non majorem RUYSCHIIUS vidit *Cur. renov.* p. 143. & semine papaverino HARTMANNUS E. N. C. *Dec. Ill. ann.* 9. 10. *obs.* 191. Tertio die a coitu in cane carina BRENDL. l. c. Sexto die fetum grano hordei aequalem esse MANNINGHAM *comp. obst.* p. 50. Die septimo vermiculus incurvus 12. fere linearum BIANCHI T. 1. f. 5. 6. omnino nimius. Vermiculus etiam in primis initiis in ovo MONROO *Edimb.* ll. p. 212. In ovillo fetu corpus jam distinctum LEEUWENH. *anat. & cont.* ll. p. 165. Die octavo fetum cumini grano non majorem RUYSCHIIUS recenset *cur. renov.* p. 52. Decimo die vermiculus in ovo est, & adhuc ad albuminis modum ad ignem cogitur GRAAF p. 311. ic. 8. T. XXVI. Die duodecimo fetus humanus milii grano similis SANTORIN. *1st.*

d'un

robur accedit , ut se constringat , & osculum obturet , neque tamen fetus incrementa impediat. Exemplum hujus ab inflammationa-

d' un feto. Die 14. ovum , & in eo fetum formatum fabae molae habet KERKRING f. 3. multo vero majorem Cl. GUTERMANN. *Comm. nor.* 1739. h. 9. T. 3. f. 3. Non ignoro, secundum HARVEIUM , ante 15. diem nihil de fetu apparere , aut certe vix lente distingui secundum TAUVRY p. 83. Sed contrarium VALISNERI demonstrat c. X. n. 4. 5. Die decimo quinto fetum api minori comparat MAUR. 571. Die decimo octavo, vel vigesimo , in aqua albuminosa fetus puncto similis ID. *obs.* 233. Vigesimo die homo grani hordei mole BESLER p. 8. & VAROL. p. 102. Vigesimo primo die non major formica, sed nimis perfectus, in enormi ovo, apud PINEUM p. 138. & ic. I. In ovo paucarum septimanarum , gallinaceo aequali, fetus pisco duplo minor, cranio membranaceo IDEM p. 183. In ovo gallinaceo minori formicae aequalis fetus , p. 184. Pisci magnitudinis fetus, in ovo gallinaceo, minori, & plurima aqua , p. 184. Vigesimo primo die 7. lineas longus, apparente artuum initio DODART. *hist. de l' acad.* 1701. p. 25. pondere 7. granorum. Eodem etiam die fetus lunatus cum partium initiis Langley p. 161. Vigesimo quinto die fetus uncialis P. NEUS p. 149. api vero non major BIDLOO T. 57. f. 3. Vigesimo quinto vel trigesimo unguis mole Mauriceau p. 84. Quem
pro

matione roboris est in pene erecto, qui tenso muscoli simillimus riget, quando a sanguine influente turget.

Juga

pro 25. dierum fetu BIDLOUS pingit, nimis perfectus videtur T. LVII. enormiter major vermiculo quem HEISTERUS pingit F. 27* Tertia quartave septimana fabae fere aequalem fetum in aquis MAURICEAU obs. 558. Vigesimo octavo die sceleton fere unciale pingit *Kerkring.* f. 4. Pondus mente primo drachma tenuis aestimat *Mauriceau* p. 38. magnitudinem fabae parem obs. 421. vel api obs. 367. aut paulo majorem ex obs. post. 5. Sed haec non satis sibi respondent. Menstruum fetum digiti transversii mole VATERUS vidit de *mola praeg.* n. 6. suumque minorem quam KERKRINGIANUM, fuisse monet SWAMMERDAM *prodr.* p. 25. nam menstruus hujus fetus biuncialis est. Die trigesimo quinto fetus apii minoris mole informis la MOTTE ll. o. 24. Quinta septimana fetus ungue non major, sed partibus satis apparentibus *Mauriceau* obs. 246. Sexta septimana aequalem scarabeo la *Motte* o. 134. Eadem aetate fetus exiguus, sed formatus, capite & oculis apparentibus *Muralt. coll. anat.* p. 623. Uncialem eo tempore fetum VATERUS vidit l. c. & *Bidlous* T. 57. f. 4. & plus quam biuncialem *Kerkring.* f. 6. & *Guterman.* l. c. f. 1. & triuncialem atque valde perfectum PINEUS p. 148. 199. Altero mense fetum digitum longum vidit VATER ib. Nona septimana in ovo gallinacei aequali, duo fetus minimum digitum latos habet

BACK.

Fuga membranosa] Post EUSTACHIUM
MORGAGNUS & NABOTHVS probe nota-
runt

RACK. p. 42. triuncialem vero TREW.
l. c. f. 13. & paulo maturiorem alterum
f. 14. 15. Tertio mense articulo digiti non-
dum aequalem, valde parvum L BOUR-
GEOIS habet l. p. 27. digito vero ma-
gno MAURICEAU *obs.* 692. Fetus
duos digitos longum mense tertio Har-
vei p. 230. & trium unciarum pendere
Mauriceau p. 85. Non recedit pulcher-
rimus ille Heisterianus f. 27. Sed Pineus
enormiter adultum pingit p. 154.

Verum facile demonstratur naturae va-
rietas. Nam incrementa numeros dierum
non sequuntur, sed alimenti forte natu-
ram, & vim insulſionis. Deinde has
mensuras turbat, quod fetus saepe dudum
ante abortivum partum pereant, aut cresce-
re certe desinant, atque adeo edantur
mole minori, quam pro aetate naturalis
foret: Hujus modi fetus falsa germina
vocat Mauriceau *obs.* 485. 511. 617. Huc
pertinent plurimae hujus scriptoris observa-
tiones. Post aliquot septimanas fetus gra-
no milii aequalem *obs.* 141. sexta septimana
vix distinctum corpusculum *obs.* 233. ne-
que majus ape *obs.* 295. Altero men-
se fetus grano hordei non major, forte
15 dierum *obs.* 314. 673. Nona septi-
mana fetus ape non major, menstruus
forte *obs.* 367. Die quinquagesimo fetus
ape non major, ovum anserino, ex matre
obnoxia abortui *obs.* 421. 615. & grano
cannabino *obs.* 681. & tritici grano *obs.*
596. Mense tertio ovum, aquis albu-
mi-

runt hanc rem. Uterus intus non glaber est, &, ubi uterus aperitur osculo, ibi juga

minosis plenum, cum fetu grano milii non majori *Mauriceau obs.* 616. & cannabino *obs. post.* 135. *obs.* 108. 304. 403. 381. 571. & ovum anatino non majus *obs.* 416. Mense tertio & dimidio ovum gallinaceo non majus, fetus ape, sed post languorem *obs.* 400. Mense quarto cum medio fetus ape non major, menstruus forte *obs post.* 64. Mense quinto abortus juglande non major *obs.* 498. fetus faba *obs.* 259. Mense sexto ovum columbino non majus, fetus ape *obs. post.* 40. & ovum columbino non majus post haemorrhagiam *obs.* 432. Mense septimo ovum pugni mole, fetus ape non major, *Maur. obs.* 696. & trimestri non major *obs.* 462. Mense octavo fetus musca non major, grani pondere *obs.* 482. Nono mense fetus trimestri non major *Maur. obs.* 337. Huc adeo refero fetus quadraginta dierum non majores formica *Aristotelis hist. animal.* L. VII. c. 3. *Fernelii physiol.* L. 7. c. 10. (qui tamen suae formicae caput facit avellanae aequale) & *Rioianl p.* 388. & triginta quinque dierum fetus apis mole, *Stratonls & Dioclis Carystii* apud *Macrobius* in *somm. Scip.* l. c. 6. sextaque septimana non majorem fetum *Varolii p.* 103 & eadem magnitudine nova jam septimana la *Motte obs.* 173. aut grano hordei *Ruyssch advers.* ll. n. 10. tertioque mense *Ejusd. Thes.* VI. n. 49. T. 3. f. 3. & in *E. N. C. Dec.* III. ann. 9. *obs.* 159. Tum quinquaginta dierum fetum, non majorem faba

juga^d conniventia sunt, quae ab inferioribus sursum admittunt, a superioribus vero deorsum eunti ovo resistunt. Haec repagula hoc tempore intumescunt, uterum coercent, ne excutiat, quod conceptum est.

Vesi-

fabia Harvei exerc. 68. Caeterum etiam minores fetus satis saepe molestos esse monet *la Motte* p. 247. & alii, cum in primis ea aetate, ex clauso utero, placenta aegerrime eximatur. Conf. E. N. C. *Dec. II. ann. I. obs. 100. 116.*

d *Laminae* sunt pene cartilagineae, deorsum cavae, similes vaginalibus, in aciem terminatae *Morgagn. adv. I. n. 14. T. 3. L.* Vidi transversas valvulas fuisse, uti *FABRICIUS de form. fet. T. IV. PALAFYN de la femme p. 56. &c.* & tamquam ramos ex medio trunco venisse *FABRIC. ib.* Ita, sed paulo nimis evidenter, *MORGAGNUS adv. anat. I. T. 3. & SANTORINUS*, ramorum cum appensis pomis simillimas, *T. 2. f. 3. p. 215.* nimis e contrario obicure *BIDLOO T. 51. f. 4. & TREW Comm. 1731. h. 7. 1732.* Alias duos truncos vidi, ut *SANTORINUS l. c. & pro perpetuo WINSLOW n. 598. & olim NABOTHUS.* Alias vidi plures uno trunculo fuisse, rugasque ramosas. Ita plures & satis confusos pingit *TREWIUS Comm. Nor. 1735. h. 39. T. IV. f. 11. p. 284.* pro re perpetua, & quinque aliquando truncos fuisse *SANTORINUS* testis est p. 215. Alias vidi varie intricatas & inordinatas, valvulas, directionibus diversis, ad latera recurvatis, ut nullum ordinem

Vesiculis) Idem EVSTACHIUS & MORGAGNUS docent, inter juga, quae in exteriori osculo uteri sunt, solent autem vocare internum os, ut a vaginae orificio distinguant, ampullas esse, sphaericas, quae per

dinem facile exprimeres; Alias vix quidquam conspicuas, quod etiam MORGAGNO contigit *Adv.* IV. p. 69. & BIANCHO ansam dedit carpendi. Ceterum HEROPHILUS collum uteri cum palato comparavit *diff. vulv.* c. 7. & musculosum cartilagineum dixit GALENUS *de utilit. partium* L. XIV. c. 3. *de diff. vulv.* c. 17. ubi addit in aniculis durius esse: Eadem habet C. BARTHOLINUS p. 154. VESALIUS addidit rugas esse p. 653. easque per aetatem & venerem duriores fieri p. 657. In iconc FABRICIANA T. 4. habentur, sed rudius & absque explicatione. Rugas etiam DIEMERBROECKIUS dixit p. 137. & GRAAFIUS p. 181. Chordas RUYSCHIIUS vocavit *Thes.* VI. n. 24. cujus non bona icon exstat *Thes.* VI. T. 4. f. 3. Lacertos firmantes nominat SANTORINUS p. 216. Videntur omnino aerem, & alia vaginae contenta morari, ne uterum subeant; deinde facere ad extensionis facilitatem, cedunt enim & explanantur, neque tamen evanescent SANTORINO teste p. 215.

e Vesiculae alias, & saepe quidem, superius quam valvulae ponuntur, ut *Verheyen* p. 146. T. 17. f. 3. inmersae ex dimidia parte in uteri carne, aut ad duas tertias ut *Henrici de ves. fem. mulier.* p. 8. aut penitus absconditae, ut *Morgagnus Adv.* I. p. 38.

p. 38. quales etiam *Trewius* habet *Comm. Nor.* 1732. p. 284. T. 2. f. 3. aut tantum una tertia *Naboth* n. 14. & aliquantum, ut *Noortwyck* p. 7. Ibi in utero rarius quidem reperiri *Naboth* ib. alias & ibi & in cervice. Alias omnino inter valvulas sedent, ut in *Morgagni & Santorini & Verheyen* iconibus & apud *Winslow* n. 598. & frequentius esse *Nabothus* auctor est. Alias in limbo osculi interni id. ibid. conf. *Morg.* l. c. Ego in cervice perpetuas, & ni fallor etiam perpetuas in ea parte uteri reperi, quae in cervicem gracilescit, haecenus tamen supra valvulas est. Duas tantum series esse, ut *Bianchus Theatr. Mang.* ll. p. 77. non credo, agminatas autem in unum corpus coaluisse non repugnare, quod idem vidit. Fiunt tenera membrana, quae tamen per foramen inflatum inflari potest (*Henrici*). Continent lympham viscidam, pellucidam *Schurig spermat* p. 182. five mucum, *Littre* l. c. serumve limpidum, ut *Pal-syn de la femme* p. 56. Ductulos vero, quos memorat *Henrici*, nemo praeterea vidit. In femina hysterica magnas fuisse narrat *Valisneri* c. 5. n. 23. Has vesiculas, post levem memoriam *Graafii*, qui inter uteri rugas dixerat se vesiculas vidisse p. 181. habet *Cl. Desnoues*, subrotundos tumores, qui expressi materiem spermaticam flocculentam edant *Zod. Gall. ann.* lll. p. 21. *lettres* p. 127. *Littrius* autem in gravida viderat *Mem. de l'acad.* 1701. p. 386. & *Mery* anno eodem *biss.* p. 50.

Sed *Nabothus* a. 1694. ait se sua ova vidisse *de steril.* n. 13. & etiam tunc pro

novo ovario habuisse, & eadem in *diff. cit.* refutatis ovariis, pro vera sede conceptus proponit, ovisque femininis. Addit juniores feminas plura habere n. 14. partemque utero inmersam placentam esse, & aliquando pisi mole reperiri ib. & liquorem intus albuminosum concrecibilem continere n. 13. Cl. *Henrici* similem opinionem recepit, addiditque, femini virili similem continere materiam l. c. nempe semen muliebre activum, quod, mistum virili, fetum efficiat p. 18. *Nabothianum* autem ovarium omnino recepit *F. Hofmannus med. syst.* p. 342. 343.

Deinde has vesiculas praeter priores viderunt *Petermannus*, *Douglassius abrigdm.* IV. T. 6. f. 2. *Palsyn* l. c. *Muys* a *Schurigio* citatus muliebr. p. 316. & *Verheyen*, qui rudem iconem dedit *globoforum corporum* p. 146. T. 17. f. 3. *Trew Comm.* 1731. p. 13. *Moebius* in *diff. inaug.* & *Lieutaud* & alii, nemo vero facile in *Nabothi* opinionem incidit, nimis repugnantibus observationibus citatis ad *DCLXVIII. x* & *DDLXVIII. gg.*

Contra *Nabothum* etiam *Bottigerus* scripsit, & *Petermannus*, & *Ettmullerus*, qui citat utrumque, & *Ruyfchius Adv. anat.* I. n. 2. qui hydatides esse voluit, & hic & in tubis abunde frequentes *Ettmuller epist.* p. 9. &c. Ita in utero sphaerulas in hydropica *Duchesne* vidit apud *Palsyn de la femme* p. 80. & *Breslawiens* 1722. m. *Mart.* in ipsa demum cervice e longo petiolo pendulas vidi. Sed *Santorinus* & *Morgagnus* I. p. 37. & *Henrici* p. 7. cum simul utraeque reperiantur, non credunt, vesiculas hydatides esse; *Santorinus* addit (post

per emissaria sua liquidum plasticum ^f amy-
laceae pastae simile exsulant. Praeter eas
etiam lacunae & ibi sunt, quae lentum hu-
morem

(post *Morgagnum Adv.* IV. p. 70.) in puer-
peris crebriores esse, atque forte ad eum sta-
tum pertinere p. 213. 214. (quod idem *Mor-
gagnus* habet p. 71.) additque se in infelici
puerperio cervicem absque vesiculis du-
ram reperiisse, Mucos lento plenas etiam
Morgagnus facit *Adv.* I. l. c. & *Valisneri*,
& secretoria muci uterini *Simson Edimb.*
Soc. IV. p. 121. Mihi dubiam hanc theo-
riam reddit emissariorum defectus, nun-
quam mihi visorum, & ubertas vicina-
rum lacunarum.

- ^f Mucus rubrofusus in gravidis os uteri clau-
dit *VESAL. exam.* p. 142. *RIOLAN.* p.
367. *HARDER prodr.* c. 8. *DIEMER-
BROECK* p. 236. *ALDES* p. 547. *LANG-
LEY* p. 163. sed isti ex brutis: *COWPER*
T. Ll. f. 4. *GRAAF* p. 181. *E. N. C.*
Cent. X. obs. 46. *NOORTWYCK* p. 7. ad
aliquot in equa uncias *PEYER* in *exerc.*
In vaccis etiam hunc mucum reperi, &
in feminis, & in summa cervice *MOR-
GAGNUS adv. anat.* I. p. 37. Os uteri
in meretrice visco plenum *D. de MAR-
CHETTIS* apud *RAIUM abridgm.* IV.
p. 7. & *MORGAGNUS* ib. p. 12. Subru-
brum vocat *VESALIUS* p. 653. quod
reperio, sed corruptioni tribuo. Fontes
lacunae sunt not. g. forte etiam ova *NA-
BOTHII*. Ita etiam *MORBIUS* in *diff. cit.*
g DCLXIV. Adde in iconibus, quas *PRAE-
CEPTOR* ex *EUSTACHIO* citat, sinus
O 3 quidem

morem exonerant. Hinc in conceptu lentissimus humor, per agitationem inflammatoriam abundius effusus, os uteri ^h obfercit. Tres adeo causae sunt, quae ovum retinent ⁱ in utero.

In-

quidem muciferos manifesto, rugas not. *d.* perobscure exprimi.

h Ex triangulari illa latiori cavea uteri, dixi angustiores firmissimum canalem descendere, veram uteri cervicem, observante FALLOPIO p. 192. & facile demonstrante GALENI sermone *de vulv. dissect.* . 7. quam pro secunda uteri cavitate distincte describit COLLINS p. 567. & SIMSON l. c. p. 129. & alii. Eam descripsi, a vagina circumnata excipi. Intra istum adeo canalem prominet cervix, anuli similis pulposi, crassissimi VESAL. p. 657. convexi, intra vaginam prominentis & quasi suspensi WEPFER *de cicut. aquat.* p. 125. MAURICEAU p. 33. f. 1. incisi fissura, ex figura uteri, & situ, transversim lata VESAL. p. 655. FABRIC. T. I. f. 2. in virgine perangusta GRAAF p. 180. conf. PINAEUM p. 124.

i Os uteri aliquando praeter naturam clauditur, & angustius est, estque haec ex causis sterilitatis muliebris Hippocrates *περὶ γυναικείων β. & α.* Manningham p. 47. Mauriceau obs. 582. Schurig. muliebr. (ex *Vratislaviensibus* & D. Pauli) & Ruysh. *Thes.* VI. n. 85. & fartum clausumque a sarcomate in sterili Bierling E. N. c. Dec. I- ann. II. obs. 208. & connatum fuisse, ut oportuerit parturienti cultro aperiri, lego apud *Edimburgenses* III. p. 317. & fere simile

Innatat) Penitus liberum ^k, quia longe
minus

mile exemplum habet *Gouey* p. 62. Sed in gravidis, perinde uti in virginibus, *Pinaeo* recte notante p. 128. magis con-
nivet, quam clausum est, vide etiam *Graaf* l. c. *Cowper* T. 51. f. 4. (mense tertio). Diserte vero hiare, & ad mo-
dum canini rostri produci *Mauriceau* p. 97. Invenio equidem os uteri a turgente utero claudi apud *Hippocratem aphor.* V. n. 51. *Drelinch. de Concept. Perioch.* 21. *Hobokenum anat. secund. vit.* p. 14. *Diemerbroeck* p. 236. & alios; & sub initio stri-
ctum esse apud *Harveium* p. 270. *Vesalius* p. 655. triduo & quatrinduo a partu *Horne Wehmutter* p. 13. vixque stylum admittere apud *GAL. de diff. vulv.* c. 7. *Riolanum* p. 365. arctissime demum con-
strictum apud *Blancard anat. pract.* ll. n. 76. & mense imprimis quinto & sexto la MOTTE l. c. c. XI. praegnantem vero in universum claudi, & coeunti demum hiare, ut semen recipiat apud *Galenum de util. part.* L. XIII. c. 3. In ovibus etiam angustatur *Peyer* apud *Muralium* l. c. p. 409. *Aristoteles* denique etiam post mentes effluxos claudi ait *hist. anim.* L. X. c. 2. Verum ego nullum, in ca-
davere certe, ostium aut uteri, aut alte-
rius emunctorii, unquam strictum vidi. *VATERUS* in gravida etiam pisi capax pingit, &, qui prius citati sunt, illi qui-
dem morbosum aliquem coalitum descri-
pserunt, isti angustum dixerunt, compa-
rantes cum enormi illa dilatatione, quae in partu fit.

^k Ova in cuniculis sub initia graviditatis non

minus est minima capacitate uteri : eo tempore, quo nondum adhaesit, facillime ovum ejicitur, quod *faux germe* ¹ galli vocant, trimestri vero fetui demum nomen inponunt *abortus*.

Hu-

adhaerent utero GRAAF p. 308. DRE-
LINC. de sem. mul. n. 30. & in dama
Harvei p. 233. tum in bisulcis in univer-
sum ID. p. 280. avibusque Idem exerc. 8.
Ita Graafius etiam in ovo libero primum
nubeculam apparere vidit, deinde pun-
ctum saliens p. 278. 280. Tertia septi-
mana in ove nondum adhaeret fetus Lang-
ley p. 166. & quinta p. 162. neque ante
diem nonum in cuniculo p. 167. Addit
Harveius, adhaerere in damis ovum tunc,
quando viscera in pectus se retraxerunt
exerc. 69. & in equis Needhamus priori-
bus sex omnino mensibus ovum utero
non adhaerere auctor est c. 2. & confir-
mat peritissimus Wepferus E. N. C. Dec I.
ann. 3. obs. 129. Verum nimis tardam
videtur hanc adhaesionem fecisse HARVEIUS,
nam placenta multo, quam credebat, celerius
erumpit DCLXXVII. & septimo die in
cuniculo ova cellulis adhaerent, ut vix
eximi possint Graaf p. 309. paucisque
diebus recte hanc libertatem definit Auctor
von der natur n. 884. Audiendi sunt, qui hanc
libertatem negant Hartmann E. N. C. Dec.
III ann. 10. obs. 191. & Monroo in act.
Edimb. II.

¹ Aristoteles *abortus* vocat fetus dearticulatos,
effluxus autem, quando semen liquidum
ante septimum diem effluit hist. anim. L.
VII. c. 3. Mauriceau vero p. 112. obs. 314.
338.

Humor) Uterus clausus piensus est masculino femine, tum mucilaginoso succo uteri, cum conceptus plerumque post menses sequatur: in his nunc humoribus natat ovum, quo uterus major est, & pori macerantur^m, ut subtilioris humoris, cui innatant, partes admittant. Haftenus, quam-

3381 647. 485. 511. & *Bianchus* fallum germen dicunt quod amnion & placenta habet, fetu vero caret, qui destructus sit *Bianchi* gener. anim. p. 130. 131. T. I. f. XI. T. 2. f. 7. 8. Alibi *Mauriceau* ante mensem secundum vel tertium falsa vocat *germina* p. 94. *Drelincourtius* embryones vocat prius, quam umbilicus utero adhaeserit, fetus autem, quando id factum est *Periob* 35.

m In conceptu ante omnia humor adparet DCLXXIII. not. c. *Harvey* p. 280. *Cosmopol.* p. 160. *Cornelius Consentinus* p. 178. *Prog. V.* In recter inpraegnata uterus plenus limpidi humore *Ruysch* apud *Diemerbroeck*, In cuniculo die 7. &c. viscidus liquor in utero *Cosmopol* p. 41. In vaccae cornu dilatato liquor copiosus limpidus, & in eo fetus *Grot* a *Deswig* de fetus format. & dudum die septimo a coitu & in utero & in cornu copiosum quasi albumen invenit, in cuius medio crassum quid esset *Iacobus Sylvius dissect.* var. p. 73. In ove die XI, ovum in utero solo tumore turgidum *Verheyen* ll. p. 315. In hoc ergo humore natat ovum, nondum radicabile per experimenta not k. Augetur tamen, & quando primum villosum apparet, jam multo quam in tubis

quamdiu nondum utero adhaeret, embryo dicitur.

Meatus) Per eam partem, qua ovum aperitur, ea nempe, qua humor ex ovario in ovum ferebatur, quamdiu ovum ibi fuit.

Inaequalem) Quando pressio undique aequalis incumbit, nullum potest rupturae adesse periculum. Vitellus, intra ovum integrum, etiam si concusseris, non rum-pitur, quia in medio ovo sedet, neque ovum demum in vesica aqua plena frangi-tur, utcunque vesicam adliseris.

Crassiores) Una & uterus crassior ^a red-ditur.

jus est, conferendo DCLXI . not. p. cum DCLXXI not. a. Superest ut per poros bibulos alimentum resorbeatur aut, per teneras radículas, nondum visibiles placentaе: Ita etiam Graaf p. 279. Taurvy p. 85. Valisnerius c. 13. n. 6. & consentit utique ovi gallinacei notissima inhalatio, qua fit, ut humoribus multis exhalantibus. pondere minime minuatur.

^a Haec celeberrima quaestio est. Uterum equidem dilatari sensim in graviditate nemo negat, ita ut fundus inprimis adscendat. & dilatetur Manningham p. 4. Deventer p. 40. 39. 28. &c Simson p. 22. et sexto mense tubae ad duas tertias uteri exeant Deventer p. 400. Vater uter grav. aut ad quartam at Noortwyck p. 7. & ad duas sub fundi lateribus uncias, ut Littre Mem. de l'ann. 1701. p. 385. in tegrumve pedem Desnoues lettres p. 32. vel ex dimidio utero ut apud Fabrie. T. 1. Idem

ditur. Cum enim ex vasis totus componatur, affluente per ea vasa majori humorum

1. Idem *Graafius* observavit p. 224. & *Riolanus* p. 365. Vitiosa adeo *Pechlini* figura est L. I. *obs.* 19. qui in gravido utero tubas ex vertice ortas pingit Eadem ratio est, quare prolapsus uterus in gravidis adscendat *Mauriceau obs.* 40. & prolapsus ipse evanescat *Pechlin obs.* 20. L. I. *Mauriceau obs.* 95. Addit *Ruyfchius*, post *Riolanum* p. 366. vaginam una longiorem fieri, quod necessario sequitur, etsi brevior reddi velit *Spigelius* p. 263. & ligamenta teretia anteriora reddi *mus. rar.* p. 118. Cervix diu vix mutatur *Graaf* p. 179. *Verheyen* p. 126. *Simson of the womb* p. 77. 83. ultimo tamen mense *Simson* l. c. aut sexto, septimo aut quinto demum *Onymus de situ fetus* p. 9. etiam dilatatur & fere evanescit *Mauriceau* c. 7. donec in puerpera oris uteri cavea cum utero fere confundatur *Lientaud* p. 359. aequae lata ac uterus *Riolanus Morgagni Adv. anat.* IV. p. 71 & unisimilis continuo tubo *Deventer* c. 5. Nimis ergo duriter *Dionis* cervicem omnino negat dilatari *des accouch.* p. 37.

Sed au adtenuetur in gravidis uterus, magna inter medicos discordia est. Adtenuari equidem *Galenus de util. part.* c. 14. de *diff. vulv.* c. 8. ut in praegnante tenuissimus fiat, & *Aetius tract.* IV. *serm.* IV. c. 1 & *Avicenna* L. III. Tr. 2. c. 1. p. 21. & *C. Stephanus* L. III. c. 4 & *Fabricius* l. c. P. II. c. ult. & *Falcoburgius* apud *T. Bartholinum anat.* p. 261.

rum copia, necessario in substantia ipsa
crassescit uterus.

DCLXXVI.

p. 261, & *Schelhammer exerc. 12.* qui
membraneum in puerpera invenit, &
Golicke de dystocia p. 2. qui similem *Al-*
bini observationem & inde ruptum ute-
rum refert, & *Barles nouv. dec. p. 3.*
& *Bohn p. 21.* & *Molinettus p. 324.* &
fusissime *Mauriceau p. 19. 20.* adducto
exemplo puerperae, in qua uterus poste-
rius non crassior duabus lineis fuit, inte-
rius ne vesica quidem densior *obs. 149.*
& altero *obs. post. p. 70.* tum *Venette*
sua etiam citans experimenta, & experi-
mento confirmat *Pascoli L. III. p. 61.*
uti in puerpera quarta pollicis parte non
latiorem reperit *Chapman c. 41.* anserina
vero penna non crassior in *E. N. C. Dec.*
II. ann. 9. obs. 74. Crassescere denique
negat *Molinettus p. 324.* Alii adtenuari
quidem, solo fundo excepto cui placenta
adhaereat, docent ut *Dionis p. 287. des accouch.*
p. 38. *Fried apud Golike de invers. uter p. 21.*
Nicholls p. 47. *Barles decouv. p. 3. Zod. Gall.*
ann. 1. febr. 53. in *E. N. C. l. c.* fundum
enim in primis crassescere certum est
Peyer E. N. C. Dec. II. ann. 7. obs. 204.
Sic in *E. N. C. Dec. III. ann. 9. 10. obs.*
103. fundus duorum digitorum crassitie
fuit, cervix ea, quae pennae anserinae
est. Parum adtenuari *Bergerus p. 496.*
fere uti *Praeceptor.* Verum nubes testi-
um demonstrat, uterum in praegnan-
te crassitie non minui *Plazzonus, p. 126.*
D. de Marchettis p. 126. *Harvei p.*

233. 273. 271. *Erndl. ex Ruychio* p. 89. *Peyer E. N. C. Dec. ll. ann. 7. obs. 204.* *Bourdon* p. 121. *E. N. C. Vol. 1. obs. 183. vol. 3. obs. 146. Cent. X. app. obs. 3. & Trevv. vol. 2. obs. 49.* la MOTTE L. V. c. 16. MOEBIVS *obs. 2. Manningham* p. 4. *Littre Memoir, de l'acad. 1702. p. 22.* Porro I. *Sylvius* in puerpera uterum unciam crassum vidit in *isag. & Mery* in puerpera octo linearum crassitie reperit *hist. de l'acad. 1707. obs. 2. & Heisterus* simile experimentum adfert, & *Noortwyck hist. uter. grav. p. 111. Palsynus* digiti crassitie in caesareis sectionibus invenit l. c. p. 55. & *Santorinus* p. 214. Ipse denique bis octo, & duodecim linearum crassitie vidi, quam in virgine uterus aegre superat. Sed augeri potius docent *Arantius de fetu* c. 1. *C. Bartholinus* p. 145. *Riolanus de fetu* p. 364. *enchir. p. 183. van Horne de duct. Sal. diff. ll. Heister. not. 31. & Collins* p. 568. & *Deventer*, qui fuse refutat *Mauricaeum* p. 32. 40. &c. & *Taurvy & Schurig. mul. p. 244. & Muralt. coll. anat. p. 238.* qui duorum digitorum crassitie repererunt l. c. & *E. N. C. Dec. I. ann. lV. obs. 192. & Dieffenbach de exscind. fetu* qui tres digitos crassum in puerpera reperit, & *Breslavienses 1726. p. 362* qui quaternos. Maxime vero in fundo crassescit, *Riolanus* l. c. *Nicholls* p. 47. la Motte l. c. *Douglas phil. trans. abr. lV. ll. p. 116. & Manningham* p. 2. ubi etiam sexuncis crassitie *Chapman* reperit c. 20. in eo nempe loco, ubi placenta adhaeret *Arantius de fetu* L. 1. du

DCLXXVI.

Molem) Ovum majus & globosius fit, & incipit mole sua uteri capacitatem replere ^a. Videtur autem tamdiu liberum manere, donec adeo magnum fit, ut convexitate sua uteri concavitatem contingat, ^a tunc autem cum eo concrefcere.

Ovi)

du *Portal* &c. Facile adeo vicerit ista sententia, & pauca contraria experimenta ad aliquem peculiarem collapsum vasorum referri possunt. Haec crassities utique a sanguine est, vasa uteri enormiter dilatante van *Horne* l. c. *Rau* l. c. *Deventer* p. 41. A partu tamen non penitus tollitur. Nam multiparis uterus crassior est *Galenus de diff. vulv.* c. 8. *C. Bauhinus* p. 171. *Riolanus anthrop.* p. 196. *Dionis des accouch.* p. 37. forte quod vasa resistantiam contra liquores suos nunquam penitus recuperent.

a Fetus adultior semper totum uterum replet, ut ipse vidi & *Littre Mem.* 1701. p. 386. & *Noortwyck* p. 10. & *Graaf* p. 179. & icon *Fabricii* exprimit. *Galeni* autem sententia, fetum semper uterum perfecte replere, sive magnus fuerit, sive parvus, omnino de solo fetu adhaerente intelligidebet *de form. fet.* L. I. ut in ipsum cervicis initium acutus ovi vertex descendat, quod vidi. & *Noortwyck* l. c. Verum, cum uterus fabae forte phaseolive majoris capax sit, ovum vero recenter fecundatum multo minus DCLXXV. not. a. oportet utique tempus aliquod consumi, donec ovum uterum repleat.

Hinc

Ovi) Intra tertium mensem ovum in utero anserino aequale ^b factum est, & fetus in illo uncialis. Inde demonstratur, fetum eo velocius ^c increfcere, quo tene-rior est & origini propior. LEEUWEN-HOECKIUS docet, vermiculum semina-

lem vix aequalem esse $\frac{1}{10000}$ grani fabuli, & hoc tamen granum citissime in uncias excrescit, postque novem menses novem librarum pondere est. Si pergeremus ita increfcere, in senectute certe multarum millium librarum pondere foremus. Verum, quo diutius increvimus, eo cre-scimus minus. Pueri ad decimum annum plus

Hinc sub initia gestationis liberum est DCLXXV. turget senim resorbtis hu-moribus, donec radices agat *Valisn.* c. IX, n. 14. *Handley Essays* p. 422. & c. ad-haeret autem utero, quando cum nunc replevit *Cyprian.* p. 26.

^b Incerta fetus incrementa esse, aliosque cele-riter, alios tarde augeri, adparet ex DCLXXV. not. *b.* multum enim hic plethorae gradus potest, aut morbi super-venientes.

^c Pone vermiculum = $\frac{1}{10000}$ grani arenae ex DCLL. pone arenae decem grana pendere granum unum. Erit vermiculi

pondus = $\frac{1}{100000}$ grani. Sit nunc fetus menstruus granorum 30. per BO-TALLUM de sang. miss. c. 3. & MAV:

plus increſcunt, quam inde ad vigefimum; ab eo vero tempore iterum tardius ad 25. annum, in quo ſtatuſ eſt.

Unire) Ovum convexa ſua ſuperficie replet concavam faciem uteri. ~~¶~~ *¶* Cum nempe fetus in utero manet, uterus autem diſponitur ad ſequentem menſium periodum, interim ovum maturius fit, vaſa explicantur, & totum ovum turgēt humori-
bus

MAVRICEAU p. 85. erit incrementum unius menſis = 3000000 molis vermiculi. Porro, ſi tertio fetus menſe fuerit triuncialis, uti idem BOTALLVS & MAVRICEAU, incrementum erit intra duos menſes :: 48. i. enormiter minus. Sed ab eodem triunce fetus intra ſex menſes reliquos fere duodecim librarum pondus acquirit. Incrementum adeo 8. menſium eſt = 3672 ies molis proprię fetus menſtrui, ſexageſies vero quater molem fetus trimestris ſuperat. Adeoque primi menſis incrementum, eſt ad incrementum menſis unius ex duobus ſequentibus, ſi æqualia poſueris :: 3000000. 24. :: &

:: 3000000 ad $\frac{10}{4}$ ad unum reliquorum menſium a 3. ad 9. Deinde fetus 12. librarum intra triennium dimidiam fere ſtaturam adtingit SPIGEL. de form. fet. c. 18. intra 25. vero annos ſit librarum 120. decuplo nempe ponderoſior. Adeoque incrementum primi menſis eſt = 3000000. unius reliquorum menſium ad tertium uſque eſt = 12. ſequentium vero

$\frac{4}{10}$ $\frac{10}{10}$: porro unius eorum, qui a partu ſequi-

bus albuminosis, & expanditur, testam enim non habet. Quando gravidæ cada-ver secatur, & uterus caute aperitur, ad-paret uterum cum ovo cohaerere^d, neque ullum

sequuntur $\frac{1}{60}$ primum ergo incremen-

tum ad ultimum 180, 000, 000. 1. Tan-tum valet teneritudo vasorum nascentium, comparata cum duritate vasorum jam natorum. Totum vero hominis incrementum est :: 921, 600, 000, 000.

1. MORGAGNUS ex arbitria 44. potentia duplicatae molis fecit rationem pueri recens nati ad conceptum :: 19, 200, 000, 000, 000, 1. *mechan. pract.* p. 282. BOURGUETUS vermiculum ad elephan-tem maturum facit :: 28, 000, 000. X8000, 000, 000, 000, 000. 1. *Lettre Philos.* IV. p. 138. BOESSELIUS etiam, quolibet mense duplo pondere augeri voluit *Comm Nor.* 1737. *hebd.* 34. sed fere ex conjectura. In pullo longe cele-rius incrementum est. Vermiculus enim galli. humano non major, intra 21. dies fit pondere duarum unciarum (vel granorum 1152. secundum BELLINUM *de motu cordis* p. 15.) nempe 96, 000, 000. ies major mole vermiculi.

- d Cohæsiō ovi cum utero in tenerioribus fit villorum ope, qui ex ovo, inbuto re-sorbtis per poros humoribus & turgente, (VALISN. c. 13. n. 6.) undique emergunt & in poros uteri se insinuant, ibique ad-haerescunt, ut uterini humores in ovum
per

ullum liquorem * inter concavum uterum & convexum ovum medium interponi. Abortus certe continuo fieret, si quantillum liquoris inter ovum uterumque, medium se interponeret.

Vasculis) Ovum crescit per invisibilia vascula f, dum humores ab utero recipit, tam

per poros ejus venosos subeant, arteriosi vero perinde in uterum se exonerent. Maturiori vero fetu manifestum est, villosam chorion villoso utero adhaerere, ita similem, ut vix distinguas, quid uterus, quid chorion sit NOORTWYCK p. 9. 13. Validam hanc vocat adhaesionem LITTE *Mem. de l' acad.* 1701. p. 316. & ego in femina, non exiguo a partu tempore, manifesto totam uteri caveam chorio adhaerente succinctam vidi, uti la MOTTE *obs.* 17. & chorii partem post abortum adhaerentem & relictam in utero NOORTWYCK p. 22.

e Cremorem aliquando paucum super chorion effusum vidit NOORTWYCK p. 10. & aliquid in vacca humoris HOBOKEN. *anat. secund. vitul.* p. 16. materiem denique albam mucilaginosam VENETTE p. 273.

f Placenta valde praecociter ex ovo nascitur; quantum per observationes colligo. Non ignoro HARVEIUM, ova humana in primis initiis glutinosa, & absque placenta esse pronunciasse p. 236. & exemplum pro sententia sua adferre p. 233. in fetu unguis aequali, quartoque mense, rudimentum demum placentae vidisse p. 184.

p. 184. fibrosaue demum ova esse RUY-
SCHIIUM adfirmare, quae aliquamdiu in
utero latuerint *Musf.* p. 170. DIEMER-
BROECKIUM denique placentam de-
mum die 30 vel 40. apparere, scripsisse
p. 200. Sed neque repugno; aut non
credo experimentis. Interim in recenter
impraegnatae feminae utero, a RUY-
SCHIO secto, invenio, ovum jam lanu-
ginem ostendisse. SLADO teste; in ACT.
HAFN. ll. n. 4. In embryo non majori
capite aciculae, placentam etiam vidit
RUYSCHIIUS *Cur. renov.* n. 43. In
ovulo nuci moschatae non majori, ini-
tium placentae IB. n. 56. In fetu octo
dierum cumini semini aequali ID. *cur.*
renov. p. 54. Decimo die in cuniculo
placentae ortum GRAAF. p. 311. Duode-
cimo die ovum humanum vasculis cir-
cumfusum, cum fetus milii grano non
major esset SANTORIN. *istor d'un feto*
n. 5. In embryo minimo, rudimen-
tum ejusdem RUYSCH. *Thes.* VI. n. 43.
T. 2. f. 1. In paulo majori, & fecalis grano
aequali pariter ID. *Musf. rar.* p. 162. &
maxima in alio semine paeoniae non
majore MUS. RAR. p. 170. & alio, semini
cucurbitae aequali *Thes.* IV. n. 40. Ovum
humanum juglandis magnitudine, fibro-
sum E. N. C. *Dec.* ll. ann. I. *obs.* 116. In
alio, ovi columbini mole basis pene carnea
Mauriceau obs. 233. Porro, cum fetu
muscae aequali, pars ovi levis, pars fibro-
sa *Vater de grav. appar.* p. 13. Vigesimo
quinto die, si experimentum verum est,
magna, & lunata placenta a BIANCHO
pingitur p. 58. ic. 10. Tertia vel quarta
septimana in ovi externa membrana

tam per eam partem, in qua placenta & adhaeret, quam in ea, qua chorion ovo ute-

massa carnea DIEMERBROECK. p. 185. In ovo paucarum septimanarum chorion extus villosa, & in summo initium massae sanguineae ID p. 183. Cum fetu apud aequali radices undique villosae BERGER p. 476. EVERARDVS denique, contra HARVEIUM, secundo mense se prodeuntem ex membranis placentam vidisse, refert in *praef.* Apparet adeo, ovum omnino placentam educere, uteroque prius adhaerere quam fetus perfectam figuram adeptus sit, quod HARVEIUS pro certo posuerat p. 284. & ex eo GRAAF. p. 294. 282. & valde probabile esse, quod SIMSONUS adfirmat, placentam nasci, quam primum ovum uterum replet & adhaeret l. c. p. 95. & CYPRIAN. l. c. Haec vascula, quae placentae primordia sunt, ex omni superficie ovi omnino undique exeant *Ruyfch. Thes. VI. T. I. f. 3 5. Heister comp. f. 27* & 27. Santerin Ist. d'un feto n. 26. Bianchi T. I. f. 5 T. II. f. * Comm Lit 1739 hebdomada 15. T. III. f. 7. S. Hartman. Phil Trans. n. 28. E. N. C. Dec. III. ann. 9 10. obs 191. Furggrav E. N. C. Vol. V. obs. 79. Noortwyck p. 110. Ex omni adeo superficie amnii fila longa, ramosa, fluitantia prodeunt, dicta olim Riolano p. 384. 712 Ludovicae Bourcier p. 26. & Viussenio nov. syst. p. 52. excepta parte cervici proxima Simson p. 99. non ergo, ex sola parte ovi, aut petiolo quae ovario adhaesit, ut supra varii p. 129. &*

uteroque medium interest. Nemo haec-
nus haec intermedia utrique vascula vel
micro-

& *Tauvry* p. 84. & *Hartsoeker suite des
conj. phys.* p. 114. neque unicum haemi-
sphaerium placenta occupat, uti *Bianchi*
p. 52.

Paulo profectiori fetui, qualem
sexta septimana ejectione bis aperui, uni-
versale, crassum, involucrum, chorii
simile est, sub eo placenta sequitur,
quam amnion emittit vasculorum specie.
Ita *Bianchi* T. II. f. 7. sed ex una parte
ovi, & ego, nam plerique anatomici, ad
alia autem experimenta, truncos ramo-
sos ex chorio ajunt exire & facile deter-
gi, ut *Noortwyck* p. 119. Sed in meis hoc
modo fuit. An ex sanguine coacto fa-
ctitiam membranam vidi? Ita summus
anatomicus *Albinus*: mihi tamen vera
membrana, chorii simillima visa fuit, &
confirmare videtur lamina illa chorii, quae
dicetur DCLXXIX. superexpansa placentae.
Nam & ea ubique subjectam inter-
ius placentam continet. Deinde *Harveius*,
& *Bohnius* primis mensibus decet distare
amnion a chorio, etiam decima septima-
na, & *Bohnius* expertus testis est p. 13.
atque aquam aliquando inter duas chorii
laminas reperit *Ruyseh. Thes.* n. 155. &
in ovulo *Schurig. sylleps* p. 105. Inde
elisis vasculis, natae placentae illae, mem-
branarum similes, quas *Ruysebius* pinxit
Thes. V. T. I. f. 2. *Thes.* VI. f. 4. & de-
scribit *Adv.* II. p. 29.

Sensim autem placenta retrahitur
Santorin l. c. n. 25 ut in fetu nuce
minori aliqua pars jam ovi absque villis

fit *Trew. Comm. Nor. 1735. p. 308. T. IV. f. 12.* & in fetu musca non majori partem levem repererit *Vater. l. c. Die 21.* placenta dimidio ovo aequalis fuit *Dodart. hist. de l'Acad. des scienc. 1701. p. 25.* Die 32. placenta magna quidem, sed multo minor ovo *Bianchi f. 11. & primo mense elapso, si Biancho fides, tertiam partem fetus unice cingit p. 52.* De istis ovis verum est, ovum ea parte sanguineum esse, qua fundo uteri adhaesit *la Motte L; ll. c. 24.* initium nempe placenta *obs. 172.* In ovo vero quintae hebdomadis utique *la Motte* supernam partem ovi villosam vidit *l. c.* Secundo mense & ultra, adhuc totum pene ovum placenta obducitur *Blasius apud Simson.* Nona septimana *Backius* ex acutiori vertice filamenta rufescentia prodire adnotavit. Tercio mense fere ex medio ovo placenta filamina pingit *Heisterus l. c. f. 27.* sed monet adfuisse plura, & consentit *Harveius p. 230.* Quinto mense ovi pars membranea placenta aequalis est, deinde illa sola crescit, & multo major fit *Simson Soc. Edimb IV. p. 103.* In fetu suo pene adulto tertiam partem ovi occupasse docet *Noortwyck p. 14.* Video tamen quarta septimana placenta hydaticam *Hartmanni* totum adhuc ovum cinxisse *Phil. Trans. n. 238.* Adparet adeo, omnino eo majorem placenta esse, quo fetu minor est *Riolan. p. 412.* *Hartman. E. N. C. Dec. III. ann. 9. 10. obs. 191.* ut pars levis in ovi initio totum ovum occupet, in maturo ovo non nisi minorem partem *I B. Monroo Edimb. soc. ll. p. 145.* Hinc etiam acetabula fetu
cres-

microscopio ^h vidit. Et tamen toto novem
mensium tempore debent per haec vasa duo-
decim

crescente minuuntur *Aristoteles hist. anim.*
L. VII. c. 8. In brutis autem, uti pla-
centae alia ratio, ita ova non villosa
sunt HARTMAN.

h Plurima de his vasis disputatio fuit. In fe-
mina gravida videram, chorion pulposam
totam undique adhaerere concavae uteri
superficie, tum ubi chorion est, tum ubi
placenta dicitur, & avulsam floccos tra-
here innumeros, atque facile, nisi ani-
mus advertatur, lacinias utero innexas re-
linquere. In alia vero femina, majori
fetu gravida, chorion productiones emit-
tere manifestas in sinus uteri, uti villi uteri
se in chorii sinulos in miserant. Sed ube-
rius Cl. NOORTWYCK, ovum solutum
hirtum esse, ob cellulosa & vasa, quorum
ope ad uterum adhaeserat p. 9. 12. Ista
quidem vasa numerosa a chorio in ute-
rum ire p. 9. Sed tenerrima, & arach-
noidea esse p. 11. & venosa videri, & re-
spondere vasis uteri, ut vas vasi occurrat,
maxima vero caput aciculae admittere p.
9. Trunculos autem venosos addit ma-
jores sinus intra chorion fecisse, inde in
ejus profundiora se demersisse p. 10. Fun-
gosam adeo externam partem chorii, forte
vasa esse, non repleta p. 13. Fibrillas
HOBOKENUS dixerat p. 179. & DRE-
LINCOURT de chorio n. 17. MAURI-
CEAU p. 217. BIDLOUS T. 58. qui-
bus chorion utero adhaereat; pelliculas
molles, & mucosas, quae hinc utero inde
chorio adnascerentur MALPIGHIIUS ad

librae humoris, totum nempe fetus maturi pondus, transiisse, ut aliqua adesse necessario sequatur. Quando nunc ovum ab utero resolvitur, nullum in convexa superficie foramen est, ex quo vasa ^{h*} adesse discamus.

Spon. p. 30. VIEUSSENS de fabr. uter. & plac. Totum tamen chotii nexum omnino modicum esse, ovumque facile solvi, NOORTWYCKIUS vidit, p. 9. quod perinde reperi. Cum autem chorion placentam exterius obducatur, facile intelligitur, non aliam placentae cum utero connexionem esse, nisi quam a chorio habet NOORTWYCK p. 14. Non utiliter adeo la MOTTE membranas placentae ope utero necti dicit p. 247. aut VIEUSSENS apud VOGLI, quando tunc sola involucra ali, falsumque germen nasci ait, ubi ovum utero alia parte adhaesit, quam quae chorion habet II. p. 188.

^{h*} Ita dudum GALENUS, post veteres, ova vasorum uteri eminere in praegnantibus, facere cotyledones, dictas *Diocli*, *Praxagorae* *Coo*, *Philotimo de uteri diff. c. ult.* & recte *Spigelius*, cotyledones uteri, non placentae vasa esse, monet *de ferm. fet. p. 2.* Deinde pelliculam illam *Hippocraticam* adnasci ait, ibi solum, ubi oscula vasorum sunt, hancque pelliculam in secundas fieri *de semine L. I. veraque acetabula humana fines vasorum esse, per quae menses manarunt l. c. & de util. part. L. XV. c. 4.* & vasa chorii utero innexa instar arboris dividi *IB.* venas ad venam uterinam, ad arteriam arterias adhae-

camus. Et tamen certissime via aliqua est, ab arteriis minimis uteri, in venulas incipientes placentae & chorii.

Men-

haerere 1 B. & *de util. part.* L. XV. c. 4. Vasa minutissima placentam cum utero conjungere *Fabricius* P. I. c. 3. Mucosa filamenta araneorum telae similia a cornubus uteri progerminare *Papi* apud *Vogli* II. p. 19. Vascula vero capillaria superficiei chorii intexi utero *Hobokenus* *anat.* prior. f. 3. Radiculas villosas chorii & acinulos placentae in sinulos uteri tubire *BERGER* p. 473. *BRENDEL* *de nutr. fet. n.* 6. 9. Siphunculos etiam exhalantis uteri, qui menies fundebant, radices placentae admittere *Santorinus* *obs.* p. 218. & hunc ipsum menium utrum esse, ut vasa, quae cum placenta conjungi debent, aperiant *GRAAF* p. 275. Vasorum placentae ramulos extrahi de uteri poris, & erigi, & in utero respondentia foramina adparere *Idem* p. 296. Vascula uteri lymphatico-nervea cotyledonum radices esse *Vieussens* *nov. syst.* p. 17. Infinitas arterias chorion perforare, ut ab utero ad placentam eant *Rouhault* *observ. fis. med.* p. 9. Et in brutis, evellendo cotyledones multa vasa, quasi radices avelli *Tiling* *de plac.* p. 307. ut dudum, cum tubercula avellerentur, de utero puncta rubra viderit apparere *Fabricius* P. I. c. 1. etiam in ove P. II. c. 3. eademque viderit *Hobokenus* *anat. secund. vit.* p. 28. 30. f. 16. 17. Dudum ergo conjunctio ista nota fuit, aliqua vero addita a recentioribus, quae dicuntur not. g. 1. & ad DCLXXVIII. DCLXXIX.

i *Maxime, in Textu.*) Placenta utero adhaeret non uno semper loco, *Graëfio* notante p. 294. & *Riolano* p. 374. & *Spigelio de form. fet. c. 2.* & *Simson l. c. p. 81.* & *A. Paescoli de hom. L. III p. 84.* & *Cl. BÖHMER de sit. uteri p. 16.* plerumque tamen inter tubas *FALLOPIO* auctore p. 198. b. & *Riolano*, quae eadem sedes uteri ideo magis videtur extensilis facta esse, ut subnascanti placenta cedat *Deventer p. 40. 41.* & vasa sinusque majores habet *Riolanus p. 366.* *STAHL p. 511.* Alias ad latera *Drelincourt perioch. 36* antea visa est adhaesisse, uti *Arantius p. 15.* *Deventer p. 38.* *Soc. Edimb. II. p. 450.* *Bresl. 1725. m. Jul. Monroo Edimb. Soc. II. p. 128.* & *Parsley ib. IV. p. 450.* Alias posterius *Deventer l. c. Noortwyck p. 12.* quod frequentius vocat *Vesalius L. p. 672.* & *Spigelius.* Aliquando praeterea in latere dextro adhaesit *Vesal. ib. Peyer E. N. c. Dec. II. ann. 7. obs. 204.* *Simson Edimb. IV. p. 115.* *Goelike apud Ettmuller in epist. probl. 17.* aut in sinistro *Vesal. ib. Trew. Comm. Lit. 1735. T. IV. f. 11.* *D. Verheyen L. II. p. 321.* *Tauwryus* prope tubas adnasci ait, ut centrum alteri tubae respondeat p. 99. idque naturale esse, ob viscum, quem tubae generant, ovum retinentem. Ad latera etiam uteri semper adhaerere *Venette p. 248.* sed id non videtur, uti neque *Riolani* observatio confirmatur, qui primo mense placentam alterutri angulo uteri adhaerere, paulo post toto corpore suo ad anteriorem vel posteriorem partem adfigi ait p. 374. Ori denique interno cum summo periculo matris adhaesit in *Hist. de l' Acad. des scienc.*

1723. *obs.* 2. & apud *Bresl.* 1726. p. 132. & *Horne Wehmutter* p. 64. ut tamen leniter avulsa fetus manu possit eximi *Boehmer* l. c. p. 23. Ad sedem adhaerentis placentae uterus minus, quam in ruminantibus, sed paulum tamen elevatur *I. Sylvius* (qui forte, cum granis salis non majores faciat cotyledones villos intelligit) *Ruysch. Thes.* V. n. 46. *VATER.* in *icone*, *SCHENCK.* p. 316. (ubi quinque inaequalitates numerat), *Cl. Hartmann* de *secund.* p. 15. *DOUGL. Phil. trans. abr.* Vol. IV. T. 6. f. 2. Haec adhaesio non semper aequae firma est. Laxior abortum, validior difficilem partum facit, Firmitatem adparet pendere a multitudine & duritie ligamentorum, & vasorum not. g. Addit *Ruyschius*, quo perfectius centro placentae funiculus adfigitur, eo validiorem nexum esse *obs.* 97. *Adv. anat.* Dec. II. n. 10. de *musc. uteri* p. 10. felicem autem aberrationem esse, si a latere insertus fuerit *Thes.* VIII. n. 15. Eas aberrationes *Arantius* vidit, & *Simson Edimb.* Eff. IV. p. 111. & *Hoboken. anat. rep.* p. 44. 189. 232. 260. Habentur etiam in *E. N. C.* Dec. I. ann. IV. *obs.* 195. & frequentiores esse centrali insertione *Noortwyck* p. 128. & nunc video, funiculum pene margini placentae adhaerere, uti *Hoboken* l. c. p. 149. Sed denique haec adhaesio plerumque ad angulos inaequalis est, rarius ad perpendicularum *Hoboken anat. rep.* p. 44.

k *Tubercula, in Textu.*) In hac adhaesionis sede convexa facies placentae, utroque respondens, inaequalis est, & tuberculosa *Riolan.* p. 369. *Faber ap. Hernandez*

p. 615. *Graaf* p. 295. *Mauriceau* p. 225. *Noortwyck* p. 19. *Fabric. ab Aquap. de form. fet.* T. II f. 5. *Bidloo* T. 55 58. *Verheyen* L. II T. V. f. 2. *Hoboken anat secund human.* p. 14 f. 1. f. XI *anat. repet.* p. 12. 22. f. 2, & 23. *Ruyfch Thes.* VI n. 90. semiglobis naturalibus divisa *Rouhault. Mem. de l'Acad.* 1715. p. 131. quos faciunt magni rami vasorum placentae IDEM ibidem p. 133. incerto numero, plures certe quam quinque, uti numerat *Bartholinus Hist.* 61. *Cent. I.* fulcis inter tubera distincta *Bartholin* l c. *Mauriceau* p. 225. *Rouhault off* p. 8. qui respondent similibus uteri inaequalitatibus supra dictis, non in teneris solis placentis, quale exemplum *Bianchus* pingit ic. XI sed in matura etiam placenta & a peritis extracta anatomicis, ut a *Ruyfchio Thes.* V T I f. 1. quod ex icone patet, aut in utero relicta apud *Noortwyck* p. 14. etsi *Ruyfchius* videatur rudiori encheiresi tribuere ib. n. 57. partuique *Rouhault* p. 8. de profundiori forte fissura locuti, qualis aliquando ad oppositam membranam usque penetrat *Idem* 714. p. 181. Sed neque optime ex *Sylvio* miliares vocat asperitates *Riolanue* p. 369. quae adeo magnae sint. In eos sulcos chorion descendit *Noortwyck* p. 19. &c. conf. DCLXXVIII.

Pari proportionem] Haec nunc placentae adhaesio firmior est, quam chorii. In utero nempe crescente uteri superficies interna rarior est *Vesal.* p. 657. vasa ampliora, enormis diametri *Noortwyck* p. 12. &c. digitalia *Edimb.* IV. p. 450. sinus apertissimi

simi DCLXIV. ut digitum admittant *Edimb Soc.* V p. 450 ita via aperitur, ut sanguis versus placentam determinetur *Simson* p. 75. 77. du per uteri grad vidi venas, compressas a tumore finuum, sanguis difficiliter redit *Id.* ib. & ex eadem ratione uterus distenditur, sanguine per arterias in laxos sinus irruente, neque redeunte per inpeditas venas p. 77. oscula vero finuum laxata chorion & placentam facilius admittunt V A T E R *uter. grav.* p. 13. Haec vasa patula, plurima in utero, maxima sunt, ubi placenta adhaeret NOORTWYCK p. 11. Tunc etiam vasa numerosa ex placenta manifesto eriguntur, porisque uteri se inmittunt, paulo majora, quam in chorio NOORTWYCK p. 15. Hujusmodi vasa etiam GRAAFIUS dixisse videtur T. XII. & DE VENTER p. 49. quando placentam conglutinatam uteri vasis describit, ut absque sanguinis effluxu nequireret detrahi, hinc per totam superficiem villosa esset, Sed etiam DRELINCOURT *Per.* 3^a & BRENDELIUS bulbillos vasculosos placentae subire in vaginulas s. cavernulas uteri docet n. 9. & in superficie placentae versus matrem oscula aperta vidit MAURICEAU p. 225. Porro vascula in superficie placentae nuda dixit FABER l. c. p. 615.

Inprimis autem ad radicem placentae limitemque, quo a chorio separatur, placenta firmiter adhaeret per ligamenta NOORTWYCK T. II. fibrarum ligamentarium nomine olim RIOLANO dicta p. 369. & cellulosam telam tenaciorem p. 10. & vasa magna T. II. A. A. A. quae digitum

Menstruae] Feminae semper ^m concipiunt post ultima menstrua, & vix ullo alio

tum recipiunt NOORTWYCK p. 10. sinusque sunt mollissimi, venosi T. II. C. in quos vasa parva ex profunditate placentae infunduntur p. 10. T. II. G. In hos sinus materia uteri vasis injecta venit NOORTWYCK l. c. respondere enim videntur magnis eo tempore uteri sinibus ALBINVS apud NOORTWYCK p. 11. non satis semper manifesto NOORTWYCK ib. cum viderit angustiora reddi versus uterum, neque vasa habere in utero, quae sibi respondeant. Ita etiam in cotyledonibus cuniculi pars alba, uterina, glandulae, foramina habet; per quae rubra pars, fetui propria, inflatur GRAAF p. 314. & olim MALPIGHIVS, in sinuosis cavitatibus uteri succum colligi, qui per fistulotas radículas venis fetus instillaretur l. c. p. 35.

Caeterum ex hac descriptione adparet, quam necesse sit in ea ratione, qua uteri vasa sinusque distenduntur, etiam placentae vasa, adeoque fetum increlcere. Vis enim eadem, quae sinus replet, & vasa uteri, respondentes etiam sinus, & occurrentia vasa placentae distendit.

^m Femina concipit post menses GALEN. *de diff. uter. c. ult.* MAURICEAU p. 205. *Dionis. accouch.* p. 127. 169. ad diem sextum usque *Manningham* p. 50. etiam nimios *Comm. Nor.* 1732. *hebdom.* 6. hocque optimum tempus est MAURICEAU p. 62. HARVEI p. 273. Etiam post uteri haemorrh-

alio tempore. A primo congressu post menses feminae sanae possumus tempora graviditatis dimetiri. Si die v. g. 4. mensis menses uxori cessarunt, quinto vero virum admisit, potest tuto graviditatem ab eo coitu repetere, licet multi alii ante primum mensem reditum succefferint. Neque aequè feliciter fuerit, si alio tempore conceperint. Nam fetus primo tempore, quo in utero haeret, non potest non turbari ab accedente fluxu mensium. Quae feminae non magnam jacturam sanguinis pati solent, eae vix abortus patiuntur, facile vero tertio mense fetum perdunt, nisi venae sectione copiam sanguinis minuerint. Si enim effluerit tantum sanguinis ⁿ, ut inter ovi gibbam

morrhagias facilis conceptio la MOTTE *obs.* 212. Hinc olim ad conceptum venirem sub mensium finem laudat PAULUS L. III. c. 74. & hoc arcano dicitur FERNELIUS sterilitatem Catharinae Mediceae vicisse VENETTE p. 43. Addit HARVEIUS, etiam instantibus mensibus bene concipi l. c. quod contrarium videtur observationibus prius adductis, ob menses continuo secuturos. Vasa quidem uteri tunc tumidissima sunt. Etiam mensem tempore concipi potest MAURICEAU *obs.* 676.

n Hinc illae observationes RUYSCHII, quas etiam bis proprio experimento vidi confirmatas, placenta abortuum bimestrium *Tbes.* VI. n. 81. & trimestrium *Tbes.* VI. n. 100. sanguine grumoso adhaerente augeri, ut majores videantur, quam sint. conf.

bam uterique cavam faciem se insinuet, tunc ovum solvitur, & haemorrhagia fit.

In ovum) Omnis pars Chorli adhaeret utero, vera concretionem, maxima tamen ad-

conf. *Thes* VI. n. 15. & in minimo fetu capiti aciculae aequali placentam cruore inbutam se vidisse *Cur. renov.* n. 144. Ovum extus cruore tinctum habet BERGER p. 469. Placenta cruore plena cum fetu fabae magnitudine MAURICEAU *obs.* 259. Hic sanguis irretit fibrillas ramosas placentae molasque efficit NOORTWYCK p. 120.

Aliquando tamen menses prima vice fluere post conceptionem SIEGMUNDIN p. 192. MAURICEAU *obs.* 629. 463. 366. & altera vice E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 6. 7. *obs.* 63. MAURICEAU *obs.* 168. & aliquoties DIONIS p. 163. ad quintum mensem E. N. C. l. c. *Mauriceau* p. 72. totaeque demum tempore SIEGMUNDIN l. c. DIONIS p. 163. & copiosa exempla prostant, mensium & stillicidii innoxiorum in gravidis PECHLIN *obs.* 36. *Cent.* I. E. N. C. *Dec.* I. *ann.* IX. *obs.* 29. *Mauric. obs.* 388. *Dionis des accouch.* p. 171. *Deventer* c. 15. &c. ut sint, quae tunc imprimis, quando utero gerunt, menses patiantur E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 3. *obs.* 348. *Cent.* VI. *obs.* 75. *Comm. Bonon.* p. 152. In plethoricis gravidis menses absque noxa fluunt *Roussel Sect.* VI. p. 153. E. N. C. *Cent.* I. *obs.* 46. *Dionis* &c. Alias etiam haemorrhagiae in gravidis accedentes, neque partum, neque mortem praecipitant, summa cura adhibita MAURICEAU p. 160. *obs.* 30. 247. 356. 410. 480.

adhaesio est, ubi placenta ponitur, per istam enim, quae prius fuit vitellus, praecipue fetus alitur. Maneat inmota placenta, & fetus expellatur, ne una quidem sanguinis gutta effluet. Si vero etiam placenta exiverit, tum vero sanguis quasi de victima summo impetu exiliet integris unciiis. In partu naturali nullus sanguis profluit, nisi postea, quam chorion & placenta de utero solutae fuerunt. Ergo sanguis steterat ante placentae superficiem. Sed non stagnavit ibi, id enim circulationi sanguinis repugnaret. Ergo videtur placenta cum utero in unum quasi corpus coalescere, ut fetus unam cum matre vitam vivat, unum calorem habeat, & motum, et ab ea alimentum accipiat.

DCLXXVII.

Funiculo) Magna in origine funiculi obscuritas est. Si dicas, ex vermiculo a masculo qui

541. 542. 595. 648. E. N. C. Cent. X; obs. 43. PUZOS ACAD. de CHIR. I. P. II. p. 212. Exiguitas fetus, & debilitas, & eximia plethora priora phaenomena explicant: exiguitas autem partis separatae & major latitudo ejus, quae adhaerens remansit, posteriora. Naturaliter tamen a sanguine. post primum mensem effluente, abortus sequitur HIPPOCRATES. MAURICEAU obs. 136. fetusque nimis exigui MAURICEAU l. c.

o DCLXXXV.

a Nullum dubium est, funiculum pertinere ad
Tom V. Pars II Q id,

lino' oriri, respondendum est, quo modo ad placentam adhaeserit & quomodo vena ex fetu prodierit, venae enim eunt ad cor, ex corde non veniunt. Si ex placenta velis provenisse, quaeretur, quomodo in abdomen fetus radices agere potuerit, & arterias inserere aortae? Abstrusum certe, quidcunque moliaris, negotium est. Iterum DEI hic digitus est, qui omnia simul fecit, quae possunt per experimenta singulatim addisci, simul autem observari nequeunt, uti simul a CREATORE facta sunt. Eo tamen animus mihi inclinatur, ut credam, funiculum a prima origine cum fetu adfuisse, viamque esse, per quam primum seminale animalculum irrepsit. Id cer-

id, quod primaevum stamen est animalis. Ita suadet analogia seminum plantarum PERRAULT *mecan. des anim.* p. 486. tum peritonaei in involucrum funiculi productio, denique origo arteriarum ex aortae trunco, quae non aperiri potuit, ut ramos faceret, absque exitio fetus; & analogia oviparorum, in quibus utraque membrana vitelli fetui propria est MAITREIAN p. 299. & altera intestinorum membranae continuatur p. 295. Videtur autem arteria, venaque umbilicalis in vermiculo fuisse organum, per quod egressit superfluos, reserbsit aliquos necessarios humores, ex ipso semnali liquore: tunc autem conceptum secundum esse, quando arteriae umbilicales se in respondentia ovi vascula inmittunt DCLXXII, not. I. Ante id tempus intra abdo-

certum est, fetum secundo jam mense ^b ad
placentam suam adfigi per proprium suum
funi-

abdomen fetus latuisse credibile est, &
ipsa illa actione, qua conceptus perficitur,
primum erupisse. Ita vicissim non in
pullo solum, per MALPIGHII obser-
vationes & LANCISII *de corde* p. 44.
sed in dama, & reliquis animalibus vi-
scera paulatim in pectus retrahuntur,
quae nuda prius fuerant H A R V E I
exerc. 69. p. 234. &c. Cl. HEBEN-
STREIT in proprio *Programm* funiculum
ad secundas, non ad fetum pertinere ma-
luit. Confer etiam BOURGUETUM *lett.*
phil. III. p. 89.

b Dudum ante hoc tempus. In fetu 7. die
funiculus BIANCHI f. 5. In embryone
octavi diei non majori grano cumini
funiculus & placenta RUYSCH *cur. renov.*
n. 54. In abortu capite aciculae non ma-
jori funiculus ID. ib. n. 143. In cuniculo
die decimo umbilicus GRAAF T. XXVI.
f. 8. In fetu duodecim dierum milii
grano non majori funiculus umbilicalis,
rubra jam distinctus linea SANTORIN.
Istor. n. 5. In fetu formica multo mino-
re pingit BIANCHI T. 1. f. 5. & describit
BERGER p. 469. in fere simili In fetu
cervino dimidio lupino non majori, fu-
niculus LUDOVICIE N. C. Dec. I ann.
8. *obs.* 17. Non male adeo GALENUS,
prima omnium vasa umbilicalia oriri *de*
form. fet. Sed quaenam sunt duae radices
dorsales, quas VAROLIUS ante umbilici
funem apparere, dorsoque immitti, eoque
apparente in fetu apud mole evanescere

funiculum. Is semper eo major est^c, quo fetus tenerior, & propior origini, eo minor vicissim, quo propius partus abest. The-
sauros RUYSCHIANOS nunquam non do-
leo

scribit p. 103. 104. & repetit ex VARO-
LIO RUPERTUS BESLER *obs.* p. 10?
PAWIVS, pro arteriis umbilicalibus ha-
bet *obs.* 16. sed manifesto distinguit in-
ventor.

c In fetu seminis paeoniae mole RUYSCH
mus p. 170. & in altero seminis cucur-
bitae aequali, funiculus aequalis fetui
Thef. IV. n. 40. Eadem in semunciali
proportio *Thef.* VI. n. 47 T. 2. f. 5.
Crassior etiam funiculus, quem pro hy-
tatide habet IDEM n. 45. T. 2. f. 3.
forte nihil a naturali differt: Ipse enim
similem vidi bullae verissimum funicu-
lum, in cujus altero fine punctum ru-
brum arteriam indicaret. Latum etiam
habet BIANCHI f. XI. HEISTER f. 27
DIEMERBROECK, in fetu octo septi-
manarum p. 184. & HARTMAN *Phil.*
trans n. 238. & TREWIUS *Comm. lit.*
1739. f. 9. 10. 11. & in universum pri-
maevi fetus funiculum latum brevem-
que esse DIEMERBROECK l. c. &
BIANCHI p. 55. Alibi tamen gracilem
& longum pingit in aequae parvis fetu-
bus RUYSCHIVS ib. f. 24. Porro du-
dum VAROLIUS funiculum brevem esse,
quamdiu fetus musca non major est p.
104. Deinde in his omnibus exemplis
absque intortis spiris est Sensim tor-
quetur. Inter tertium & quartum men-
sem

leo ^d, ex interiori Europa in Russiam exportatos nobis periisse. In iis thesauris ^e anthropogenia erat, quam nunquam absque admiratione vidi, sed vidi saepe. Fetus humani erant; a grain sabuli magnitudine, ad aetatem novem mensium. Vidi ibi, ovum eo majus ^f esse, pro fetus sui portione, quo fetus propior origini, & vicissim eo minus, quo propior idem partui fuerit. In primis initiis fetus fere vigecuplo minor est ovo: post tres menses ovum abortivum anserini ovi mole majus est, fetus autem pene

sem his circa collum intortum vidit
 CHAPMAN *improv. of midwifry case*
 39. Strangulatum autem funiculo nimis
 contorto fetum LITRE 1701. p. 118.

d Ipse tamen PRAECEPTOR suasor fuit, ut
 amicus thesauros venderet, non alium
 facile reperturus Maecenatem, qui tri-
 ginta florenorum millibus ossa, & repleta
 cera viscera redimeret.

e Enumerantur tere in *Thesauro* VI. Ab eo
 tempore novos reparavit fetus, in *Thes.*
maximo & in *curis renovatis* recensitos.

f Verissimum est, & ab ipsa enormi parvitate
 ve miculi pendet. Vide RUYSCHII
 icones *Thes.* VI T. 2. f. 1. 2. 3. 4. 5.
 Ibi fetuum minimus pediculi fere magni-
 tudine pingitur. ovum vero fescuncem
 longum. Maximi vero fetus ovum paulo
 majus est, cum fetus avellana potius ma-
 jor sit. Ita SANTORINUS die 12 fe-
 tus milii grano, ovum pinei putamini
 aequale vidit l. c. Quando fetus hordei
 semini aequalis est, ovum columbino

pene pollicis. In puero vero recens nato infans triplo ponderosior est conjuncta mole placenta^e tuae, & funiculi, & secundarum. Situs fetus in ovo is est, ut id in verticem acutum extenuetur, in eo vertice^s autem fetus sedeat: uti in embryone vidi, qui formica non major erat.

Vasis) Funiculus umbilicalis neque membraneus^h est, neque cartilagineus, sed firmior

non minus est; quando fetus apⁱ magnitudinem habet, ovum gallinaceo par est VAROLIUS p. 103. Ovum fescuncis diametro, vigesimo primo die fetus exiguus DODART. *hist. de l'Acad.* 1701. p. 24. In puero apⁱ non majori ovum gallinaceo suppar la MOTTE *obs.* 134. *in refl* & 338. 381. & duabus tertiis palmae *obs.* 304. PINAEUS denique die 12. vel 21. fetum formicae aequalem, aquarum selibram describit p. 138. Idem confirmant funiculi GRAAFIANI, cum cellulis suis comparati. Et in universum ovi in fetus initis rationem maximam esse observarunt HARVEIUS, DODART. l. c.

g Non invenio. Plerique fetum in medio pingunt. VATERUS ab initio fetum lateri ovi adhaerere scribit *mol. praegn.* n. 6. idoneus auctor. In praegnantis feminae ovo acutus vertex erat, descendens in cervicem: in eo fetus NOORTWYCK p. 104. conf. p. 14 15.

h Funiculus in universum nomini satis respondet, intortus spiraliter ROYHAULT l. c. f. 1, 6, 8. BIDLOO T. 60, &c. fulcis-

mior valis, mollior cartilagine, & quasi
χονδρώδης. Ita factum est, ut vasa in
 situ

fulcisque notatus per longitudinem BAR-
 THOL. p. 318. & cylindricus plerum-
 que, nam etiam inaequalem vidit ROU-
 HAULT, & pro latitudine praelongus,
 ad duas tertias ulnae & ultra MAURIC.
 obs. 401. Involucrum a peritoneo esse
 dicitur, manifeste continuato, ROUHAULT
offeru p. 25. ut etiam herniam viderit
 ALBINUS, ab intestinis in funiculum
 illapsis, & similem DOUGLAS *de periton.*
 n. 28. sed de peritoneo mihi non-
 dum liquet. In opposito sine uti-
 que involucrum venit ab amnio
 HOBOKEN p. 28. & *secund vitul.* p. 80.
 subtile, forte, inseparabile. Sub eo se-
 quitur mucus ille ARANTII p. 27. substan-
 tia nempe cellulosa, HOBOKENO fibrosa,
 membranosa, & humida dicta *anat.*
secund. bum. p. 28. 50. & RUYSCHIO nota
 qui spongiosam pridem dixit *Thef.* I.
ass. 3. n. 7. & BIDLOO, ut ex icone
 video T. 60. f. 4. uberius autem ROU-
 HAULTO, qui *spongiosum corpus* vo-
 cavit *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1714.
 p. 406. f. 9. 10. 7. & in *Qss. Fis. Med.*
 Verae nempe cavernulae sunt, majuscu-
 lae, continuae, ut per totam longitu-
 dinem inflari possint, ab ipso fere um-
 bilico ad placentam usque, aut ad pri-
 mam certe adhaesionem amnii, et va-
 forum divisionem ROUH. *offeru.* p. 26
 Haec cellulosa fabrica aquam resorbet,
 hinc rarefcit macerando, & funiculus in
 aqua turget NOORTWYCK p. 29.

situ firma retineat , neque tamen oblit aut flexili-

Paulo citra umbilicum desinit, quinque fere linearum ab abdomine distantia ROUHAULT *Mem. de l'Acad.* 1715. p. 136. Hae cellulae gelatina plenae sunt limpida, sive viscoso succo FABER apud HERNANDEZ p. 615. ROUHAULT *off.* p. 26. Mucō comparavit BIDLOO ad T. 59. gelatinae WHARTON p. 243. & DIEMERBROECK p. 221. Exprimi potest in recente RUYSCH *Thes.* 1. *ass.* 3. n. 7. & sapore est quo amnii liquor, WHARTON l. c. Hoc est limpidissimum serum, quod umbilico reciso stillare vidit VALISNERIUS ll, p. 51. neque optime solis ruminantibus tribuit TAUVRÿ p. 134. Vasa succifera funiculi BIDLOO dicta & MUNNICKLO p. 88. quorum ostia pingit ille T. 60. f. 2. 4. negat vero COWPER ad T. 58. videntur mihi hae ipse cellulae esse, neque alias credo esse papillulas innumerabiles, quas terminare gelatinam funiculi WHARTONUS dixit p. 243. neque denum alia sunt vasa illa lactea DIEMERBROECK ll, quae per funiculum ad amnion & chorion credit ire p. 213. 222. &c. In hoc corpus septa descendunt, dicta Cl. NOORTWYCK p. 24. 30. ad placentam firmiora p. 23. quae figura & directione variant ib. ut modo parallela sint, modo se ad figuram literae T fecent, modo duos circulos minores de majore rescindant, quod cum ROUHAULTI icone satis convenit NOORTW. T. 3. f. 5. 6. 7. 8. totamque cellulosa-

fabri-

flexilitatiⁱ propriae, quam frequentes fetus motus & subsultus necessariam reddunt, aut sanguinis per venas & arterias itineri. In hoc funiculo duae arteriae sunt, vena unica, intortae omnes. His vasis praeter arteriam & venam urachus^k accensetur, qui ad allantoideam, aut Cl. HALE sacculum, tendit: Vena autem ad finem portarum fetus fertur. An eo radicatur ex placenta orta^l? an in placentam se infigit, postquam de corpore profiliit? Utrumque difficile est intellectu.

DCLXXVIII.

fabricam in tres partes dividunt, quarum quaelibet unum vasorum fetus continet. Venam tamen magis plerumque superficialem esse *Roubault* p. 407. t. 9. 10. In homine funiculus longior est quam in ullo brutorum, triplo & quadruplo ARANTHIUS *de fetu* p. 23. CLEMENS *de funic. umbil.* ut fetum miris modis ambiat, & aliquando strangulasse visus sit RUYSCH *obs. Chir.* XI. RIOLAN. p. 379. COMM. NOR. 1731. hebdom. 20. MAURICEAU *obs. post.* 132. aut alioquin nodis se contorsisse MANNINGHAM p. 7. MAUR. *obs.* 312. 567. *poster.* 38.

i Huc imprimis facit cellulosa fabrica muco plena. ROUHAVLT credit idem corpus arterias & venas comprimere posse p. 54. ita sanguinis motum adjuvari. Id vero a gelatinoso & mucoso corpore non expecto.

k DCLXXXIV.

l Confer. not. a.

DCLXXVIII.

Crevit) Uteri cavitas nihil, nisi ab ipso utero, ejusque arteriis admittere potest. Idem autem uterus inpraegnatus in eadem ratione amplior ^a fit, in qua fetus increvit. Id admiratus est **GALENVS** ^b, quod uterum videret perinde crassitie augeri, uti ambitu crescebat, cum tamen omnes aliae membranae ^c expansae gracilescant. Non ideo dixerim, uterum inpraegnatum virgineo crassiorem esse; id volo,, videri crassiorem intuentibus, quia crassities non minuitur, dum ambitus supra modum augetur. Hic autem uterus intus non levis est, sed in quaedam quasi tubercula ^d intumescit in muliere, ad quae asperae eminentiae placentae ita congruunt, ut jugis sulci placentae occurrant, tubera vero placentae in uteri convalles se insinuent. Hinc fit, ut, dum auferitur placenta, in utero foveae adpareant, muco plenae ^e, uti tubera placentae in
eodem

^a Conf. DCLXXV. not. *a*.

^b Contrariae tamen sententiae auctor, nam uterum sub initia inpraegnationis crassescere dixit, deinde iterum ante partum extenuari. *ib*.

^c Recte **DEVENTER** membranas per morbos intumescere monet p 34.

^d Ex **VATERO**: confer DCLXXVI. *k*. ego vero in duobus gravidis uteris nulla memoria digna vidi. Placentae vero tubera plerumque chorio super fissuras ducto levigantur.

^e Aut ex brutis habet **PRAECEPTOR**, aut
finu

eodem mucos ponuntur. An vasa minima sunt, quae mucus videntur? Non absque frequentibus exemplis est, vasa minima corporis humani muci f specie adparere.

Sanguis) Femina inpraegnata menstruum sanguinem nullum emittit, is adeo unice utero impenditur, & is solus incrementum accipit, dum reliquum totum corpus detumescit.

Fetum

sinus vult mucosos dictos DCLXIV. Vasa vero exhalantia uteri villorum specie & floccorum apparent.

f Intestinorum villosa tunica, & cortex cerebrum.

g *Ipsam sanguinem, in textu*) Initia ovi tota alba sunt, indicio, nullum tunc rubrum sanguinem per vasa uterina in fetum venire. Deinde apparet color ruber. Punctum saliens in viviparis jam apparet, quando fetus adhuc galbae vel carinae similis est HARVEI p. 280. & etiam prius, vigesima quarta hora, sanguis in funiculo apparet, quando in fetu nihil rubri adest MAITREJEAN p. 53. neque cor apparet p. 62. Decimo die, & octavo etiam in funiculo aliquid carneum ex LALAMANTIO lego citari. Decimo die a conceptu in sue sanguineus circulus, & vena rubra ramosa COLTER p. 124. In fetu cervino dimidio lupino non majori nondum figurato, punctum rubrum & venae D. LUDOVICI L.N.C. Dec. I. ann 8 obs. 17. In cuniculo ovo nondum adnato, prius, quam galba adpa-

Fetum mitti) Magna hic inter eruditos viros dubitatio ^h intercedit, an omnino verus,

adpareat, punctum saliens GRAAF. p. 280. In fetu brucho non majore hepar jam rubrum PLATER. in *quaest. phys.* Duodecimo die in cuniculo duo puncta sanguinea GRAAF p. 311. In cuniculis die XI. duo puncta rubra in fetu COSMOP. p. 50. In catulo die 14. circulatio sanguinis rubri MURALT. *vadem.* p. 122. 193. In homine 12. die rubra linea in funiculo umbilicali SANTORINUS *istor. d'un feto* n. 5. Non ideo volo, eo tempore sanguinem a matre ad fetum venire. Nam etiam in pullo gallinaceo biduo ab incubatione ovi rubedo conspicua fit. Liquor vasorum umbilicalium ante 48. horas luteus, deinde rubiginosus, denique ruber est LANCISIUS *de corde* p. 42.

^h Veteres omnes nascens animal per umbilicum nutrirı docuerunt & ipse DEMOCRITUS apud PLUTARCHUM *de plac. philos.* L. V. c. 16. ARISTOTELIS docet fetus radicem umbilicum esse, & alimentum capere fetum ab uteri venis *de gener. anim.* L. II. c. 4. eamque comparisonem ornate proponit MONROUS *Edimb. soc.* II. p. 227. HIPPOCRATES pariter, uti plantam ex terra, ita fetum ex utero nutrirı ait *de nat. puer.* n. 5. 35. & manifestius ib. n. 5. menstruum sanguinem circumfundi placentae & in fetu resorberi, tum demum membranas subnasci n. 5. Secundarum principium esse arterias venasque, inosculatas in uteri venas

verus, ruber, sanguis ex utero, per fines arteriarum uterinarum, in venas placentæ, tunc in venas umbilicales eat, atque adeo a corde matris, per canales continuos, fan-

venas & arterias GALEN. *de format. fet. it. de diff. vulv. conf. not. g. ad DCLXXVI.* Hoc etiam nutrimentum unice admittit COLUMBUS p. 250. LAURENTIUS L. VIII. cap. 24. PERRAULT. *mecan. des anim.* p. 486. MERY *Comm. Par.* 1708. 1709. & VOGLI & alii.

Deinde utraque via, & per umbilicum & per placentam alimentum advenire HARVEIUS, proposuit, quem sequuntur BARTHOLINVS *anat. renov.* p. 315. GRAAF p. 291. DRELINCOURT. *Periob.* 35. NEEDHAM c. 2. DIEMERBROECK. p. 223. TAUVRVY *de la gener.* p. 143. KAAUW l. c. CHESELDEN. l. c. *Vater. Mola prægn.* Gibson in *Edimb. soc. ess.* T. I. Schelhammerus denique primis mensibus per solum os, sequentibus per umbilicum, ultimis denuo per os nutriri, voluit *exerc.* 12.

Sed priori seculo tota res in controversiam vocata est. Alii fetum quidem per umbilicum nutriri advesto succo chyloso concesserunt, sanguinem autem ab utero materno ad fetum transire, aut immediatas uteri cum placenta vasorum rubrorum anastomoses esse negaverunt. Princeps est ARANTIUS *de fetu* p. 14. Porro RIOLANUS sanguinem quidem a matre in fetum venire p. 373. ex tubulis &

sanguis ruber per hepar fetus in cor adferatur. An vero potius probabile sit, liquida tenuio-

& elicibus uteri in placentam p. 376. sed effundi, roris ad modum, inde ab arteriis umbilicalibus exsugere p. 395. Satis adfinis est SPIGELII opinio de form. fet. c. 9. & FABRICII, qui negatis patulis anastomosibus P.I. c. 5. defendit subtiliores, venis placentae quasi in ansulas factis & contiguis cum uteri cavitatibus ib. & P. II. c. 3. Anastomoses etiam negant *Harveius exerc.* 57 *Whartonus* p. 235 252. &c. *Diemerbroeck* p. 205. 219. *Aldes* l. c. in *Mangeti bibl. anat.* p. 547. *Bohn.* p. 26. *Brendel.* l. c. n. 10. *Hofmannus med. syst.* I. p. 346. *Verheyen* l. II. p. 365. *Hobokenus anat. secund vitul.* p. 108. &c. & *Ruychius*, & *Tausury* p. 135. (inconstantior, nam alibi p. 136. in carnivoris succum sanguineum admittit,) & inter recentiores *Monrous Ess. of Edimb. soc.* II. p. 144. &c. Inter eos *Hofmannus* inprimis, & nunc *Monrous*, liquorem nutritionis effundi ex uteri vasis & a chorio resorberi volunt p. 133. vasaque chorii opposita utero hiare p. 128. 129. &c. priores alii aliter.

Videbant nempe cotyledones in ove & vacca quasi divisas esse, ut pars utero adhaerere *Wharton* p. 239. *Needham de form. fet.* c. 2. *Hoboken vitul.* f. 15. 30. alia pars fetus sit, *Wharton* ib. *Needham* ib. *Berger* p. 473. *Hoboken* l. c. f. 5. 16. & illa ab utero *Cosmop.* p. 122. 60. *Berger.* ib. haec a fetu *ID.* ib. vasa habeat, *Diemerbroeck* p. 201. in cerva vero ipsae chorti glandulae di-

midia

tenuiora sanguine ex sanguineis uteri
vafis fecedere, atque in placentam
trans-

midia parte sanguineae sint, & ad fetum
pertineant, dimidia gelatinosae, & facile
separabiles *A. Hafn. vol. II. p. 226.* idem-
que in leporis placenta verum esse *Taury*
p. 100. & partem albidam uterinam coty-
ledonis, a parte fetui propria rubente
separari posse, eductis filis *Graaf. p. 295.*
Tiling de placent. p. 43. 103. aut in partu
separari, *Stalpart. de nutrit. fet. p. 561.*
absque ulla sanguinis profusione, *Har-
der. apiar. obs. 8.* *Langley a Schrader*
editus *p. 163. E. N. C. Dec. II. ann. I.*
obs. 154. *Aldes p. 548.* *Vicuss. nov. syst.*
p. 41. solo stillante de eductis fractisque
vasculis seroso lacteoque mucos, *Harvei*
p. 240. 241. *Wharton p. 235.* *Cosmop.*
p. 60. *Charleton p. 45.* *Hoboken secund.*
vitul. p. 32. Porro *Galenus* pulsus arteri-
arum placentae ab arteriis fetus pen-
dere, hisque ligatis cessare expertus est
de placit. Hipp. & Plat. L. VI. *Har-
veius* arteriarum matris cum fetus arte-
riis asynchronon esse observavit *p. 290.*
& *Stalpart p. 548.* & eas arterias pulsare
post matris mortem *Harvei p. 291.* Hinc
fetus maturus per seniores fere a
morte matris superesse citat *Dieffenbach.*
diff. de exic. fetu, per horam autem *Rou-
bault observ. p. 52.* bis repetitis experi-
mentis & *la Motte L. IV. c. 6.* *Stalpart*
l. c. p. 556 *Tabor exerc. p. 227.* *Harvei*
p. 290. & duabus horis *Mauric. obs. 315.*
& diutius *E. N. C. Dec. II. ann. 5 obs. 15.*
& duodecima hora *ib. obs. 137.* & altero
die

transire. Mihi optio non difficilis videtur.

Hae-

die *Dieffenbach* l. c. ex *Dolato*. Vivum etiam ex mortua matre fetum exsectum fuisse *Arantius* inter *Scholzii Epist.* V. p. 297. *Veslingius*, *Viardel*, *Hagendorn*, *Nymman* p. 36. ex *Hor. Augenio*, E. N. C. *Gent.* III. obs. 57. *Mauriceau* l. c. neque alios esse illos Romanorum Caesares *Plinius* L. VII. c. 9. Sed etiam viperæ catuli ex matre secti bihorio supervivunt *Severin.* *Zoot.* p. 360. & canem caesereum vidit *Boyle exp. phys. mech.* p. 41. & cuniculum *Harveius* p. 290. *Moebius* obs. 9. & aliquando a morte matris vivi ex utero eruperunt infantes DCLXIV. DCLXXXV. Adeoque satis certum est non a matre, sed a fetu motum sanguinis in fetu pendere *Nymman* l. c. *Harvei* p. 290. *Berger* p. 485. *Roubault* obs. IV. passim. Hinc, incisis catellis gravidis praegnantibus, fetus non exsanguis reddi *Falconet* citatus a *Weissero d. de sangu. circulo*. Addebant varii, vasa chorii minora esse quam quae sanguinem resorbeant, ut *MONROO* p. 144. Deinde aquam *Stalpart de nutr. fet.* p. 558. liquores coloratos ceramve arteriis uteri impulsam, placentam non subire *Hofman.* *Pozzi* p. 64. *Monroo* II. p. 146. 142. (etiam de mercurio) *Harder apiar. obs.* p. 37. si integra fuerit *Stalpart* l. c. p. 558. neque a fetu in uterum ire, sed per venas umbilicales redire *Hofman.* *Berger* p. 474. aut aegre certe per hypogastricas aliqua exigua vasa fetus repleti *Cl. Grauel de superfet.* p. 19. Porro

Porro *Monrous* objicit, sinus uteri enormiter magnos, fila secundarum minutissima esse, ut manifesto sibi non respondeant p. 134. & consentit experimentum *D. Noortwyck* p. 11. Sed etiam fetus vitales aliquando (*Car. Steph. L. III. c. 3. Muralt. colleg. anat. p. 687. Buchner misc. 1727. p. 64*) editos fuisse, cum secundae corruptae essent, aut uterus corruptus *E. N. C. Dec. I. ann. 8. obs. 60.* aut abscessu exesus *ib. ann. 2. obs. 180.* Denique *Stalpart I. c. Hoboken anat. repet. p. 352. & Ruyschius*, inventa sua membrana, quae placentae tegeret convexitatem, etiam firmiter negaverunt, sanguinem ab utero ad placentam venire *Thef. II. aff. IV. n. 18.* addiditque *Ruyschius*, se eam membranam lapideam vidisse & *de musc. uter. p. 10. Conf. Thef. V. n. 57.*

Alii audaciores, nihil omnino ab utero per umbilicum ad fetum venire volunt. Fuisse enim repertos vivos fetus, qui absque umbilicalibus vasis increverint *L. Bourgeois I. p. 43. Chotton in Ephem. Gall. a. 1673. Stalpart van der Wiel obs. 32. Cent. II. E. N. C. Dec. II. ann. 7. obs. 209.* fuisse & accurate, *III. Superwille Phil. trans. n. 456.* & natum aliquando maturum puerum, cui in ipso matris utero vasa umbilicalia coaluissent *Peyer. de uracho n. 12.* aut abrupta fuissent *Heister not. 37.* tum lepulos repertos, in quibus nullum umbilici vestigium fuerit *Comm. Lit. 1733. n. 27.* et nodum in funiculo umbilicali insignem fuisse, absque impedimento nutritionis *Mauriceau p. 222. obs. 567. 312. Petit Comm. Paris. 1718. obs.*

Haemorrhagia) Inter mille, quos vidi, abortus vix centum fuerunt exempla i, in quibus non eo tempore contigerit ea calamitas, quando menses tertia vice recurrere oportuerat, tertio nempe mense gestationis solent feminae percipere fluentem per vaginam sanguinem, quasi menses decederent; tunc continuo, si rerum suarum peritae fuerint, abortum expectant imminentem. In hoc malo plethora uteri, quam non potuit consumere incrementum fetus,

obs. 8. & insignem tumorem *Ruyfch. Thes. IX. n. 3.* In equa denique & sue omnino nullam placentam reperiri, a *I. Sylvio, Fabricio l. c. P. I, c. 3. & Graafio p. 295.* & a *Needhamo* demonstratum esse, sex mensibus integris, in iis animalibus, nihil per umbilicum transire c. 2. tum 2 *WEPFERO E. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 129.* Haec inprimis *Claudii de la Courves* toto libro, *Everhardi* sive *Cosmopolitae* p. 122. *Entii, Francisci Bayle,* utriusque *Stalpartii van der Wiel, Charletoni, Bergeri* p. 476. & *Iussieu* apud *Gibsonum* sententia fuit.

i Ita *MONROUS l. c. p. 234.* Abortus fiunt mente tertio & quarto *HIPP. περὶ γυναικ.* & secundo & tertio *MANNINGHAM p. 77.* aut primis 40. diebus *HIPP. περὶ ἐπταμηνου n. 8.* aut tertio mense *HOORNE wchm. p. 19.* *HARVEY p. 184.* Incommoda gravidarum reverti sub menstruas periodos *MONROO.* Femina, quae circa tertium mensem semper abortiebat *E. N. C. Dec. II, ann. I. obs. 184. & III. ann. 7. 8 obs.*

fetus, tenelli hæctenus, urget chorii superficiem, adplicatam utero, & dimovat, & effluit. Nunc facile visu est, nisi cum utero placenta communicaret, & nisi prius purus sanguis ad superficiem ovi consuevisset fluere, remota chorio, non purum, quasi mensium, sanguinem fluxurum fuisse.

Partu) Quando solum chorion separatur, nihil, nisi aqua effluit. Quando vero placenta secedit, tunc certe eo, quo auferitur momento, undae sanguinis exsiliunt. An ergo probabile est, sanguinem, quem adparet tanta copia ad placentam appulsum fuisse, non penetrasse placentam? Non videtur. Verum placenta hæc ita utero cohaeret, ut raro avellatur illaeta. Si obstetrix placentam vobis obtulerit, facile iudicium est, inspicite, si superficies polita fuerit, integra est, & recta chorio. Si vero sanguinem stillaverit, manifestum est obstetricem, dum placentam abstulit, vim intulisse. Adeo vero ruditer trahere solent, ut minime rara exempla sint, inversum uterum cum placenta extractum fuisse, ut auda aeri exponeretur pars uteri, contigua pla-

obs. 133. A plethora certe abortus periculum
Monroo p. 235. &c. hinc secta vena inpeditur
E. N. C. Dec. I, ann. 6. obs. 204.
Schurig. Embryol. p. 384. *MAURICEAU*
p. 127. *obs.* 399. *Beverwyck schat der*
gezondh. p. 603. maxime in primiparis
Panarolus Pentec. II. *obs.* 23. I. *obs.* 10.
 Exemplum talis haemorrhagiae a sanguine

placentae: in ea tunc ingentia foramina patent, plena puro sanguine. Si tunc placenta absterfa & mundata fuerit, preffa eadem demonftrabit ftigmata fanguinea oblique introrfum penetrantia. Manifeflum eft adeo, in hac parte vafa uteri arteriofa & venofa, ita extenfa effe, ut fanguis ibi infinuetur in patulas papillas, dictas **VATERO**, inde vero fubeat in venulas obliquas placentae, unde porro ad umbilicalem venam, & cor fetus redit.

Gravida) Femina gravida ex laefo utero exfanguis moritur. Si mense feptimo ^k gelta-

per poros chorii placentae inffrati stillante, vidit *Noortwyck* p. 28. 29. Placenta ab abortu per aliquot dies retenta, deinde exclufa cum magna haemorrhagia **E.N.C.** Dec. II. ann. I. obs. 100.

^k Haemorrhagiae cum abortu quatuor & quinque menfium non lethales, vafa enim ultimis temporibus majora funt *Mauriceau* p. 172. 159. fed eae, quae feptimo, octavo & nono mense funt, omnino funeftae, nili fetus extrahatur *Mauriceau* p. 118. obs. 158. *Manningham* p. 69. *Puzos Acad. de Chir. I.* P. II. p. 209. Exempla funefta habet *Mauriceau* obs. 17. 55. &c. Summa tamen quiete aliquando malum avertitur **BOHN** de offic. med. p. 601. *Puzos* ib. **E. N. C.** Dec. III. ann 3. obs. 130. Alii vero non fatis fimilia narrant. Haemorrhagia gravis a falfo germine adhuc albuminoto *Mauriceau* 69. & ex ovo minori quam gallinae ovum eft *Mauriceau* obs. 204. la
MOT-

gestationis haemorrhagia uteri correpta fuerit, sanguis ex dilatato utero exundabit, donec

MOTTE *obs.* 352. & ab albuminoso ovo gallinacei mole *Mauriceau obs.* 180. 491. & a bimestri aut paulo majori minimo fetu la MOTTE *obs.* 387. *Mauriceau obs.* 169. 293. 694. Mors ex abortu quatuor septimanarum *Mauriceau obs.* XI. & decem septimanarum, per haemorrhagiam *obs.* 591. & a trimestri sed falso germine *Mauriceau obs.* 223. 614. atque fetu alio, cujus caput avellana non majus esset *obs.* 154. Exempla etiam passim reperio haemorrhagarum gravissimarum, quando post abortum placenta in utero manserat E. N. C. *Dec.* II. *ann.* I. *obs.* 116. Nempe fetus exigui placenta tenaciter adhaeret, & difficulter eximitur, cum fetus non adsit, qui praeundo viam aperiat PUZOS l. c. p. 204. Parvus abortus, & tamen secundina integro mense educi nequit *Mauriceau obs.* 297. Ergo primis mensibus parvitas placentae, oris angustia incommoda est, ultimis periculosa haemorrhagiae celeritas,

Sed vis argumenti haec est: Haec profluvia oriuntur plerumque a placenta soluta *Manningham l. c.* ruptis adeo vasis, quae faciebant nexum uteri cum fetu. Sed ex iis ruptis vasis sanguis effluit, oportet adeo prius non chylum, sed sanguinem per ea measse.

1 *Iactura, in textu*) In universum non difficile demonstratu est, fetum aliquam partem alimenti, & aliquam per umbilicum humorum communicationem cum matre

donec ne gutta reliqua sit , & femina nihilo minus palleat , quam fieret , si jugulares venae ipsi sectae forent : Neque potest aver-

habere. 1. Agni nati sunt ore inpervio MAITREIEAN *de la form. du poulet* p. 224. *Ruysh. Thes.* IV. n. 15. *Hist. de l'Acad.* 1715 n. 4. Canis quinque catulos peperit absque ore Graaf p. 292. *Phil. Trans. abr.* V. p. 338. & n. 304. *Mem. de l'acad.* 1709. p. 22. & 1701. obs. 15. & saepe id fieri Gouey p. 94. Collegit etiam exempla Monroo p. 155. Amnion circa caput fetus adnexum, ut os non appareret, nisi sectione facta E. N. C. *Dec.* II. ann. IX. obs. 118. Fetus absque capite Bianchi p. 245. Infans ore clauso natus BUCHNER E. N. C. *vol.* II. obs. 96.

2. Variolas a fratre , cui mater adhaederat, concepit ipse Mauriceau p. 67. Et variolarum a matre in fetum propagatarum passim exempla leguntur Schurig *Embryol.* f. 3. c. 1. *Sylleps.* p. 522. *Rhodus obs.* 83. *Cent.* III. *Maur.* o. 600. *Hildanus Cent.* IV. obs. 55. 56. & luis & in E. N. C. *Dec.* II. ann. 6. obs. 61. & *Dec.* I. ann. I. obs. 53. Schurig. l. c. p. 194. vel certe pustularum Mauriceau p. 81. & morbillorum E. N. C. *Dec.* II. ann. 3. obs. 97. & ieteri KERKRING obs. 57. Etiam levis morbi materni vestigia in placenta adparere Mauriceau p. 227. Croco pasta matre aquae & catellorum cutis lutea HERTOD *crocolog.* p. 280. & E. N. C. *ann.* I. obs. 60. & similia video apud HEURNIUM & van HEERS.

averti tanta calamitas , nisi continuo totus cum secundis fetus extractus fuerit. Hoc denuo manifestum argumentum est, rubro san-

A matre leniter ista fetus continuo extinctus *Hildan. Cent. IV. obs. 59. &c.*

Sed 3 eam communicationem sanguinis rubri esse demonstrandum est, ut ruber verus sanguis ab uteri vasis in chorii vasa trans-eat. Ita praeter *Hipp. & Galenum Fabricius l. c. P. I. c. 1. 3. 5. C. Bartholinus p. 311. Drelincourt Perioch 37. Mauriceau p. 230. Lientaud p. 273. Kaaum n. 1049. Noortwyck p. 99. Cheselden. p. 282. & de vigesima parte sanguinis Venarum umbilicalium Rouhault. 1714. p. 188. 1715. p. 132. osserv. p. 47. nam reliquum omnem in placenta manere, & praeter sanguinem, chylosam dulcem lympham ab utero ad umbilicales venas venire docet, l. c. & osserv. p. 47. In catella sanguine privata pulli exsanguis *Denis citatus a Trewio de chylos fetus p. 18. In puerpera, ex lapsu exsanguis, fetus pariter exsanguis Mery Memoir. de l'acad. 1708. p. 240. seqq. & Heister. not. 36. & E. N. C. vol. I. obs. 184. & 207. In femina, cui placenta in utero manserat, perpetua & funesta haemorrhagia, cum funiculus non fuisset ligatus la Motte obs. 395. 396. & hist. de l'acad. 1721. hist. I. Monroo II. p. 131. hancque rationem dat duplicis nodi, quo vult stringi umbilicum CROESER diff. p. 11. Sed 4 ipsa autopsia plura confecit, COWPERVS ad T. 54. mercurium per arterias hypogastricas matris in venas placentaе urfit & vicissim, repetente experimentum DRAKLIO. l. c. 7, ut non videatur**

sanguini liberum commercium esse ab uteri arteriis in placentam,

Mem-

merito in dubium revocari a *Monroe*. *Vioussenius* mercurium carotidi canis injectum, vidit per venam umbilicalem catelli exiisse apud *VOGLI* ll. p. 173. & apud *Manget Theatr.* ll. p. 139. Liquor per arteriam hypogastricam matris in placentam penetravit & vicissim *Hoelling* apud *Heister. Comp. not.* 36. & *Hummel* apud *Hoelling diff. de off. obst.* n. 13. & *Schacher de lab. lepor.* n. 13. & *Tauroy* p. 89. postquam venas hypogastricas ligaverat. Vnae umbilicales per hypogastricas inflatae *PRESTON Phil. trans. abr.* ll. p. 210. & *SCHACHER l. c.* Vascula ex chorio in uterum repleta per arterias matris *Noortwyck*, p. 9. & placenta in una parte ruberrima, profunde penetrata, per vasa uteri. ex Iliacis vasis injecto liquore p. 101. & sinus placentae intra coronam sub cellulosa, omnino sanguinem continent p. 26. (etsi in eo experimento communionem immediatam cum utero non viderit, cum versus uterum hi sinus angustiores redderentur). In vivo cane, dum placenta ab utero separatur, sanguis ex vasculis effluit *Schacher l. c.* conf. *DCLXXVI. c. f. g. h. l.* & in homine Chirurgus *DENYS* apud *NOORTWYCK* vidit, placentam plenam vasis sanguiferis, quae sanguinem abrupta destillant. Ipse denique a. 1738. vidi, ceram injectam arteriis maternis in sinus uteri, & per eorum aperta ostia in insertas chorii productiones atque placentam subisse *de allan.* n. 9.

Membranula) Coelum placentae exterius tegitur solida membrana a chorio^m conti-

5. Argumenta priora vero facile diluuntur. Nam vaccarum quidem fabrica ab humana recedit, nostra est enim placenta sanguine, uti illa lacteo succo turget. Sed in ipsis denique ovibus & vaccis tuberculorum chorii cum uterinis connexio valida adparet, dum remouentur *Fabricius* P. I. c. I. *Hobok* p. 28. guttaeque sanguineae P. II. c. 3. quas pingit *Hobokenus secund. vitul.* f. 16. & 17. Experimentis ab injectionibus meliora obposita sunt. A morte matris fetus superstes est, quia motum sanguinis a cordis propria efficacia habet. Si aliqui fetus umbilicalibus vasis certo caruerunt, non de iis, sed de solita fabrica factis disputamus. Qui funiculi abrupti visi sunt, potuerunt ante partum abrupti fuisse, & cito solidati *MONROO* II. p. 165. Placentas equae & sui non magnas, sed aliquas esse *FABRICIUS* P. II. c. 3. *WHARTON* p. 280. faciemque exteriorem chorii in sue granulatam, mollem, carnosam, placentae similem esse *RAIUS syn. quadr.* p. 93. & modicum, sed tamen aliquem nexum *HARTMAN* E. N. c. Dec. III. ann. 9. obs. 191. De membrana *RVYSCHII* vide not. m sub fin.

m Chorion *GALENI de util. part.* L. XV. c. 4. ubi ab allantoide evidenter separat, & *THEOPHILI* p. 896. Allantois autem *GALENI de semine* L. I. ubi ante agnam ait generari ex semine feminino.

R 5

Allan.

Allantois FERNELII *Physiol.* L. VII. c. 9. sed & chorion ejusdem. Allantois CO-
LUMBI p. 248. Nam dudum obser-
vante HARVEIO veteres chorion allan-
toidis nomine passim describere p. 279.
tum TILINGIO p. 91. Chorion
ergo his dicta nominibus membrana
est, undique fetum amplexa, et-
iam tenerum embryonem R I O L. p.
372. HARVEI p. 184. peculiaris indolis,
in recente corpore tota mollis, exterius
inucosa, viscosa, pinguis HOBOKEN
anat. rep. p. 34. pulposa, quam cum
carneo glutine FALLOPIUS comparavit,
asperam faciem dixit VESALIUS p. 673.
fungosam vocat NOORTWYCK p.
1325. Interius chorion firmior est, tenuior,
inordinate reticulata, uti HOBOKENVS
vocat p. 111. *anat. rep.* & NOORT-
WYCK l. c. & T. 1. f. F nimis, puto,
regulariter. Illam fungosam, & hanc
reticulatam partem, totidem laminas
chorii vocat, qui separavit CL. NOORT-
WYCK p. 25. In spiritu vini vero cho-
rion tota in solidiorem & perfectam
membranam abit: Multas autem lami-
nas, inter quae vasa decurrant, dictas CL.
LIEUTAUD p. 371. nemo facile de-
monstraverit, & ego ad mediam refero.
Vasa habet ab umbilicalibus, quae
in uterum communicare dictum est
DCLXXVI. f. nimis nota VETERIBVS;
ut GALENO *de util. part.* L. XV c. 5. *de*
fet form. 2 ut tota etiam chorion ex vasis
fieri adfirmet IDEM *de diff. vulv.* c. 10.
Sed is placenta forte intellexit, nam
chorii vasa exigua sunt ARANTIVS
p. 28. aut vasa chorii vitulini H O B.
secund. vitul. p. 96: non bene in ho-

mine negata ab *BODEN anat. rep. p. 124. 153.* cum etiam vacua albaque appareant, & ipsi forte visa *HOBOKENO p. 34. 113. 224. fig. 3. 4.* quae in vitulino chorio cum tomentosis suis finibus pinxit per venas facta repletionem, *RUYSCHIVS* in nitidissima *T. 2. Thes. max.* Habet etiam *NEEDHAM C. 2. GRAAF, p. 282.* & in parte chorii proxima placentae negat reperiri *RUYSCH. Epist. XIII, p. 10.* Glandulae autem *MALPIGHII posth. p. 47.* five folliculi in animalibus conspicui, quas glandulas in hydatides degenerare, & in nonnullis animalibus reperiri auctor est *VALISNERI Opp. I. Vol. II. p. 51.* inque suae veras & perforatas vidit *RAIUS l.c.* eae in homine nondum repertae sunt. Cellulosae verae ope chorion cum membrana media cohaeret, inde cum placenta fibrillis, dictis *RIOLANO p. 373.* & *HOBOKENO*, quae vera vasa sunt *NOORTWYCK p. 130.* perforantia chorion, ut placentam adeant *p. 27.* &c. alterius vero cellulosae, sed manifesto vasculosae, ope cum utero *DCCLXXVI. f. g. h.* Totum ovum succingit undique, & in juniore ovo, per meas quidem observationes, placentam terminat ex amnio subnascentem, nam plerique alii amnio tunc volunt conglutinari, conf. not. *f. ad DCCLXXVI.* Etiam tunc crassum vidi, tenue vero *GRAAF p. 282.* Adolescente vero ovo adparet, simplicem quidem esse membranam in parte ovi inferiori, ubi tenuiorem esse recte *HARVEIUS* observavit *p. 284.* Ita enim in femina tertio mense gravida reperi, & addit *ROUHAULT*, eo tenuiorem esse, quo a pla-

cen-

centa remotior est *Mem. del' Acad.* 1715. p. 135. In superiori vero ovi parte manifesto finditur, laminaque una cum amnio partem concavam placentae sublinnit RIOLAN l. c. HOBOKEN. *anat. repet.* f. 32. BLASIVS *anat. hom.* p. 165. (crustae nomine) MAURICEAU p. 217. RUYSCH. *Thes.* V. n. 57. ROUHAULT *offeru* p. 22. MORGAGN. *epist.* T II n. XVI. p. 185 NOORTWYCK p. 26 &c. ibi firmissime placentae nexa RIOLAN l. c. HOBOKEN *anat. prior.* p. 15. ARANTIUS *de fet.* p. 29 ROUHAULT 1714. p. 183 MAURICEAU l. c. & in meis; loca vero libera reperit NOORTWYCK p. 27 nexumque unice ad vasa refert ib. tum mediae membranae HOBOKEN. *anat. rep.* p. 25. & hujus ope amnio TILING *de plac.* p. 95 tenuior quam reliqua pars chorii NOORTWYCK p. 26. 27. &c. BIANCHI p. 54. Magna certe industria EUSTACHIVS chorion ad funiculum usque ab amnio separavit T. XIV. f. 6. & Cl NOORTWYCK p. 190. Pars altera chorii super placentae convexitatem se conjicit, mediaque, uti in meis ovis. ita in adulto fetu. utero placentaeque se interponit, continua omnino chorio Noortwyck p. 14. 76. &c T. 2. c. Ruysch. *Thes.* V. n. 57. Rouhaute 1716. p. 344. nam prius ad placentae limbum chorion terminari crediderat *Mem. de l'Ann.* 1714. & 1716. p. 343. Blasius l. c. Santorinus *obs.* p. 218. Ea nunc celebris est illa, de qua hic Praeceptor agit, membrana. Ad limbum placentae, chorion ad placentam & uterum firmitus adhaeret & crassior est Mauriceau p. 217.

continuata , quam RVYSCHIVS * inve-
nit, & per eam placenta radículas suas
emit-

n Nempe *Arantius* chorion undique placen-
tam ambire , & uterum contingere i-
nime ignoravit p. 5. *Hobokenius* chorii
membranam externam vult, ubi reti-
formem membranam chorii utero ob-
duci ait p. 125. 267 tum *anat. rep.* p.
349. ubi tunicam propriam vocat.
crassam, v. lde porosam, laxamque; hanc
novam intelligit chorii membranam;
utero oppositam. Sed & *Blasio* nota
fuit l. c. & *Brendelio* n. 9. & *Vieussenio*
citato apud *Mangetum* , qui rutam, te-
nuem, porosam, membranae pene dissi-
mitem dixit, quae retis modo aut
omenti esset, atque circa eam vasa re-
pere sanguinea varicosa. Porro *Stal-*
partius, aquam in placentam integram
injectam non effluere, ob membranam
a chorio, quae in parte convexa eam
limitet *de nutr. fet.* p. 558 Co-
piously dicta est *Ruyschio Thes.* 11, *ass.*
4. n. 18. *Thes.* IV. n. 91. *Thes.* V. T. I.
f. 1. n. 41. *Thes.* V. n. 57. *Thes.* VI. n.
24. *Thes.* X. n. 5. 7. 60. *cur renov.* p.
121. & *Santorino* p. 218. & *Rouhaulto*
qui et ipsam reticuli modo *observ.* p. 18.
perforari ait, arteriolis a placenta ad ute-
rum euntibus, quae prius aliquan-
diu oblique per hujus membranae crassitiem
currant 1716. p. 345. & foraminibus in
sicca membrana conspicuis *observaz* p.
9. *Mem. de l'Acad. des sc.* 1714. p. 181.
1715. p. 132. 1716. p. 345. 348. &
Monroo, qui fere eadem habet *Edimb.*

loc. 11. p. 128. 129. Neque multum
 adtinet, quod reticulum potius, quam
 veram membranam esse, velit Cl *Rou-*
hault Mem l. c. p. 181, aut inconstan-
 tior *Hobokenus*, qui modo tunicam esse
 negat, ut p. 203. modo adfirmat. Vil-
 losam in meis experimentis reperi, uti
Ruyfchius, qua parte uterum respicit,
 fungosam per macerationem *Noortwyck*
 p. 14. mollescit enim macerando *Noort-*
wyck p. 26. & reliquae chorii similior
 redditur. Vasis fit cellulosa pauca con-
 nexis DCLXXVI. g. quae raro adparere
Ruyfchius Thes. V. n. 41. auctor est, fusc
 vero describit *Rouhault.* Eadem mem-
 brana placentae sulcos tegit, & inter
 eosdem profunde descendit *Hoboken*
anat. rep. p. 349. Noortwyck p. 19.
Rouhault off. p. 8. unitque lobos pla-
centae Id. 1715. p. 133. Hanc ipsam
 credebat *Ruyfchius* uterinorum vasorum
 cum vasis fetus anastomosis inpedire
Thes. 11. l. c. Thes. X. l. c. Verum cum
 ipsa villosa sit, instrumentum potius est
 hujus anastomoseos, uti superius dictum
 est. Nullam vero esse, ut summus
 Anatomicus olim me docuit, non pos-
 sum consentire, neque enim sanguis effu-
 sus est, sed vera & constans in inprac-
 gnatis ovis membrana, nihil diversa a
 reliquo chorio. Confirmat passim Cl.
 NOORTWYCK p. 21. 29. 123. T. 2.
 Massam equidem sanguineam tamquam
 crustam placentae superfundi, HOBQ-
 KENVIS vidit *anat. l. p. 17. 37. f. 9.*
 DD 10. & passim alibi. Sed in inte-
 gerrimo ovo & Cl. NOORTWYCK &
 ego

emittit. Nunc quaeritur, quomodo ° per hanc membranam sanguis sibi possit viam facere.

& ego bis, absque ullo dubio vidi, & in teneriori quidem ovo nihil omnino diversam a reliqua, vulgo notae chorii fabrica. In ipsis demum placentulis brutorum similem continuam membranam, utero objici *Stalpartus* l. c. p. 561. Chorion *Arantius* olim p. 26. a membrana carnosâ, & nuper *Heisterus* filius a cellulosa peritoneae circumposita deduxit: *Lieutaud* a cellulosa funiculi p. 372. sed neutra origo satis placet.

- Chorion duplicem esse dixerat *Galenus* & per medium vasa ferri de util. part. L. XV. c. 5. intus etiam levem & lubricam facit *Vesalius* & *Spigelius* l. c. c. 4. *Graaf* p. 282. Sic & *Harveius*, chorion extus viscosam inaequalem, intus levem dixit p. 284. Duas porro chorii laminas facit *Blasius* l. c. Deinde membrana media innotuit *Needhamo* c. 3. in muliere T. IV. f. 2. *Diemerbroeckio* p. 205. *Peyero* E. N. C. Dec. II. ann 7. obs. 204. *Hardero apiar.* p. 38. quando allantoidem dixit arte chorio nexam, vasis destitutam &c. *Bidloo* quando totum fetum cinctum allantoide pingit T 58.61. *Hobokeno* p. 217. &c. fig. 20. 17. DD. 21. 35. 24. (ubique ad placentae fere sedem, tum f. 32.) *Sampsono* E. N. C. Dec. I. ann 3. obs. 171. *Johanni van Horne* in microc p. 289. *Littrio* allantoidis nomine hist. de l'Acad. 1701. p. 27. Mem. p. 387. *Stalpartio* juniore, qui inter chorion & amnion membranam cellulosam pituitae firmi-

facere. Verum haec obiectio debilis est. In haemorrhagiis enim sanguis ad mortem usque

milem dixit interponi *de nutrit. fet.* p. 541. *Ruyfchio Thes.* V. n. 41. pseudoallantoidis nomine *Thes.* V. n. 57. *Verheyen* L. II. p. 342. *Roubaultio*, qui fuse describit a. 1714. & pingit f. 2. 7. 7. tum a. 1715. & 1716. *mediae* nomine & sibi inventam tribuit *offeru.* p. 13. *Fantono* pariter allantoidis nomine dicta est. *Membranam* etiam chorii internam, *Brendelio* dictam, huc video pertinere *de nutrit. fet.* n. 9. Cl. *Noortwyck* accensuit amnio p. 21. 29. Mihi vel seorsim pro secundo fetus involucre recensenda videtur, uti *Hobokenus* p. 281. & *Littrius* l. c. *Roubault* 1714. p. 184. & c. vel accensenda chorio, uti *Hobokenus* p. 125. *Verheyen*, *Santorinus*, *Blasius*, *Roubault off.* p. 18. & *Mem.* 1714. p. 184. cui ope cellulosa fabricae *Brendel*, *Noortwyck* p. 13. 23. *Hobok.* p. 288. tenacius, quam amnio, cohaeret *Hobok.* p. 280. 157. 127. secundum concavam placentae partem vero, ubi cellulosa paucior est *Noortwyck* p. 22. omnino ab amnio nequit separari *Hoboken anat.* l. p. 129. & *anat. rep.* p. 334. & *Roubault offeru.* p. 22. *Mem.* 1715. p. 136. Inter eam & chorion interponitur passim mucosa pinguedo *Hoboken anat.* l. f. 9. kk. *anat. rep.* p. 288. 221. 123. 126. 127. f. 3. 4. p. 35. *Noortwyck* p. 22. Fibrillas, quibus membranae conjunguntur, tenues, jam *Galenus* habet *de util. part.* L. XV. c. 5. passim vero eas describit *Hobokenus anat. rep.* f. 19. BB. f.

que de utero fluit, neque ideo vasis aperti
ostium

20. ubi monere oportet, ibi non bene dissimulari, chorion inter mediam & placentam interponi. Alba est *Rouhault* 1716. p. 343. opaca, absque vasis *Hoboken anat. rep.* p. 128. *Harder, Littre* 1701. p. 116. concentrica amnio, & eadem cum ea undique extensione terminatur *Hobok.* f. 32. non pellucida mihi aut arachnoidea visa, ut Claro viro D. *Noortwyck* p. 29. aut subtilissima, uti *Rouhault* p. 22. aut adeo tenera, uti *Hobokenus* velle videtur p. 155. Cellulosa adhaerens, aut chorii male remotae lacinae villosam faciunt, & inaequalem *Hobok.* p. 127. quae naturaliter levis est undique. Sub placenta omnino Amnio circumducitur *Noortwyck* p. 21. ibique fortiter amnio cohaeret *Rouhault off.* p. 22. 1714. p. 199. &c. 1715, Ab allantoide *Albini* & forte *Halei* diversissima est, quod illa peculiaris vesica, haec universale fetus involucrum sit, adeoque non solum Cl. *Neufville*, sed meam descriptionem corrigere oportet, quando utramque pene confudi *de allantoide* p. 5. not. b. nam etiam tum discrimen adverti interesse p. 8. *Haleus* autem, quando alibi ait, semper tres membranas separari posse, etiam in laceris secundis, tunc istam intelligit. A cellulosa Peritonaei (membrana nempe ejus externa) continuari, vasisque vaginam dare, & funiculum tegere *Rouhault off.* p. 22. 1714. p. 186. 1715. p. 133.

ostium conspici potest^o. Ita alibi Britannum^p virum excitavi, qui omni mente ingentem copiam sanguinis per digiti cutem amittebat, quae solida tamen tegebatur epidermide. Ita mulier illa Amstelaedamensis^q sanguinem menstruum sub sudoris specie per capillatae cutis capitis poros emisit, nulla adparente via. Integra glans bombardae exivit per integram cutem^r, & primo tuberculum elevavit, id sensim increvit, & una integumenta eminuerunt, donec exitum invenerit, partibus subjectis sanis & integris. Sed porro ubique exempla sunt canalium, qui & amplissimi fieri possunt, & angustissimi. Uteri os naturaliter clausum est, in partu vero puerum transmittit. Sphincter ani decem uncias injecti clysteris perfecte retinet, qui tamen per amplis scybalis se aperit. Ergo puto manifestum esse, partem sanguinis arteriosi materni, pulmonum actionem passi, transire in placentam fetus, indeque in hepar, cor & totum embryonis corpus.

DCLXXIX.

Corpus) Corpus luteum^a, per quod in ovario liquor nutritius ovum subiit, abit in calycem & in placentam demum, quando
ovum

^o Nulla obscuritas est, cum chorion, placentae obducta, manifestis villis uterum contingat, & adhaerentem habeat, cavis & vasculosis DCLXXVI. g.

^p DCLXVII.

^q ib.

^r CCCCLXXXI. not. c.

^a Non ita se habere, sed corpus luteum in ovario

ovum ad uterum adcrefcit. In eam placen-
tam radicatur funis umbilicalis embryonis,
qui

ovario manere, fuperius monui DCLXIX.
Plerique recentiorum nunc confentiunt, fub
initia ovi, chorion & placentam non dif-
ferre nifi gradu, quod laxior ifta, vafa
longiora habeat, denfa ifta, villisque va-
fculosis brevibus fiat. Ita *Hobokenus anat.*
rep. p. 16. Placentam chorii partem effe
primo mense *Riolanus* p. 411. Chorion
rariorem factam abire in placentaе initia,
in bimeftri embryone *Everardus* p. 90.
Spatium chorii leve parvum effe in tene-
ro fetu, fenfim augeri, donec placentam
superet magnitudine *Riolanus*, *Hartman*
E. N. C. Dec. III. ann. IX. X. obs. 91.
Placentaе particulas aliquas membraneas
fuiffe, apud *Douglaſſium* vidit *Simfon* l. c.
p. 115. Deinde uberius idem *Cl. Simfon*,
quamlibet chorii partem omnino poſſe in
placentam abire *of the wornb* p. 81.
Edimb. Eff. IV. p. 95. eam nempe, quae
utero adhaeſerit ib. quae plerumque fit fu-
perior, quia pars ovi cervici uteri oppo-
ſita vaſcula non emittit ib. uteri vero
fundus fuperior magis ſpongioſus favet
inmittendis placentaе flocculis: id in brutis
manifeſtum effe p. 104. quorum placentaе
in cellulis natae perfecte figuram cellulae
ſuae exprimant p. 105. Diſtinctionem
vero chorii & placentaе ab eo pendere,
quod poſt quintum meſem placenta de-
ſinat crefcere, pars vero ovi membranea,
prius exigua, quintuplo major fiat p. 103.
Eadem *Cl. Roubauld* ſententia eſt *Mem.*
de l'Acad. des ſc. 1715. p. 134. & *Lieu-*

qui cum matre non neſtitur, niſi per placenta-
centam, quam olim oportet una cum fetu
excuti, etſi valide cum utero cohaereat, &
etiam in cadavere difficulter avellatur.

Tria ^b genera placentarum reperiuntur in

ani-
taud p. 372. Non adeo mirum eſt, in
equo ſero, & vix unquam in porca pla-
centam apparere. His nempe chorion
naturam ſuam retinet. Ex meis vero ob-
ſervationibus, modo citatis, ſequeretur,
„ſemper brevem villoſam membranam
chorion, brevi villoſae uteri ſuperficie
adglutinari, intra hanc membranam vero
longa vaſa, ſive veram placenta, ſub-
naſci, quae totum ab initio ovum occu-
pet, deinde ad ſuperiora magis appareat
Harvei p. 230. inferiorem vero partem
vaſorum vix augeri, quod forte ibi villi
uteri pauciores, & minus adſit alimenti.
Si liceret cum anatomicis pene omnibus
contendere, adferrem rationes a priori,
ex quibus conficerem, longa, ramoſa
vaſa, qualia vulgo dicuntur ex ovi in-
volucro externo undique erumpere, abſque
ſummo detritio- & effundendi liquidi pe-
riculo uteri membranis adfricari non poſſe,
merito ergo, ut in matura placenta cer-
tum eſt, etiam in placentae, & ovi deni-
que initiis, villoſam potius membranam,
brevibus factam vaſis, ovario primum,
deinde utero adhaerentem factam eſſe. Vi-
de contra meam ſententiam dicentem Cl.
Noortwyck, qui membranam convexae
placentae ſuperſtratam in maturiori de-
mum fetu naſci credit p. 122. & confer
rationes.

^b *Hippocrates* omnino brutorum fabricam in-
telligit.

animalibus: 1. In homine, & paucis brutorum, innumerabiles cotyledones conpinguntur

telligit, quando ait „ abortum fieri ex acetabulis uteri mucosis factis & abruptis *Aphor. V. n. 46.* *Aristoteles* vero, quærat perspicacia, correxit *Coum*, & edixit animalia utrinque dentata nullos cotyledones habere *de gener. anim. L. ll. c. 7.* fetum vero vulvæ adhaerentem, unidentata autem, sive ruminantia, cotyledones nacta esse *hist. an. lll. c. 1.* Sed & *Soranus* negavit, esse in homine cotyledones. Inter recentiores nimis etiam frequens fuit vitium, quod fabricam cotyledonum ad humanam placentam transtulerint: Ita *Whartonus* etiam humanam placentam in partem uterinam, & partem respondentem fœtui divisit, merito refutatus ab *Hobokeno anat. repet. p. 303.* & *Rouhaudio Mem. de l'Acad. 1714. p. 191.* Deinde qui in placenta lac separari docuerunt, iturum ad fœtum, ut *Wharton p. 254.* *Graaf p. 297.* & placentam mammae officium habere *Harvei p. 285.* a ruminantium fabrica errorem desumserunt, quos *Ruyschius* corrigit *Thes. VI. n. 84.* Sed diversæ omnino classes sunt placentarum a *Needhamo* etiam & *Fabricio P. I. c. 3.* constitutæ. Unica in homine, & in cane, ibi cinguli similis est *Eustach. T. 15. f. 7. 8.* *Fabricius f. 28.* & in lepore, & indico cuniculo. Sed in istis animalibus fabrica dissolubilis est similis cotyledonibus, ut rubra uterina ab alba, chorio adhaerente, facile secedat *Charleton mantiss. anat. p. 106.* *Tauvry p. 100.* *Graaf T. 27.*

guntur in unam ^c massam. 2. In bove, ove, capra cotyledones ^d distincte disperguntur.

F. H. I. Multae vero placentae in omnibus bisulcis reperiuntur, tum in equo, ubi tubercula minima chorii loco cotyledonum sunt, habentque respondentes in utero cavitates *Fabric. f. 46.*

^c Plerumque. Septem enim placentas cum duabus venis umbilicalibus *Kerkringius* in homine vidit *obs. 37.* Placentulas duas a primaria separatas *Hobokenius anat. rep. p. 200. f. 25.* Tres etiam placentas vidit *Rouhault Mem. de l'Acad. 1715. p. 134. cum ic. off. p. 6.* cum unico funiculo & vasis simplicibus. Placentam secundariam exiguam vidit *Mauriceau obs. 309.* Caeterum placentarum in animalibus ruminantibus, a placentis carnivororum princeps diversitas est, quod illae succum tenuiorem, hae sanguinem ab utero recipiant *Taury p. 102. 163.*

^d Cotyledones nullam extremam membranam habent, si *Hobokeno de secund. vit. p. 25. & Monroo Edimb. soc. ll. p. 129.* fides, nam contraria docet *Stalpartus.* Numerosae sunt, ad octoginta in ove *I. Sylvius, Peyer obs. 33. Eust. T. 14. f. 9. 10. Fabric. f. 27. & 66.* in vacca *Hoboken secund. vitul. p. 22. & centum p. 233.* intus foraminulentae *Fabric. de form. fet. T. 15, 16. & cavitates habent, & granulosas eminentias, Hoboken p. 23. villosas Fabric. f. 42. Hoboken in icon. 5. 7. 8.* in vacca, quibus similes eminentiae in utero respondent *HOBOKEN f. 7. 15. 30.* membraneo quasi ligamento ad uterum firmatae *HOBOK. f. 14.*

guntur per chōrion, ex quibus tamen omnibus una ^c vena umbilicalis prodit, duaeque arteriae, & unus urachus, perinde, uti in humano genere. Hae enim cotyledones sunt omnino una placenta, in centum divisa tubercula, qualia in femina perinde reperiuntur, sed ita vicina, & compacta,
ut

f. 14. 16. succumque ab utero recipiunt. Hae cavitates nomen fecerunt cotyledonum, ab ovibus desumptum, quarum glandulae evidentius cavae sunt. Liquor intus in ovē mucosus *Vesal.* p. 669. albuminofus, fatuus *Tiling.* p. 319. copiosus, ad cochlear ex una cotyledone in vacca *Tiling.* p. 337. Lac verum *Vieussennius* vocat *nov. vas. syst.* p. 41. Radiculae a chorio in cotyledones actae in aqua maceratae evolvuntur, uti humana placenta *Malp. ep. ad Spon.* p. 29. & liquor in vacca injectus primo in cava acetabula, deinde in substantiam placentulae subit *Aldes* p. 547. sanguinem vero, uti superius dictum not. *b.* ad DCLXXVIII. nullum continent, *Harvei* p. 288. atramentum tamen ab utero adactum admittunt. Vide descriptas a *Malpighio* l. c. *posth.* p. 47. *Tilingium de placent.* p. 50. & *Vesalium* p. 665. &c.

^c Venae umbilicales in plerisque brutis duae sunt, *Schulze an delig.* &c. p. 10. *Nicolai de dir. vas.* p. 109. ad umbilicum vero conjunguntur *Peyer obs.* p. 33. *Fabric. de form. fet.* P. I. c. 2. f. 28. 29. *Hoboken* f. 24. 25. p. 85. *Ruyssch Thes.* IX. n. 20. Ita se habet in bove *Aristoteles hist.*

ut in unam massam abeant, neque ita arcte concreta, quin per artem dissolvi possint. 3. Animalia ovipara habent testam duram, qua pullus defensatur, tum membranas, quae testam subliniunt, porro chorion, amnion, albumen five alimentum fetus, & placentam five vitellum, in cen-

L. Vll. c. 8. in ruminantibus *Tauvry* p. 130. in dama *Harvei* p. 239. & in ipsa balaena *Ruyssch. Thes.* IV. n. 34. & in cane *Weisser de circ. fet. Trevv de chylosi* p. 14. Tres omnino venae in fele sunt. Radiculae vero tot, quot globuli placentae *Needham T. I. Fabric.* f. 27. 28. 29. *Eustach. T.* 14. f. 9. 10. *Hoboken* passim f. 18. &c. multasque olim dixit *Aristoteles de gener anim* L. ll. c. 7. Eam vero fabricam & duas venas coalescentes, vel ante quam umbilicum subeant *Fabric.* l. c. c. 10. *Harveius* p. 289. vel postea, ut *Galenus de util. part.* L. XV. c. 4. male ad genus humanum transtulerunt scriptores, duas enim venas umbilicales ex bove tamquam communem homini fabricam admiserunt *Aristoteles hist* L. Vll. c. 8. *Rufus* p. 45. *Galenus de diff. vulv.* c. ult. *de util. part.* L. XV. c. 4. & *de form. fet. Theopbilus* L. V. c. 19. p. 896. inter recentiores praeter priores *Lauremberg* in *procestr.* p. 153. Errorem veterem correxerunt *I. Carpus* p. CCLIX *C. Stephanus* p. 297. *Varolius* p. 106. *Laurentius* in *Quaest.* 17. L. Vlll. & ipse *Aristoteles* unidentatis unicam venam tribuit *de gener.* L. ll. c. 7. & in homine unica omnino est, daplo vero major

rentro vero vitelli sacculum colliqua menti,
in quo fetus est. Ex fetus vero umbilico
funiculus prodit, qui per duplicem mem-
branam exit, & in vitello radicatur ^f.
Hic vitellus calyx ovi fuit, & nunquam
consumitur ^z, ovum autem ita factum est,
ut

major *Nicolai* l. c. Nonnunquam tamen
duplicem visam refert *Arantius de fet.*
p. 19. 20. bifidamve *C. Bartholinus*
p. 176. Trifidam, sed confluentem in ipso
funiculo *Noortwyck* p. 17. Duas, sed cum
septem placentis *Kerkringius* habet *obs.*
37. Arteria umbilicalis utique fere sem-
per utrinque unica est *Peyer* l. c. In
vitulo tamen unam ex hypogastrica,
alteram ex aorta vidit, cito tamen unitas
Tauvry p. 129. In homine eadem arteria
nonnunquam conjuncta primum, deinde
separata apparuit *Schulze de vas. umbil.*
p. 16.

f Hanc totam rem, quae nimis pro scopo
meo fusa est, remitto ad *Monroum*, qui
accuratam ovi ovipari descriptionem dedit
l. c. p. 104.

g Luteum ipsum per umbilicum absumitur,
ut omnino a placenta differat, *Aristotele*
auctore *de gener. anim.* L. III. c. 2. in
intestina resorbatur *Harveius de Circul.*
p. 144. etiam in crocodilis. *Sebae* vero
commentum, feminas quidem crocоди-
los vitellum in abdomen haurire, mares
autem extra abdomen retinere, & exsu-
gere (*T. 104. f. 7.*) omni analogiae repu-
gnat. Deinde in pullo duplex est vaso-
rum umbilicalium genus *Harvei de corde*

ut omne alimentum , prius , quam ad
fetus veniat , albumina nempe omnia,
elaborentur in vitello , tunc demum trans-
mit-

p. 68. 144. &c. vena nempe ex cava
super hepar orta, ad albuminis membra-
nam , & duae a vena portarum in vi-
tellum.

g* Placenta uterina a *Galeno* pro parte chorii
videtur habita fuisse. Rotundum quasi
viscus est , aut rotunditati certe adfinc
Bidloo T. LXI. f. 1. *Rouhault Mem.* 1714.
p. 180. f. 1. 2. nam acuminatam etiam
vidit *Hoboken anat. rep.* p. 148. f. 18. &
Noortwyck T. 2. aut appendice auctam
Hoboken l. c. f. 26. 36. *Mauriceau obs.*
post. 66. una pluribusve; ovalem autem
Idem Hobokenus anat. prior p. 14. f. 1.
Dimidii pedis latitudo est, aut paulo plus,
ad octo uncias *Drelincourt Perioch* 36.
Chesfeld. l. c. & ambitus dimidio fere ovi
ambitui aequalis; crassities ad unciam ple-
rumque *Hobok. anat. rep.* p. 255, & ali-
quando ad duas *Chesfelden.* p. 282 nempe
in centro ad 14. lineas, in ambitu
vero media parte tenuior est *Drelincourt*
l. c. Innascitur parti superiori ovi , inter
duas chorii lamellas. Facies fetui obver-
sa vasorum umbilicalium truncis oberra-
tur *Hoboken anat. prior.* f. 2. *Rouhault*
1714. f. 2. *Fabric. de form. fet.* T. 7.
f. 16. 20. eademque levior est & concava
Hobok. anat. rep. p. 347. foveas tamen
aliquas habet p. 20. inter vasa *Rouhault*
1714. p. 183. Facies convexa *Hobok.* l. c.
uterum respiciens colliculosa est not. k,
ad DCLXXVI. ibique rami minores
arte-

mittantur ad alendum pullum, perque funem umbilicalem ad hepar transferantur.

Innumerabilibus) Fabricam^h placentae describere arduum est. RUYSCHIVS toties reple-

arteriarum umbilicalium, in furculos semper tenuiores cundo dividuntur. Caro tota, sive parenchyma mollis est, fibrosa, sanguine plenissima, ut recens quasi spongiam referat *Hoboken anat. rep.* f. 22. 36. *Bidloo F.* 57. 61. f. 1. *Rouhault* 1714. p. 181. f. 1. * alicubi tamen aliquantum pinguedinis flavae, fungosae, sub chorio sparsum habet *Hoboken. anat. prior.* p. 18, t. 2. 3. 8. In centro mollior esse solet ROUHAULT. *observ.* p. 5. *mem. de l'Acad. des Sc.* 1715. p. 133. 1716. p. 348.

^h Veteribus receptum fuit, sanguinem esse circa vasa effusum GALEN. *de form. fet.* Fibrillosam placentam faciebat *НОВОКЕНВС*, fibrasque carneas ex rubro nigras nominat *anat. prior.* n. 27. quas NEEDHAMVS aiebat vasa sanguinea spiraliter ambire c. 2. Sed omnino vasa sunt, cum eo seculo placentam excarnare solerent, repletionem autem non uterentur. Hujusmodi excarnatas placentas pinxerunt *Spigelius de form. fet.* T. 6. *Fabric* ab *Aquap.* t. 13. 19. *Kerkring. obs.* 98. *Elsner E. N. C. Det.* I. ann. 1. *obs.* 39. Alibi easdem fibras rete plexuum nervosum vocat *НОВОКЕНВС*, quod divisiones vasorum conjungat *anat. rep.* p. 26. Glandulas & in chorio *posth.* p. 47. ibi a
TAU.

repleto per funiculum corpore placentae, fecit, ut nullibi discindi posset, quin cera secaretur. Injiciebat ceram in alteram arteria-

TAUVRYO pro re certa admissas p. 89 & in placenta credidit se videre adesse, cum substantiam a vasis distinctam videret, sibi tamen non satisfecit MALPIGHIUS *ad Spon.* p. 30. Gelatinam glandulosam in humana placenta praeter vasa & fibras admittit NEEDHAM c. 2. & acinos glandulosos EYSSON *epist. ad HOBOK. & DRELINCOURT. Perioch.* 26. & BRENDelius n. 9. quas glandulas deinde omnino, quasi evictas recepit COLLINS p. 631. & BIDLOO, & vasa in eas ramificata obscurius pinxit T. 61. f. 7. 8. Glandulas etiam ex analogia in placenta dari credidit VALISNERIUS *Opp.* II. p. 53. LITTRIUS, ut solebat, confidentior, & glandulas, & ductus, vidisse voluit *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 386. Ipse RUYSCHIUS, arterias placentae in globulos divisas memorat, *catal. mus.* p. 156. & vasa albicantia velicularum forma recensentur in ZOD. GALL. *ann.* III. p. 106.

Sed dudum Arantius nullam partem placentae esse dixit, quo venae umbilicales non veniant *de fet.* p. 21. Ruyschius autem omnino solis vasis constare, per experimenta sua edoctus, adseruit *Thef.* 2. *aff.* 4. n. 18. neque ullas inesse glandulas confidenter repetit *Thef.* III. *aff.* 2. n. 25. *Thef.* VIII. n. 35. *Thef.* X. n. 5. 7. 60. Ipse porro Brendelius acinos suos explicari in vasa, subeuntia uteri vaginulas, testis

riarum umbilicalium; sic replebantur omnes i venae: aut vicissim venam replebat, sic turgebant omnes arteriae. Placentam, hoc modo repletam, suspendebat in tepida; ita vasa quidem supersunt, quae balsamo cerae a corruptione defenduntur, id omne vero putrescit, quod cera non repletum est: ita fit, ut placenta constet solis vasis arteriosis, & venosis, rubram materiam admittentibus, & per aquae teporem dissolutis.

Cerebro) Ex una arteria rami innumeris ^{*} emittuntur, quos omnes cera subit, ibi finis est arti positus: Reliqua enim pars placentae, quae praeter vasa adest, nisi disso-

testis est l. c. Addit *Roubault*, praeter vasa, trium membranarum continuationes *offer. v. 1. n. 1. p. 20.* vaginas nempe, quas secum per totam placentam adducant p. 15. a media vero membrana unice deductas *Mem. de l'Acad. 1715. p. 131.* confer not. *ee.* Carneis spongiosa peculiaris placentae substantia *Stuart de secund. salut. & nociu.* pertinet ad veterum parenchyma.

i Feliciore nempe injectione. *Hobokenus* enim has anastomoses non invenerat *anat. rep. p. 16.* ut mirer etiam flatum eam viam ivisse apud *Duverney Phil. trans. abr. III. p. 210. & E. N. C. Dec. I. ann. 6. obj. 202.* & liquorem apud *Tauvryum p. 139. Nicholls p. 47. Bartholinus* dudum adfirmaverat p. 314. vix, puto, expertus, atque omnino verior *HOBOKENUS*, crassas, & visibiles truncorum anastomoses negat p. 313. 332. *anat. rep.*

dissoluta fuerit, una confusa, rubens, massae est. Si dissolveris, manent vasa sola, & reliquum perit omne, uti in cerebro^l. Ultimus demum arteriarum placentae ramus ubique diffilit in plurimos ramos incredibiliter parvos, uti pili penicilli ex calamo conferti exeunt. Idem in venis verum.

Folliculis) Tenella juvencula pepererat infantem, sic satis sanum, apparuit placenta plena undique folliculis, in quarum cavitate rotundi lapilli erant. Ita RYVSCHIVS placentam vidit mutatam in ampullas^m aqua pellucida ad ignem concre-
scente

^l Truncos vasorum placentae elotos totos lanuginosos apparere, obnuptos nempe brevibus ramis, quasi tomentosis Noort-vuyck p. 20. neque repugnat, aut incommoda est, icon *Spigellii* T. 6.

^m Hydatidum in universum regio uterina fertilis mater est. Saepissime vidi tubae appensas, & PECHLIN *cent.* I. *obs.* 19. & etiam GRAAF p. 259. VESLINGIO observatas p. 73. frequentes non raro in ovario, RUYSCHIVS *adv.* I. n. 2. &c. in utero alii ZOD. GALL. *ann.* IV. *m.* Mart. &c. VALISNERIVS p. 48. Sed etiam placentae hydaticae minime rarae sunt. C. GEMMA inter species abortuum recenset speciem quae, vitellos quasi ovorum & vesiculas mistas habeat *Cosmocrit.* p. 86. f. 1. Ovula cum fetu egesta PANAROLVS habet *obs.* 18. *Pentec.* II. Globum ex bullis compactum MARCELLUS DONATVS p. 461. Apud
CHRIST.

CHRIST. a VEGA septingentae vesicae loco fetus egestae, cum frustis carnis, & similis apud VALERIOLAM historia exstat. Tumor ex uteri ore pendulus extirpatus, totus plenus cellulis aquosis RUYSCH *Thef.* VIII. n. 102. Similis tumor in mortua repertus adhaerens utero BRESL. 1726 M. Mart. Mola vesicularis E. N. C. Dec. 11. ann. III. n. 157. MAURIC. *obs. post.* 107. ZOD. GALL. III. p. 74. la MOTTE *obs.* 15. BRESL. 1723. m. Sept. FUCHNER *misc.* 1729. p. 316. ALLEN *syn. med.* c. 14 n. 41. Partus vesicularum numerosissimarum, inanium, aut plenarum aqua crocea TULPIVS *obs.* 32. L. III. Partus bullularum, quae tres replerent cantharos E. N. C. Dec. 11. ann. IV. *obs.* 114. & similis historia ann. VI. *obs.* 164. Racemos vesicularum ab abortivo dejectas LANCISIUS ep. ad MYLEBANCHER & similis est historia MAVRICEAV *obs.* 347. Aliquot millia hydatidum per uterum egesta LANZON *obs.* & E. N. C. Dec. 11. ann. 9. *obs.* 38. & similis est historia BIANCHI de gener p. 245. Acervus vesicularum septimo mense egestus, coagulabilem VALISNERI *obs.* 29. & denuo E. N. C. Cent. IX. *obs.* 73. cum bona icone : & numerosissimas historias IDEM habet in *defensione sua.* conf. BRESL. I 24. p. 212. MORGAGNVS *epist.* III. n. 14. Schulze de *trich.* p. 85. Stalpart van der Wiel Cent. I. *obs.* 70. novem librarum pondere *hist. de l'Acad.* 1715. *obs.* 7. Frequenter se huiusmodi placentas reperire Ruyfchius de *musc. ut.* passimque recenset *Thef.* X. n. 63. 64. 65. *Thef. max.* n. 46. iconesque dat *obs.*

sciente plenas. Hi folliculi pereunt in
prae-

33. tum *Venette, Riva, & Bidloo exerc. chir. T. II.* Post tetum egestus hydatidum racemus 4. librarum *Schurig muliebr. p. 289.* Carnea mola cum appensis vesiculis *Schaarschmid berl. nachr. II. p. 352.* Placenta vesicularis filamentis cavis cohaerens, liquore spisso plena, sapido *Hist. de l'Acad. des sc. 1715. p. 8.* In vacca etiam molam vesicularem *Valisnerius* describit.

n Peculiarem descriptionem partus 6000. vesicularum, post tetum imperfectum egestarum dedit *Valisnerius oper. II. p. 32.* & ex eo *Lanzonus obs. 6.* tum *Malpighius*, plures ex petiolo proprio ejusque ramis appensas fuisse, mole varia, fibris donatas longitudinalibus, et circularibus, plenas lymphâ densa, insipida, non coagulabili *posth. p. 87.* Eas partim ex placenta, partim ex amnio & chorio *Valisnerius* deducit *p. 38, 49. &c.* Sed *Ruysschius* fuisse, placentas retentas juniores ad mensem quartum in molas carnosas plerumque abire, mense vero septimo & octavo in hydatides *obs. 28.* (& ex eo *Bianchi p. 119.*) esse vero vasa ipsa placenta in hydatides mutata *Thef. III. n. 8.* in extremitatibus suis *Tbes. VI. n. 102. 103.* *Advers. I. n. 2.* ut tamen alibi a cellulosa vasorum tunica deducat *Tbes. VI. n. 104.* Id certum est, nasci, ubicunque cellulosa fabrica est; & nihil inde glandulis praesidii esse. Nam rami, quibus appendebantur vesiculae, cavi undique, ita consentiebant cum hydatidibus, ut vel per
ramum

praeparata placenta, dum eluitur, neque apparent, nisi in morbis. Satis enim manifestum est, has hydatides esse vasa lymphatica, & forte in decreascentibus seriebus in placenta omnis generis vasa arteriosa, venosa, lymphatica °, & fere omnia reliqua vasorum genera.

Mem-

ramum in vesiculas, vel per istas in ramos aer subiret *Valisneri E. N. C. Cent. IX. obs. 73.* Hoc experimentum & per immutata vasa explicari potest, & per cellulosae membranae morbum, per glandulas non potest.

n* Calculi in fimbriis tubarum *Graaf p. 259.* ibique & in ovarii membrana *Hist. de l'Acad. 1701, n. 3.* Lapilli granis milii similes in ovario hydropico *Petermann apud Schurig mul. p. 317.* In secundis arenulae inter vasorum racemos & in placentae venulis *E. N. C. Dec. II. ann. IX. obs. 137.* Pessus in vagina crusta lapidea obductus *E. N. C. VI. obs. 44.*

o Ita recte *Vieussenius* apud *Voglium II. p. 168.* multa vasa placentae lymphatica esse, licet a *Ruysschio* repleantur eademque *Valisneri* observatio est *op II. p. 51.* Hos meatus lymphatico lacteos placentae video ita a *Vieussenio* describi, ut ab arteriis recipiant mercurium impullum, qui per eosdem exprimi possit apud *Voglium II. p. 169.* An vasa tenuiora? Venas vero lymphaticas vulgares, dictas *Whartono* *p. 220. 244.* ex sola omnino theoria. vel certe cum gelatina funiculi confusas, tum *Deusingio* & *Diemerbroeckio* repetitas *p. 213. 222.* & a *Meryo*

osten-

Membranula) Ut nihil videatur ad placentam posse venire ^p. Quando femina perfectissime parit, non fetum excutit, sed faccum in quo fetus est, undique instar ovi integrum, quale ovum a citharoeda ejectum optime descripsit HIPPOCRATES ^q. Hujus ovi exterius involucrum duplex est, membranacea chorion, & placenta. Illa, quae exterius est ovi involucrum, super ovi ambitum ductum, venit ad placentae limbum, tunc finditur in duas laminas ^r. Exterior supra limbum trans placentam scandit, hujus convexam, & uteri concavam partem obducit. Altera, interior pars fissae chorii, inter placentam fetumque subducitur, cumque amnio membrana ibi connectitur: ut chorion omnino in placentae duplicatura sedeat, manifesto argumento, ad fetum eam, non ad matrem pertinere, licet in ipsis embryonis initiis placenta, & totum ovum pars fuerit materni corporis ^s. Haec sola placenta necitum

ostensus in membranis aquarum, la MOTTIO teste ^p 101. chylososve ductus funiculi EVERARDI & PASCOLI III, ^p 86. merito negat se vidisse HOBOKEN *anat. rep.* ^p 325. atque demonstrat particulas, quae possint pro lymphaticis inponere ^p 338.

^p DCLXXVIII

^q DCLXXIV DCLXXXV.

^r DCLXXVIII.

^s DCLXXIV. Desit autem pars corporis materni esse, quando ovum, cujus pars placenta fuit, de luteo corpore decessit.

cum matre fetum, numquam enim canalis aliquis inventus est, qui inter matrem fetumque communis intercederet.

Funiculum) Corpus nempe, per quod fetus cum placenta communicat, naturae pene cartilagineae, flexilis, ut in quamcunque partem facillime cedat. Perforat autem chorii laminam internam ^t, deinde amnion, sic ad fetum penetrat.

Arterias) Arteriae Iliacae ex magno trunco lumbari aortae oriuntur, inde vero procedentes dant ramum utrinque ^u, quem

^t Amnios ad funiculum se insinuat ad pollicis ad minimum distantiam a primo vasorum umbilicalium ad placentam adventu, & a chorii adhaesione NOORT WYCK p. 133. ubi fere vasa incipiunt separari ROUHAULT 1714. p. 387. HOBOKEN *anat. rep.* p. 156. f. 1. B. f. 15. K. f. 19. RUYSCH *adv. anat.* II. n. 10. Intra amnion connexa cum amnio media adhaeret funiculo superior Rouhault *observ.* p. 22. *Mem.* 1716. p. 343. Caeterum perforationis funiculi, uti per tres membranas subit, iconem, sed puto, non ad naturam, dat Hobokenus *anat. rep.* f. 32.

^u Originem alibi dixi DCLVI. In funiculo ipso solidae omnino sunt ut sectiones se sustineant, neque ita tenues, ut Harveyus fecerat p. 188. graciliores autem quam in corpore, confer Hoboken *anat. repet.* 36. plerumque inter se aequales, ut tamen etiam alteram ampliorem viderim, Incerto in funiculo situ ambulante

quem etiam aortam dedisse visum est, qui
retro-

Rouhault off. p. 27. conf. *Hob. anat. prior* f. 12. & *repet.* p. 188. f. 27. 36, modo longe simplices & rectae, modo, & tunc inprimis quando rectissimae sunt *Rouh.* 174. p. 413. gyris praecipitibus ad angulos valde acutos contortae, ut contra se ipsas quasi redeant in annulum, paucioribus spiris & incerto numero *Rouhault* *offerv.* p. 38. 1714. p. 412. f. 6. d. d. e. *Monroo* l. c. p. 160. T. 1. f. 5 & fere *Hobok. anat. repet.* f. 11. 12. Venam plerumque mediam continent *Monroo* l. c. *Hobok. repet.* f. 6. 31. ut pullu sanguinem venosum urgeant *Rouh.* off. 1V. p. 53. *Hist de l'Acad.* 1718. p. 15. Arteriae, quam vena longiores sunt, quod saepius gyrentur *Rouhault* p. 28. *Hobok. anat. prior* p. 29. Intus in arteriis *Hobokenus* operose describit nodos, quorum prius aliqua memoria fuerat *Carpo* p. CCLXIII. *C. Gemmae* p. 85. *Fabricio* f. 20. 16. *Riolano*, p. 377. *Rolfincio de fetu*, *Courveo* p. 200. valvularum nomine, & aliis. Hi passim picti *Hobok. anat. repet.* f. 1. 2. f. 1. 2 5. 9. 15. 16 31. *Rouh.* 1715. f. 1. 2. 1714. T. XI f. 7. 3. latitudines sunt arteriae majores *Hoboken* *rep.* p. 141. f. 38. 39. *Bidloo* T. 16. f. 1. *Vieussens* apud *Vogli*, rotundae *Hoboken* *repet.* c. 1. art. 8 f. 5. aut piriformes, versus placenam angustatae *rep.* p. 325. extus macula designatae *anat. prior* f. 5. 6. 7. *repet.* f. 27. c. 1. art. 4. minori quam in venarum nodis *rep.* p. 343. exigua plica membranae internae duplicis
anat.

retrorsum prodeuns, ex suo trunco, venit utrinque ad umbilicum, sub interiori

anat. prior p. 44. 45. a reliqua simplici cylindro arteriae distinctae, *rep. c. 1. art. 8.* p. 316. f. 39. constantes p. 134. 236. *anat. prior* p. 57. *Rouhault* 1714. p. 409. ab extensione funis non evanescentes *Hobok repet.* p. 296 340. in quibus membranae arteriae tenuiores sunt p. 235. & laxiores *anat. prior* f. 5. 6. 7. & ipsa membrana tuniculi tenuior *repet* p. 345. Eos nodos credit *Hobokenus* sanguinis iter morari, si retrocedere vellet *versus jecur repet.* p. 141. 233. 750. c. 1. art. 4. etiam experimento usus p. 141. quale *Rudbekius* etiam habet apud *Hemsterhus* p. 327. Plicas similiter internas, quae mercurium in globulos dividerint, *Ruyschius* habet *cat. Mus* p. 156. Recentiores autem his nodis parum tribuunt, valvulasque esse negant *Verbeyen* II. p. 344. *Rouhault off.* p. 33. & 1714. p. 400. & *Eyssonius* in *epist. ad Hobokenum*, non diffidente *Hobokeno* p. 141. cum prius omnino pro valvulis ex duplici membrana interna dedisset *anat. prior* p. 31. Varices vocat *Brendelius de nutr. fet. n. 7.* Violentiae demum obstetricum tribuit *Rouh.* p. 34. gyris autem *Mauriceau* p. 229. Et certum est, ceram facillime viam per arterias ad placentam relegere *Rouh.* l. c. inpletamve cera, vel inflatam *Rouh.* 1714. p. 711. arteriam omnino cylindricam apparere. *Rouhault* in partibus rectioribus arteriae nodos magis re-

interiori * lamella peritonaei , inde porro ex fetus corpore exit , & subit funiculum umbilicalem , atque ultimo in centrum placentae implantatur. Hae arteriae repletae distendunt y totam placentam. Nullum vero

periri observat *off.* p. 38. Porro prope adhaesionem amnii , ad funiculum, ramo intermedio arteriae umbilicales dicuntur uniri *Roubault* 1714. p. 187. *offeru.* p. 29. *Vieussens* apud *Voglium* II. p. 220. *Hale* in *Phil. trans.* f. 1. N. in ruminantibus vero *Tauvry* p. 129. *Fabric.* f. 38. *Hoboken secund. vit.* f. 23. 24.

x Exterius accumbunt peritonaeo , perque cellulofam repunt.

y Ubi ad placentam venerunt trunci majores, pellucunt per amnion & mediam *Hoboken repet* p. 188. *Bidloo* T. 61. f. 1. radio- rum more, si funiculus centralis fuerit, aut majores ad partem majorem placen- tae, si eccentricus *Roubault* 1716 p. 346. Ita per superficiem cavam placentae, in- ter chorion & mediam eunt *Roubault offeru.* p. 15. neque aliter intelligo ejus scriptoris ,, duplicaturam mediae p. 29. uti eo refero voces *Hobokeni*, quando per mediam ait repere p. 322. & consentit *Cl. Noortwyck* p. 26. media nempe ipsi amnion est. Per cellulofam adeo chorio & mediae interpositam *Noortwyck* p. 25. 27. longe repunt arteriae , & ad limbum paulatim extenuantur. Hae arteriae inter se invicem communicant , & venae perin- de *Galen. de util. part.* L. XV. c. 4. Vide porro *Bidloo* T. 60. f. 1. Ab eo re- te fundamentali *Noortwyck* p. 19. rami exeunt

exeunt ubique , qui vel prope limbum ,
 vel citius *Noortwyck* p. 27. mediam pri-
 mo *Roubault* 1714. p. 188. f. 3. 1715.
 p. 132. *observ.* p. 13. *Hoboken repet.* f. 19.
 C. deinde chorion perforant *Hobok. repet.*
 p. 423. aut secum vaginae specie addu-
 cunt *Roubault observ.* p. 13. 1715. l. c.
 1716. p. 346. *Noortwyck* p. 152. Hae
 ipsae arteriae chorion placentae nectunt,
 quia perforant *Noortwyck* p. 27. Hi
 porro trunculi in carnem placentae ad per-
 pendiculum demerguntur conf. *Hoboken.*
rep. f. 21. f. 20. aa. bb. ubi observandum,
 mediam apud *Roubault* & *Hobokenum* ple-
 rumque cum chorio conjunctam pro una
 haberi membrana , ubi chorion cavam
 partem placentae sublinat. Eundo ramosi
 extenuantur , efficiuntque hemisphaeria
 placentae , superius dicta *Roubault* 1715.
 p. 133. 1716. p. 348. tenues & lymphati-
 corum similes *Ruyssch Adv.* ll. n. 10.
 hinc in placenta minime , uti in umbilico
 pulsantes *Nymman* p. 23. finibus tomento-
 sis *Hoboken anat. repet.* f. 41. Donec ulti-
 mae fibrillae arteriosae partim per villosam
 chorii lamellam exeant *Roubault* 1716. p.
 347. & utero obponantur *Roubault observ.*
 p. 16. partim in venae umbilicalis ra-
 mos continuitate canalis inflectantur not. i.
 A limbo placentae conspicua vascula cho-
 rion adeunt *Needham* c. 4. *Roubault* 1716.
 & *off.* l. c. quae longe per eam membra-
 nam repunt , partimque in ea terminan-
 tur , partim aperiuntur in uterum , par-
 tim ramulos capillares spargunt ad amnion
 & mediam , *Rouh.* l. c. qui plures inter
 chorion & mediam , pauciores inter istam
 & amnion apparent 1714. p. 198.

vero dubium est, quin a fetu ad placentam eant, id dubium esse potest, an sanguis, quem advehunt, in placenta maneat. De ea quaestione nunc dicendum est. Canales omnes, qui recta ab origine sua procedunt, faciunt, ut illae liquidi sui particulae recta progrediantur, quae motus sui tenaciores sunt. Si sclopetum oneraveris ^z fragmentis plumbi, quod metallorum, post aurum, ponderosissimum est, tum cupri, ferri, lignique, & exploseris sclopetum in loco ita disposito, ut locus observari queat, inquem globuli delapsi sunt, invenietur, plumbeos globulos longissime progresfos fuisse, ligneos autem sclopeto jacere proximos. Ita sanguis, qui per Aortam descendit, incurrit in arterias Iliacas, invenit laterales & retrogradas arterias umbilicales, eas ergo subit ea pars sanguinis, quae ex legibus hydraulicis motui suo continuando ineptissima est; haec pars tenacissima & feculenta sanguinis fetus, aufertur per arterias umbilicales, redditur placentae. Sed placenta refert ad fetum eum sanguinem, qui vel per arterias umbilicales advenit, vel ab arteriis illis

^z Conf. CCLIII. not. b. & de umbilicali *Belinger of the nutrit.* &c. p. 76. Huic diversitati aliquid tribuo. Nam angulus, quem procedentes cum trunco umbilicales intercipiunt acutus satis *Parsons of the bladder* T. V. f. 2. *Trem. de differ.* t. 71. sensimque retrogradus est, & vidi, ceram in unam umbilicalem impulsam, per alteram non rediisse, manifesto argumento, hoc iter paulo difficilius esse directo itinere.

illis tenuissimis uterinis in venas placentae re-
funditur : uterque sanguis confluit in venam
umbilicalem, tum ille, tum iste, subti-
lissimus, & defaecatissimus, quem mater
remittit fœtui. Plerique nunc etiam sapien-
tes viri docent, sanguinem dimissum ex
fœtus arteriis, ferri in placentam, ibi,
tamquam in pulmone ^{aa} mutari, cum eo
tempore verus pulmo ^{bb} in fœtu otietur, uti
in

^{aa} Ita *Needhamus* & *F. Hofmannus* p. 348.
chylum nempe cum sanguine miscere.
Sed etiam *Arantius*, & *Riolanus* p. 373.
sanguinem volebant in placenta depurari.
Aerem vero, a matre accipere fœtum per
umbilicum *HIPPOCRATES de natur. puer. n.*
5.37. ipsumque dudum semen a matre spi-
ritum habere *n. 1. renovante Mayowio opp.*
p. 272. & *Meryo ancients mem. X. p. 273.* etiam
experimento addito *de la circul. p. 55.* &
P. Corn van der Wiel, & Duvernoy
Comm. Paris. 1699. p. 323. & *Valisnerio*
Giorn. de letter. suppl. 3. p. 116 & *Cheseldenio*
L. IV. c. 3. His ita credo, si talem
aerem velint, qualis in sanguine materno
est, nullo elatere praeditum, neque adeo
pulmonis officium suppleturum CCI.

^{bb} Non desunt, qui fœtum, in mediis aquis,
velint respirare. Frustra opponimus aëris
impossibilem accessum per ovum integrum,
aquas circumfusas undique, & pulmonem
ponderosum, certissime fundum petentem,
quem aeris accessus continuo cogit innat-
tare. Audacior contra it *Maxinus* toto
libello, post *Claudium la Courvée* P. III. c.

in homine respirante sanguis ex pulmonis actione mutatur. Hinc in placentam ferri, quod in sanguine fetus faeculentissimum est, ut

IX. *Everhardum* p. m. 252. *Veslingium*, *Charletonum* p. 165. aliosque, dictos *Tilingio* p. 347. & *Meryum* apud *duHAMEL* p. 302. Utitur autem *Maxinus* argumento a suctione fetus *diff.* 3. Praeterea adferunt vagitus uterinos, quales *Maxinus* compilat *diff.* II. p. 8. seqq. & *Bartholinus hist.* I. Cent. I. & ex aliis & ex adfirmatione feminae. Habet etiam similes historias vagituum *Libavius*, *Nymman de vit. fet.* p. 44. *Guifsart* p. 103. *Deusingius*, *Schurig. dialogr.* p. 396. *Tiling de placent.* p. 412. *Bohn de infanticid.* p. 176. *Fantonus*, *Needham* c. 3. E. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 164. Dec. II. ann. V. obs. 194. ann. 7. obs. 43. pro re certissima, ann. VIII. obs. 196. ann. X. obs. 135. Dec. III. ann. 5. 6. obs. 233. Cent. I. obs. 50. *Lanzoni* obs. 16. sed ex auditu, & nuper fide confirmatas dedit *Derham Phil. tr. n.* 324. & *Cappellerius*, eruditissimus *Lucernensium* medicus *Bresl.* 1729. m. Aug. p. 516. repetitas a *Schurigio embryol.* S. II. c. 4. in brutis denique variis adfertur, muribus E. N. C. Dec. II. ann. X. obs. 122. catellis ann. IX. obs. 197. Singultum denique fetus humani habent in E. N. C. Dec. II. ann. VI. obs. 15. Tum huc referunt pipitum anatum & gallinarum in ovis decimo octavo die exauditum. *HARVEIO de gener.* p. 39. 69. 70. 72. & *FABRO* apud *HERNANDEZ* p. 771. decimo vero *MALPIGHIO de incub.* p. 10. nuper etiam *DERHAMO* teste &

ut per fabricam placentae satis tenuis red-
datur, qui ad fetum redire, vasaque ejus
percurrere possit: certum enim esse, sangui-
nem in vena umbilicali tenuiorem & flui-
diorem

REAUMURIO *Memoir.* &c. ll. p. 33. &
A. MAITREIEAN p. 279. & MONROO
Edimb. soc. ll. p. 214. & olim ARISTO-
TELE *hist.* Vl. c. 3. Porro cavitates a-
ereas inter humores & vasa NEEDHAMO
dictas c. 3. bullas aereas in sanguine fetus
MORGAGNO visas *epist.* XX. n. 58. ae-
rem vero in difficili partu ex secti fetus ab-
domine erumpentem MAZ. *diff.* ll. p. 13.
Denique necessitatem aequilibrui contra
aerem externum adlegat MAZINUS p. 17.
Mensuras etiam & pondera decrefcentis in
pulmonibus ponderis specifici, adducit
Idem in *diff.* Vl. ut demonstret, non aliam,
nisi aeris accessionem, hujus specificae le-
vitatis causam esse posse.

Sed vagitus uterinos, plerumque ex ignarorum rela-
tione a medicis admissos, recte negare viden-
tur *Diemerbroeck* p. 236. & *Valisnerius* in 2.
dialogo, & *Breslavienses* 8 vers. p. 1879.
& *Brendelius de nutr. fet.* n. 13. qui enim
sonum edat fetus in mediis aquis? quod
ne adultus quidem potest. Pullorum pi-
pitus in ovo integro negat expertissimus
Valisnerius, tribuitque rimis ovi, & in
fetu tum demum possibiles esse concedit,
quando membranae ruptae sunt *Giorn. de*
letter. suppl. 3. p. 143. uti corticem rup-
tum vidit, cum pullus pipiret *Faber* l. c.
In putredine vero aer utique evolvitur &
adparet elasticus, idemque forte *Mazino*
inposuit. Pulmonem porro in adultiore
fetu

diolem ^{bb*} esse, quam in arteria. EGO vero credo, hoc in matre potius fieri. Non nego, sanguinem omnino etiam in fetu parari, ex liquore nondum sanguineo, uti pullus in ovo omnino sanguinem suam ipse facit, qui nihil a matre accipere potest: Hunc suum sanguinem projicit fetus per duos canales arteriosos excretorios, adeo amplos, ut fetus intra paucissima horae minuta extanguis ^{cc} pereat, quando ob-
stetrix funiculum ligare oblita est: hic enim tristissimus casus, antetres annos Leidæ accidit: multum adeo sanguinis a fetu accipiunt; Eo abit is sanguis, ea copia, quæ faciliorem viam, sive resistantiam minorem in placenta, quam in corpore invenit. In placenta sanguis iste in venas transit, directæ tere via, cum ceracea materies impulsâ in arteriam umbilicalem, per venam redeat. Verum præter hanc portionem, quæ ad fetum redit, videtur omnino aliqua pars arteriosi sanguinis ab ultimis placentaë arteriis in minimas uteri ^{dd} materni venulas
ve.

fetu minus compactum esse, aegre crediderim, & minus credo scriptori, qui de industria hypothesein ornat. In fetu denique pulmo non inflatur, quando in vacuum dimittitur *Hofman*.

^{bb*} Tenuiorem LITRE *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 386. floridiorem HOFMAN l. c.

^{cc} Conf. DCLXXXII.

^{dd} Ita DRELINCOURT. *Perioche* 37. seqq. MAUROCORDATUS, MAURICEAU p. 230. ROUHAULT 1714. p. 415. & de
vi.

venire, inque matris venas, pulmonem & cor: ut sanguis, qui in fetu nullam pulmonis operam expertus, iners est, in matrem refundatur, in hujus pulmone elaborandus: Matris vero sanguinem in suo pulmone perfectum, per arteriolas uteri, videtur reddi venulis placentaeque; ut tantumdem praeparati sanguinis mater fetui restituat, quantum crudi, & imperfecti sanguinis accepit a fetu. Neque credo placentam pulmonis vices obire posse: otiosus enim pulmo, & aere destitutus, nihil agit: sed placenta aërem nullum habet, neque agitatur, & videtur potius circulationem sanguinis difficilem reddere, quam expeditam. Et sanguis, qui per compactam, resistentem placentae massam transire potuit, multo facilius per corpus fetus minus resistens circulationem absolvere poterit.

Vaginae) ^{ee} Placenta constat ex valis sanguineis, serosis, & lymphaticis, & cellulosa

vigesima parte sanguinis arteriarum umbilicalium IDEM ROUHAULT 1715. 132. Mihi valde probabile videtur, & videtur requirere experimentum, quo constat, vasa uterina, quae opponuntur placentae, venosa esse. Solent confirmare magnitudine venae umbilicalis, sed ea arteriis suis non majori ratione amplior est, quam est jugularis in adulto ad Caronidem. Negabat totam rem TAUVRY p. 137.

^{ee} Carnem albam vasa investire in placenta FABRICIUS viderat l. c. P. I. c. I. & materiem, qualis in umbilicali fune

est.

cellulosa membrana, quam demonstrant hydatides, in quas placenta mutari visa est, manifesto argumento, loculos inter vasa inanes esse.

Vena) Venae ex omni visibili placentae puncto exteriori ^{ff}, aut interiori, oriuntur suis radiculis; eae dispersae paulatim coeunt, & in unicum denique truncum

arterias & venas, obscurius tamen, instar capsulae investire WHARTON p. 244. Cl. BRENDelius internam chorii laminam vasa comitari dixit l. c. n. 9. Sed disertius ROUHAULT, arterias venasque a cava superficie amnii, per mediam membranam viam sibi facere, & ab ea vaginam accipere *Mem. de l'Acad.* 1715. p. 132. 1716 p. 346. neque ullibi vasa nuda ire *offerw.* p. 15. 16. suamque singulae vaginae arteriam esse venamque *offerw.* p. 14. easque vaginas eundo adtenuari 1715. p. 135. Porro Cl. NOORTWYCK cellulosa funiculi, perinde uti WHARTONUS, continuari vidit inter mediam (quam amnion vocat,) & chorion, inque ea vasa repere p. 26. 148. ut etiam inflando funem amnios a chorio secedat p. 142. hanc ergo substerni placentae & comitari vasa p. 148.

^{ff} Venae placentae oriuntur, aliae quidem ab arteriis, quod demonstrat injectio not. 2. aliae ab uteri vasis chorio continuatis DCLXXVIII. aliae a parvis venis superficiei placentae, oppositis uterinis sinubus, qui partem, quam Cl. *Rouhault* vigesimam credit esse sanguinis placentae, reddunt fœtui. Paulo majorem tamen esse, quam est,

cum ^{gg} confluunt, qui, cum valvulis destituitur ^{hh}, repletus arte Ruyschiana, totum corpus placentae aequabiliter cera replet. Ubi

est exportatio arteriarum, demonstrat incrementum fetus. Inde confluunt aliae quidem venae in sinus venosos, molles, substratos superficiei convexae placentae, NOORTWYCKIO dictos p. 26. aliae in trunculos venosos fiunt, qui contra arterias comites eunt, & pariter chorion perforant, mediamque, ROUHAULT 1714. f. 3. tuncque faciunt rete in cava placentae facie, simile arterioso, & crassius, cum venae majores sint HOBOKEN *anat. rep.* p. 17. & plures p. 173. 279 contra contrariam HARVEII non bonam adfirmationem p. 239. & TILINGII p. 306.

^{gg} Vena umbilicalis unica in funiculo fere est, arteriis multo amplior, ut ego venae lumen repperim 900. cum arteriarum junctarum lumen esset fere 392. quadruplum vero luminum junctorum arteriae ROUHAULT *off.* p. 40. 1714. p. 413. & rarum exemplum sit, quando venam altera arteria non majorem vidit Noortwyck p. 29. sed & ibi paulo ulterius naturalem magnitudinem recuperavit. Conf. *ic. Trew. Comm.* 1733. T. 3. f. 2. Tenuior arteriis & collapsa est, aliter, quam vidit Noortwyck p. 25. Rectior in univ-
ersum est arteriis *Hobok. anat. prior.* p. 29. *Mauriceau* p. 228. ut mirer magis capreolatam dici *Arantio* p. 20. & profundior, & copiosiore cellulosa cincta *Noortwyck.* p. 25. alibi tamen pariter superficia-

Ubi ea vena ad funiculum umbilicalem venit, pergit ad centrum gravitatis fetus, nem-

ficialis est, atque gyratur. Ad placentam ampliorem esse *Hobokenus anat. rep.*

P. 54. 55.

hh Plicam obscuram, valvulae similem, ad divisionem trunci, ubi funiculus placentae committitur, posuit *Hobokenus repet.* p. 89. 193. f. 7. 29. veras autem valvulas in ramis primariis p. 32. Deinde nodos venosos, pridem tactos *Carpo* p. CCLXIII. & *Riolano* p. 377. qui sanguini tribuunt in gyris retento, & varicum nomine citatos apud *Harveium* p. 289. dictos etiam *C. Bartholino inst. anat.* p. 176. *Laurembergio in procestr.* p. 153. *T. Bartholino anat.* p. 311. *hist.* 61. *Cent. I.* & *Eyssonio*, & macularum nomine a *Spigelio de form. fet.* c. 9. extus maculis distinctos *Hobok. rep.* p. 343. *Rouhault off.* p. 33. arteriosis majores, olivares *anat. repet.* f. 31. p. 343. pro frequentibus etiam habitos a *D. la Motte obs.* 211. fuse describit *Hobokenus*. Minus veros nodos esse fatetur tamen p. 138. 190. sed laxitates sinusque dilatatae venae p. 238. 344. 358. f. 28. 30. 31. 42. 43. inprimis, analogas valvulis p. 139 ubi vena rugulis intus transversis inscribitur p. 358. f. 44. His credidit *Hobokenus* effici, ut sanguis difficulter contra naturale iter a fetu ad placentam relabatur p. 41. 88. & valvulas etiam vocat VENETTE p. 275. Verum repugnant certe experimenta, & injectio contra iter sanguinis facile succedit. Refutat etiam has valvulas *VIEUSSENS & BLAS-*

nempe umbilicum. Ibi epidermis ii, quae totum corpus fetus ambit, non pertunditur, sed erigitur circa funiculum umbilicalem, & fit prima ejus vagina, quae super funiculum adfurgit. Idem & reticulum Malpighii facit. Deinde cutis eodem modo non

BLASIUS *anat. hom.* p. 164. & auctores *Act. Mar. Balth.* 1699. p. 19. & *Mauriceau* p. 230. *Harveius* crediderat moderari sanguinis inpetum p. 289. In cervae fetu omnino sanguis ex fetu in funiculum noluit redire I. M. *Hofman* E. N. C. *Cent. X. app. obs.* 46. Valvulam vero, aut plicam, ad venae umbilicalis cum sinu venae portarum conjunctionem, pene circularem TREWIUS habet *de differ. inter. nat. & non nat.* T. I. f. 1. f. aliasque valvulas & ad venosi ductus utrumque finem, tum ad sinum TREW T. I. f. 6. 8. 18. 19. & f. 64. TAUVRV p. 180. ib. in vacca visam MORGAGNO *adv. anat.* I. p. 21. tum ad cavam TREW T. I. f. 1. TAUVRV I. c. GROESER p. 14. nondum manifesto vidi, neque ipse multum tribuit TREW p. 44.

ii De hoc anulo nondum certa experimenta habeo. Id interim video, peritoneum in sede funiculi integrum esse, tum cutem, circa orientem, & quasi articulatam funiculum caeco anulo protuberare, deinde funiculum anulo quodam a cute & peritoneo TAUVRV p. 138. & intertextis fibris obliquorum circumdari. Conf. FABRIC. f. 17.

non perforatur, sed in cavam cylindrum funiculi adscendit, & fit secunda vagina. Porro cellulosa membrana pariter adscendit, ambitque funem. Denique subest peritonaeum, nam muscoli utrinque secedunt; id constat duabus distinctis laminis ^{kk}, separatis, teste IOBO a MEKREN, inter quas viginti aquae librae recipi possunt, uti per experimenta certum est. Quando nunc funiculus umbilicalis ad exteriorem peritonaei laminam venit, eam ingreditur, & circumdatam accipit, interiorem vero non perforat, sed exit inter utramque lamellam peritonaei, ad fissuram hepatis anteriorem: ibi peritonaeum secedit, & vena sola pergit, suoque tubo insinuatur in venam
por-

^{kk} Externe circumposita cellulosa, & membrana vera. Vena vero, perinde uti arteriae umbilicales & urachus, nullibi internam membranam subit, quam his vasis remotis integram superesse manifestum est HENSING in utilissima *diff. de periton.* n. 13. & inprimis n. 44. ut omnino plicae peritonaei WINSLOWI, & CASSEBOHMII, de *viscer. sect.* p. 56. 57. quae urachum & arterias umbilicales sustentent, mihi obscuriores sint. Vagina nova SCHULZIANA & TREWIANA *Comm.* 1737. *bebd.* 13. mihi videtur in fetu & homine nuper nato, pulposa, quasi a funiculo continuata substantia esse, neque ad peritonaeum pertinere. Haec carnosae pulpa est, quam in exortu arteriarum umbilicalium vidit DRELINCOURTIVS, apud PECHLINVM de *purg.* p. 479.

portarum ^{II}. Haec vena sanguini vehendo destinata est, qui a visceribus chylopojeticis fetus redit. Accedit nunc sanguis a placenta, adeoque plus sanguinis offertur hepatis, quam potest admittere. Ergo ex sinu venae portarum, & ex extremo fine opposito venae umbilicali, tubulus prodit, qui recta via in cavam venam ducit, quae sanguinem a partibus inferioribus in cor revehit.

^{II} Vena umbilicalis ab umbilico satis longe adscendit retrorsum, sustentata a ligamento suspensorio hepatis, quo continetur: tunc fissuram invenit, quae hepar findit in lobum dextrum & sinistram CCCXXXVIII. not. e. fere directe retrorsum euntem. Per eam subit vena, & in itinere saepe portione carnea hepatis tamquam ponte protegitur TREW f. 73. p. 42. & *Comm. Nor.* 1733. T. 3. f. 2. ARANTIVS p. 18. aliquando vero duabus, donec ad fissuram hepatis transversam veniat, ibique accedat ad finem sinistram MORGAGN. *Adv.* I. p. 21. rami sinistri venae portarum, quem solent *sinum Portarum* vocare CCCXXXIX. not. e. conf. TREW l. c. f. 1. ad i. i. f. 22. 23. major eo sinu, CHESELDEN *anat. of hum. bod.* T. XXXIV. ut non debuerit pro propagine ejus haberi ab ARANTIO l. c. Cum eo sinu, inflexa, & obvia, & angulo antrosum obverso, ita conjungitur umbilicalis, TREW *Comm. Nor.* 1735. f. 2. ut utcumque dici possit, duos ramos principes edere, quorum alter cavae, alter (nempe sinus) venae portarum inferatur, uti SPIGE-

hit. Neque ea cava nimio sanguine oneratur, non enim omnem sanguinem refert, quem aorta ex corde abduxit in iliacas, sed diminutum ea copia, quam arteriae umbilicales receperunt: ita fit, ut cavae truncus inferior minus recipiat, quam per aortam exiit, & hunc defectum perfecte sup-

LIVS p. 11. *Riolanus not. de motu cord.* p. 123. & *de fetu* p. 377. post *Arantium de fet.* p. 40. cont. *Trew* f. 74. Sed ex toto itinere, etiam ubi hepatica carne tegitur, priusque quam sinum subeat *Cheselden*, l. c. & ad eam inprimis conjunctionem, *Fabric.* f. 17. 18. 19. *Trew* l. c. f. 1. 22. 23. 55 56 numerosissimos ad hepar ramos edit, dictos etiam *Hardero in apiar* n. 8. & ab *Hobokeno* pictos *secund. vitul* f. 27. neque parvos, ut volebat *Bellinger* p. 60. sed tales, quales in iisdem locis adutorum vena portarum edit, male negatos a *TAUVRYO* p. 130. & *NEEDHAMO*, a quibus ramis in fetu tota fere hujus visceris caro conficitur. Cl vero *TREWIVS* p. 44. & *HEBENSTREITVS* in *progr.* nullos ad sinum usque, multos ultra eum ponunt, multisque refutant eos, qui venae umbilicalis ramos aliquos faciunt: sed ea, quae saepe vidi, & nunc video, descripsi. In ea enim aetate vena portarum adeo exigua est, ut se habeat ad venam umbilicalem :: 400. 900 & :: 400. 729. consentiente *Trevvio* p. 45. Horum ramorum hepaticorum venae umbilicalis unus pene e directo hujus venae, magis tamen dexterior *Glisson de hep.* T. A. c. 33. *Heister*

supplet sanguis, qui per venam umbilicalem advenit. Si vero ex quacunque causa fiat, ut sanguinis motus per venam cavam acceleretur, & resistat adeo sanguini, qui per venam umbilicalem advenit, poterit sanguis venae umbilicalis per hepar ^{mm} ire, quoties hepar minus, quam cava, resistit. Quoties autem cavae resistentia minor quam venae portarum & hepatis est, fan-

ster E. N. C. Cent. VI. obs. 27. Trevv f. 1. Comm. 1733. T. 3. f. 2. & paulum sinistrorsum inclinatus est Fabric. f. 20. Glisson l. c. Heister l. c. & Comm. nostr. CCCXXXVIII. not. c. quem non bene penitus e directo trunci euntem pingit Fabricius f. 17. 18. 19. & plerique. Hic ramus fulcum hepatis posteriorem relegit, retrorsum eundo, inter lobulum Spigelii & lobum hepatis sinistrum, nullis, mihi visis, ramis exhibitis, & terminatur vel in trunco Cavae, ut Trevv in omnibus figuris, vel in ramo aliquo Cavae hepatico, ut nunc video.

mm Ductus iste venosus ll. in maximā ratione minor est vena umbilicali, hanc enim reperio lumen habere 900. & alias 729. istum 196. & alias 121. Ad finem vero portarum ratio erat 121. 400. ut recte quartae parti sinus aequalem faciat Ridley obs. anat. pract. p. 200. Ita etiam pingitur in iconibus Heister Comp. f. 12. & in E. N. C. l. c. Trevv p. 40. f. 22. 23. Comm. Nor. 1733. f. 2. & c. male vero potius majorem delineat Fabricius f. VI. aut aequalem T. 7. nimium etiam Palsyn post tr. de

sanguis a vena umbilicali recta via eo venit. Si aequabilis & cavae & hepatis resistencia fuerit, tunc aequalis etiam portio per hepar, & aequalis alia per ductum venosum ad Cavae truncum venit. Et haec omnino causa

monstr. T. IV. f. 1. Exigua adeo pars sanguinis venae umbilicalis per eum ductum naturaliter ad cavam fertur, major autem per ipsum hepar necessario & perpetuo transit, atque ramis hepaticis cavae reformatur: RIDLEY l. c. TREW p. 46. CHESELDEN. Adgnoscat aliquam Cl. TREWIVS de chylosi fetus p. 44! & LEMERY filius, sed non bene minorem vocat *Comm. Paris.* 1739. p. 155. neque mirum est, flatum hepar iungere per venam umbilicalem Diemerbroeckio observante p. 217. Recte adeo umbilicalem venam, magnam hepatis venam vocat Galenus de *form. fet.* & hepar facere addit, esseque radicem venarum, & jecoris parenchyma circa hanc venam adnasci Harvei p. 62. Haec causa est tantae molis, quantam in hepate fetus videmus. Praeter sanguinem enim viscerum chylopoieticorum, sanguinis utique placentae longe maximam partem accipit. Hinc hepar fetui maximum Galen. de *util. part.* L. XV. c. 6. Plater quaeest. *physiol.* p. 254. Diemerbr. p. 227. *Cosmopol.* p. 105. Salzmann de *differ. fet. nat.* p. 35. Verheyen. II. p. 377. Cowper. T. 62. Aldes l. c. p. 547. & ad umbilicum fere descendit, & infra umbilicum in fetu trimestri Rioli p. 411. atque ab altera parte lieni adhaeret D. de Marchettis p. 55. utrumque replet hypochondrium

causa fuisse videtur, quare natura sanguinem venae umbilicalis maluerit in sinum venae portarum, quam immediate in cavam ire. Utcunque fuerit, mediate aut immediate, semper utique sanguis venae umbilicalis redditur cavae.

DCLXXX.

drium *Riolanus* p. 409. totumque pene in junioribus ventrem p. 411. Paulatim autem minuitur ad quintum annum usque *Cowper* l. c. & in adulto margine costarum continetur. An ad augendam bilis copiam? Ita *Trewius* p. 99. sed bilis in fetus vesicula dulcis est, & iners. In aliis animalibus alia vena solito loco, alia cavae super iliacas inseritur *Trew de chylos.* p. 14. Cum duae in homine essent, altera ad venam mesaraicam abiit *Kerkring. obs.* 37.

nn Praeter arterias venasque, ab utero materno ad placentam euntes, aliquibus persuadetur, nervos etiam per funiculum venire ad fetum, tum inter vetustiores, tum *A. Pa-scoli* III. p. 86. Ex nervis vero uteri succum nerveum in placentam deponi *Whar-tonus* credebat, & *Hobokenus repet.* p. 485. & per hanc observationem *Vieussenius* explicat similitudinem fetus cum matre, & alia phaenomena *nov. syst. vas.* p. 68. Non ignoro, nervos in funiculo vaccino demonstratos fuisse *Clemens de funic. umbil.* p. 11. & ego vidi ex hepate cum vena advenientes. Sed ii ad fetum pertinent, in interiori vero facie uteri, quae respondet placentae, nemo facile nervum demonstraverit, quem vasculis exhalantibus minorem esse oportet. Recte adeo

DCLXXX.

Sinum venosum) Ubi hepar cavae venae nectitur, ibi continuo diaphragma cavae adhaeret, eamque ad valvulae modum constringit. Quamprimum vero supra septum venit Cava, jam sinus est amplus ^a, in quem sanguis venae sine pari, venae cavae superioris & venae cavae inferioris effunditur.

Una parte) A superiori vena Cava sanguis omnis in dextrum sinum fertur. Per inferiorem autem adfertur, praeter sanguinem ab universo fetus corpore reducem, sanguis venarum umbilicalium ea copia, quam arteriae umbilicales ex aorta fetus ad placentam avexerant ^b. Nam pone, unico momento temporis omnia quiescere: cum in eo statu arteriae quidem venaque plene sint ^c sanguine suo. Nunc pone cor
inci-

ab utero ad placentam nervos advenire negat GALENUS *de Hipp. & Plat. decr.* L. VI. c. 6. & MANNIGNHAM p. 7. & plerique alii. Umbilicus nullo sensu praeditus est SPIGELIUS p. 8.

^a CXXXV.

^b Et paulo plus, quam avexerunt umbilicales DCLXXIX. Haec ipsa sanguinis portio in primis ad foramen ovale venit *Verheyen lettr. anat.* p. 49. *Croeser de circ. sang. in fet.* p. 16. *Chefelden* apud *Derham* L. IV. c. 7. superioris enim cavae sanguinem tumens isthmus avertit, & ad aurem dextram derivat.

^c Aliquando funiculus ita distensus reperitur, ut etiam ligatura facta haemorrhagiae

incipere moveri, & intra minutum horae v. g. unam sanguinis unciam ex iliacis per arterias ad placentam abductam fuisse: Ita, si venae umbilicales unciam etiam sanguinis ad fetus cavam venam revexerint, fetus utique sanguine aequabiliter plenus manebit, & corpus fetus idem; si vero majorem copiam advexerint, plethora in fetu nascetur, cito lethalis futura. Si minor copia fuerit sanguinis ad fetum redeuntis, syncope succedet ex defectu sanguinis. Superest, ut vena cava in statu secundum naturam tantumdem adferat, quantum aorta & ad corpus fetus, & ad placentam avexerat. Nunc cor in fetu quidem agit^d, pulmo vero

giae periculum vix avertatur MANNINGHAM p. 7.

- d Veteres credebant, cor in fetu quiescere. Recte HARVEIUS, utique agere p. 63. Demonstrat enim punctum saliens, & experimentum in fetubus brutorum ex matre excisis & in aquis natantibus NYMMAN *de fet.* p. 31. pulmonibus eo tempore non motis RIOLAN *resp. ad exp. nov. anat.* p. 195. & *de fetu* p. 391. ubi etiam BELLONII in camelo experimentum citatur, tum FABER *Hernand.* v. 609. Et in ovo anguino serpenti vivo cor pulsavit A. HAFN, II. 465. 10. Ipse denique ARISTOTELES ex pullo didicit, cor in ipsis initiis constituti animalis pulsare *de spiritu* c. 4. Imo plus quam in adulto agit, habet enim appendicem circulationis, placentam, & tamen multo celerius, quam in adultis, partes solidas dilatat, ut velociora faciat incrementa.

ro quiescit^e. Ergo cor dextrum expellit sanguinem, tunc sinus dexter, & auris, sanguine plena, sanguinem suum qua data porta, expellunt. Verum sinus venosi dextri lateri adlidet & adhaeret sinus venae pulmonalis, & membrana, quae utrumque sinum separat, ita resecta est, ut foramen ovale^f inter utrumque sinum medium relinquat.

^e DCLXXXI. not. a.

^f In pariete intergerino posterioris & dextri finis dextri sinus sinusque sinistri dextro pariter & anteriori sine, vestigium leniter cavum est, omnino ovale. Hujus margo plus quam dimidius, superior, eminente tumore carneo cingitur, quem pro tuberculo habuisse videtur *Louvenus* (*Cheseld. T. XXXIV.*) *Vieuassenius islmum* dixit *du coeur & de l'oreille* p. 37. T. IV. f. 1. *Meryus* sphincterem de *circul.* p. 37. 39. f. 4. D. Habet etiam *Trevu* f. 8. k, f. 10, a &c. Fibrae carneaе sunt, in columnas perpendiculares, dextram & sinistram collectae *Rouhault* off. p. 66. *reponse* p. 8. tectae membrana sinus dextri. Infima pars vestigii ovalis levis est, & absque eminente limbo, eademque cum sinus sine inferiori continuatur pari convexo ibi arcu. Ex ea ima parte adscendit adhaerens ibi *Gal.* l. c. membrana tenera, duplex tamen, *Rouhault* off. p. 67. *reponse* p. 9. ut etiam fibrae carneaе mediae inter duas membranas ambulent, *Mery de la circul.* p. 22. *Rouh.* *reponse* p. 9. *offerv.* l. c. *discors* p. 24. quas credit posse constringere valvulae

linquat. In eo foramine pendet membrana
versus pulmones mobilis, fixa versus cavam.
Si nunc in sinistro sinu minor pressio fue-
rit, quam in dextro, tunc cava vena, san-
guine

valvulam p. 25. & *reponse* p. 141. 74.
consentiente *Duverney* 1725. p. 38.
duplici ordine dispositae *Duverney* 1725.
p. 35. Haec membrana in fetu pellucet,
Carcano observante, ac valvularum si-
milis est, & dissimillima fabricae sinuum,
longa satis, ut foramen claudat *Taury*
reflex. p. 16. *Harvei.* l. c. *Duverney*
1725. p. 35. 36. ne *Carcano* quidem
dissimilante apud *Trevvium* p. 10. & con-
firmante *Trevvio* p. 72. ovalis. sed
emarginata *Mery* ic. III. IV. VI VII.
P A L F Y N l. c. Ea totum vestigium
ovale in adulto occupat TREW f. 21
40. 41. tum in fetu si obducta fuerit
TREW f. 60. Oblique ponitur, in ima
parte anterior, in suprema posterior
TREW f. 10. Ea pars suprema, isthmo posterior,
in summa concavo arcui isthmi adhaeret.
Haec est valvula GALENO dicta *de*
utilit. L. XV. c. VI, VIDO p. 288.
ARANTIO *obs.* 33. & *de fetu* p. 38.
HARVEIO *de corde* p. 60. FOLIO f.
1. C. WALAEO *epist.* 1. p. 39. RIO-
LANO contra PECQUETUM p. 192. &
reliquis. Non bene semicircularem fecit
SALZMAN *obs.* p. 13. & satis recte pin-
xit FABRICIUS f. 14. Retractam TRE-
WIUS delineat f. 11. 12. 13. 14. inte-
gram vero f. 10. 20. e (optime), P A L-
F Y N I U S etiam iconem dedit post
monstr. T. IV. f. 2. In fetu ergo foramen
verum

guine plena, tantum sanguinis dabit venae pulmonali, donec resistencia in vena pulmonali

verum reperitur; inter isthmi cavum arcum, summamque partem membranae liberae, ovale, GALENO cognitum, & a BOTALLO non bene depictum f. 2. a & a FABRICIO f. 14. 24. iusto amplius factum, non male a *Laurentio* sculptum l. c. f. 8. tum a SPIGELLO *de form. fet.* c. 12. MERYO ic. 3. 4. 6. 7. sed ubique nimis magnum, & a TREWIO, sed siccando auctum, f. 13. 14. naturale vero f. 20. In superiori adeo parte pendula membrana fluitat GALENUS l. c. RIOLANUS contra PECQUETUM p. 192. Hoc foramen in universum rotundum est, & minuitur, quando liquor a sinistra sede premit, vel extenditur sinus ROUHAULT *reponse* p. 83. augetur, quando a dextra vis urget, aut sibi relinquitur ROUHAULT ib. Quantum video, diameter ejus transversa major $\frac{15}{100}$ polli-

cis est, perpendicularis vero $\frac{13}{100}$ in fetu

adulto. ROUHAULT utramque diametrum duarum linearum facit *reponse* p. 103. Valvulae vero ovalis totius diametros reperio 35. 20. ut non omnino tertiam partem totius vestigii ovalis foramen occupet. Cum enim ellipsis sit aequalis circulo, cujus diameter media proportionalis est inter axes, erunt lumina, in circulum mutata, foraminis & ve.

pulmonali aequae magnae sit, quam in dextra aure, neque quidquam ultra eam quantitatem dabit, adeoque eam portionem, quae copia sanguinis sinus venosi dextri, sanguinis sinus sinistri copiam superavit: Cum enim utraque vena aequae magnae sit ^{f*}, utique inter utramque aequilibrium erit, quando eandem copiam sanguinis receperunt.

& vestigii ovalis : : 1729. 196. quam proxime. An vero in primis initiis fetus multo majus & tertiae parti trunci aortae aequale sit, ut LEMERYVS 1739, p. 147 aut totius, quod enorme, aortae, ut MERY *de la circul.* p. 15. 121. SALZMAN *de fet. circul.* n. IX. in maturo vero fetu minuat, quod etiam ROYHAULT observavit p. 72. & *reponse* p. 18. & MERY *de la circul.* p. 14. & CYPRIANVS apud SYLVESTRE p. 80. ex meis non possum definire. In maturo certe fetu est ad aortae diameter major : : 15. 39.

Porro valvulae ovalis zonam musculosam infra meatum positam, dictam LANCISIO *de corde* p. 76. nunquam vidi, neque unquam ab inferiori parte apertum foramen, aut superius clausum vidi, ut RIDLEY p. 181. 183. f. 1.2. Neque possum cum ullis meis observationibus eas conciliare, per quas persuasus, docet, foramen illud primo in parte inferiori fuisse, inde sensim adscendere. Vide TREWNIUM in omnibus figuris.

^{f*} Conf. not. i.

runt. Quod reliquum est de toto sanguine venae cavae, id in aurem, & cor dextrum fluet 2. Nunc dicendum est, quare minus fan-

g Haec lis nostris temporibus ex celeberrimis est. Nempe *Galenus* equidem vias peculiares fetus probe cognovit, melius *Botallo*, a quo *Galli* foramen ovale nominant, cujus admodum obscura descriptio est opp. p. 66. seqq. *Galenus* adeo & inter antiquiores posteriorum plerorumque de foramine ovali sententia a nostra non diverſa fuit, cum perinde sanguinem a dextro sinu in sinistrum ire senserint. In ductu arterioso differunt, quem sanguinem ferre ajunt ab aorta in pulmones *Fallopianus* in *obs.* *Carcanus* apud C. B. p. 237. *Varolius* p. 108. *A. Laurentius* L. VIII. *Quaest.* 23. *H. Fabricius* P. II. c. 8. *Riolanus* de fetu & notat. de mot. cord. p. 91. *Rup. Besler* obs. anat. p. 19. & reliqui. *Harveius*, uti universam circulationem sanguinis in ordinem redegit, ita in fetu demonstravit, eam, quam *Praeceptor* sequitur, legem de circul. sang. Exerc. I. p. 60. seqq. Recentiores omnes *Harveium* secuti sunt *Pecquet* c. IV. *Highmor* p. 196. *Drelincourt* *Perioche* 40. seqq. *Lowerus* & quidquid fuit recentiorum. Donec *Meryus* circa ann. 1691. consideravit arteriae pulmonalis magnitudinem, qua omnino aortam superat in fetu, apud *du Hamel* p. 356. & *anciens mem. de l'Acad.* Vol. X. p. 60. (cum in adulto arteria pulmonalis potius minor sit *Ridley* p. 194.) & *phoca*, qui fetus vitam vivit *Schelhammer* in *phocae anatome* apud *Valentinum* II. p. 91. Con-

sanguinis sit in vena pulmonali, quam in
cava

Comparavit etiam cor testudinis, & ex utroque argumento novam theoriam deduxit. Vanam aiebat esse *Harveii* opinionem, nam ex ea sequi, ut origo arteriae pulmonales una tertia minor esse debeat origine arteriae aortae, cum una tertia parte minus sanguinis habeat, nempe ea parte, quae per foramen ovale in sinistrum sinum, inhalutato pulmone transit *Comm.* 1699. p. 32. Atqui arteriam pulmonalem etiam altero tanto majorem esse quam aorta 1699. p. 32. *de la circul.* p. 9. 49. Huic argumento fere solonititur, addit tamen directionem venarum pulmonalium directe respondere valvulae ovali *de la circul.* p. 31. 40. 123. & passim etiam sinistrum sinum tertia parte, ventriculum dimidia parte minores esse dextro sinu & ventriculo 1703. p. 505. & *de la circul.* p. 10. 113. 138. 141. *Mem. de l'Acad.* 1703. p. 495. & venas pulmonales simul sumtas minores esse duabus cavis *de la circ.* p. 167. manifesto argumento, sinistram aurem minus sanguinis accipere, contra *Harveium*. Ergo in *anciens memoires* T. X. p. 65. seqq. adfirmavit, contrario modo potius sanguinem transire ex sinistro sinu in dextrum. Valvulam autem unice factam esse, ut paries praesto sit, quo possit in adulto foramen obduci, quod video etiam *Vesalium* in *exam. obs. Fall.* & *C. Hofmannum* dixisse de *thor.* p. 97. & repetit *Winslow* 1717. p. 290. In arteria pulmonali non mutabat *Harveii* sententiam apud du *Hamel* p. 353. *Comm.* 1699. p. 28. seqq. & c. *Academici* apud du *Hamel* l. c. & 1699. p. 33. & apud *D. Sylvestre*

cava. Lumen equidem in utraque vena aequale

vestre p. 2. & *Littrius* maxime *hist.* 1701. in *Meryi* opinionem haud obscure animum inclinabant. Addidit rationibus *Meryanis* *Littrius*, in adulto, cui foramen ovale apertum fuerat, cor dextrum auremque dextram majorem fuisse 1699. p. 47. (sed id in omni corpore, clausissimo foramine ovali, verum est), tubulum denique a parte venae pulmonali latiore fuisse, quod contra *Morgagni* observationes est. Sed contra *Meryum* steterunt *Duverneyus*, & *Tauvry* in propriis thesibus & in toto libello *de la generation*. Inter externos vix quisquam *Meryum* secutus est, & contra eum dixerunt *Verheyenius* in propria epistola & in fine L. II. *anatomes* & *Sylvestre*, & *Buffiere*, uterque in *Progrès de la Medicine* edito Paris. 1698. & *Hartsoecker* in *suite des conj. phys.* p. 122. & *Salzman* de circulo sang. in fetu n. 21. & *Morgagnus* in I. & V. *Adv.* & *Cheselden* in nupera anat. edit. p. 85. seqq. & *Nicholls* comp. anat. p. 48. & III. *Trewius* de differ. vas. nat. & nonnat. p. 57 seqq. & *Lemery* in *Comm.* Paris. 1729. Unicus discipulus MERYI ROUHAULT, pro nova sententia novas protulit rationes in *discours sur la circ. &c.* *Turini* edito, & in *observ.* V. & in responsione ad criticam WINSLOWI recensionem *Turinæ* a. 1728. edita. Nempe pro fundamentis ponit dimensiones dextri cordis minores, easdem, quas MERYUS, ventriculum nempe duplo, finum triplo minorem *response* p. 4. 9. Deinde novo modo adfirmat,

aures

aures & sinus penitus repleri in cordis sya
 stole , tunc enim sanguinem , qui sub o.
 ram ostiorum venosorum descendit, ab ex-
 pansis valvulis venosis in saccos aurium
 trudi, eosque penitus replere *disc.* p. 8.
reponse p. 34. 83. 138. 143. denique
 ventriculū sinistrum triplo fortio-rem esse
rep. p. 10. & saccum ipsum robustiorem
 dextro *offerw.* p. 65. 84. *disc.* p. 30. *res-*
ponse p. 7. Ergo contractum cor utrum-
 que sanguinem in sinus suos projicere *re-*
ponse p. 11. extendere aurem utramque,
 in sinu vero, dum extenditur, foramen o-
 vale aperiri *reponse* p. 39. quod mechanice
 demonstretur, uti vicissim in contracto
 sinu clauditur *repons.* p. 23. *offerw.* p. 89.
 Vincere vero sanguinem sinistri lateris, tum
 ob robur sinus minus extensilis, tum ob
 ventriculi firmitatem triplo majorem *disc.*
 p. 30. *offerw.* p. 68. 83. &c. *reponse* p.
 35. 144. adeoque sanguinem a sinu sinistro
 in dextrum fluere. Et hanc ipsam ratio-
 nem fuisse, quare natura foramen ovale
 fecerit, ne rumperetur nempe sinus sini-
 ster, sed sanguis exeuns ex corde validiori
 effugium haberet: neque adeo compen-
 dium quaesivisse circulationis *reponse* p. 22.
 &c. In ductu vero arterioso duorum ven-
 triculorum robur uniri (HARVEIO
 praeunte *de corde* p. 65.) ad propellen-
 dum aortae sanguinem, quod eum extra
 corpus propellere oporteat *offerw.* p. 73. &c.
 Denique WINSLOWUS in *Comm.* 1717.
 p. 88. seqq. & 1725. p. 41. seqq. & ob-
 sequens WINSLOWO D. NICOLAI *de*
dir. vas. p. 54. 55. „ omnino aurem in
 fetu unicam habendam esse, & sanguinem
 pro

quale est ^h : sed ratio diversitatis in pulmone est, per quem eo tempore non transit quidquam sanguinis, nisi proportionem magnitudinis hujus visceris, decima nempe pars massae sanguineae, si pulmo decimae parti totius corporis aequalis fuerit. Nunc, si pulmo ⁱ decimam tantum partem sanguinis admittit, decimam ergo tantum accipit sinus venae pulmonalis: decuplo ergo minus sanguinis est in eo sinu, quam in dextro. Ergo in sinistrum sinum irruet sanguis venae cavae, ex vi majoris impetus, donec aequilibrium nascatur: & vicissim, si fieri posset, quod fieri nequit, ut major in sinistro sinu sanguinis copia ^k foret, quam in dextro, tunc certe ex sinistro in dextrum sinum sanguis fluere, donec fieret inter utrumque sinum aequilibrium. Ergo iter naturale san-

promiscue a sinistro sinu ad dextrum, a dextro ad sinistrum. tamquam in commune receptaculum confluere docuit.

^h MERYUS & ROUHAULT & ipse WINSLOW dissentient, qui omnes sinistrum & sinum & ventriculum minorem faciunt. Merito, nam deest sinistro cordi sanguis ductus arteriosi, nempe plus, quam dimidia pars sanguinis, quam dexter ventriculus recipit.

ⁱ Conf. DCLXXXI not. *d*.

^k Sed non recipiebat MERYUS, persuasus sanguinem neque in pulmone fetus retardari *de la circul.* p. 136. neque ullibi in corpore *ibid.* p. 126. neque demum sanguinis per vas aliquod fluentis copiam, aut a robore vasis, aut a resistentiis, sed unice a diametro pendere p. 164.

sanguinis est, ex toto fetu, per venam cavam, partim in cor dextrum, partim per foramen ovale in sinum pulmonalem. Haec sola certe consideratio MERYVM¹ convincere

I Primumque moneo, de exigua parte sanguinis unice quaeri, DCLXXXI. not. d. quam multo majoris momenti omnes anatomici fecerunt. Deinde ex descriptione recipio,, valvulam satis magnam esse, quae possit obduci foramini ovali toti, & iter ab uno ad alterum sinum integre intercipere, toto enim foramine major est, *Harveii* p. 60. *Lancis de corde* p. 76. Nunc haec valvula inter duo fluentia sanguinis media ponitur. Quaeritur, cui fluento cedere debeat? Hic pro *Harveio* grave argumentum est, quod profert *Praeceptor*, & olim *Tauvry objections & respons.* p. 70. & *Sylvestre in epistola anat.* Sint duo tubi, medio communicantes canale, aut foramine, procul dubio per foramen irrumpet ejus tubi liquor, in quo fluentum fluit majori inpetu. Sed impossibile est in fetu fluentum esse, aut velocitate majori, aut massa, quam in cava, quae omnem sanguinem habet. Nam etiam ex *Meryi* confessione plus sanguinis in dextro sinu est, per admissam minorem capacitatem sinus. Deinde neque major velocitas sinistri sanguinis est. Nam fetus pulmo non respirat, nihilque adeo differt a viscere quolibet, & in omnibus extremis vasis corporis humani sanguis retardatur per frictiones, auctam diametrum &c. CCXV. eandem ergo in pulmonis minimis vasis tarditatem acquirit, quam in hepatis vasis,

cere potuisset, nisi praejudicata mente
 DUVERNEYVM adspexisset, & du-
 biis ACADEMIAE PARISINAE finem
 inponere, quando inter DUVERNEYVM, &
 chirurgum MERYVM haesitabat. *Por-*

vasis, aut capitis, aut corporis reliqui.
 Nam liquor injectus per pulmonem non
 inflatum aut aequè difficulter, aut diffi-
 cilius ab arteria in venam transit, quam
 in capite, hepate, liene, rene, aut alia
 quacunque parte. *Conf. Tauvry problem.*
anat. p. 34. & CCLX. CCLXI. Ve-
rum sufficit nobis certe sanguinem in pul-
monem non accelerari, neque celerius redi-
re, quam cavae sanguis. Nam in sinu
dextro accessoria celeritas est, cum qua
sanguis ex materno utero ad placentam
advenit, tum ea, quam in placenta ad-
quirat, pressa a diaphragmate materno.
Ergo & massa, & velocitas, in sanguine
sinus dextri majores sunt. Addit Leme-
ryus, haec omnia in teneriore fetu etiam
majora esse, cum enim ibi major sit pla-
centa, etiam quantitatem sanguinis ma-
jorem esse, quae inde ad fetum redeat p.
136. & fatetur Meryus & Rouhault, etiam
majorem esse sinus dextri ad sinistram
rationem, quando fetus tenerior est.

2. Porro cum *Winslowus* 1725. p. 44.
 & perfractè *Meryus* neget valvulam ullam
 adesse in foramine ovali, animadverto,
 supremam oram ejus retro tumentem
 isthmum recondi not. d. *Salzman de fet.*
circ. n. IX. totam denique valvulam, &
magis posteriorem esse Salzman l. c. Syl-
vestre p. 44. Tauvry p. 884. & a parte
pulmonalis sinus latiore Treu p. 72.

Poi

Porta membranacea) Ea situ suo, & falcatis cornubus, & fibris adpositis demonstrat,

Posito adeo fluente a parte dextra, sanguis cunei modo inter isthmum valvulamque se insinuabit, ut aequè sinistrum, quam dextrum ventriculum subeat *Verheyen lettre anat.* p. 32. Si a sinistro vero sinu sanguis advenerit, adprimet valvulam tumenti isthmo, viamque occludet. Id etiam *Galeno de util. part.* L. XV. c. 6. & *Vidio* p. 288. & *Harveio* notum fuit *de corde* p. 61. & in vitulo *Fabro* p. 605. & vidit *Morgagnus adv.* I. p. 23. n. 20. & *Varignon* apud du *Hamel* p. 356. & *Verheyen lettre anat.* p. 28. & *Salzman de circ. sang. in fet.* n. 33. & nuper *Moebius diss.* I. p. 14. & *Cl. Hebenstreit* in *progr. ad anat. mul.* Deinde naturaliter etiam, aperto sinu dextro & libere sustentato, valvulam versus sinum sinistrum depressam reperio. Id vidit *D. Buffiere*, (*lettr. anat.* p. 62.) ut etiam flatum nonnunquam retineat valvula *Lieutaud* p. 375. *TAUVRY* p. 190. *DUVERNEY* 1725. p. 36. *CROESER de trans. per for. ov.* Denique in dilatato sinu valvulam aperturam tegere *WINSLOWUS* fatetur 1725. p. 381. & *ROUHAULT* p. 39. 40. *responsionis.* Non ideo foramen ovale nullum omnino aerem a sinistro latere ad dextrum transmittit, uti neque aliae valvulae omnino iter claudunt: & in eo verus est *MERYUS* apud du *HAMEL* p. 355. & *Academici* apud *MERYUM de la circul.* p. 15. & *DUVERNEY* ib. p. 24. & *MERY* denuo p. 54. & 1703. p. 493. & *VERHEYEN*

strat, facilius ipsam a sinu dextro & sinistro sanguinem dimittere, quam a sinistro
in

l. c. & WINSLOW 1717. p. 286. Male tamen negat MERYUS, membranam eam omnino operire posse foramen ovale, ib. p. 21. quod adeo facile visu est, compresso tantum sinistro, aut demisso, fatente ROUHAULTIO, dextro sinu, neque detracto ut aperiatur. Exsiccationem etiam MERYANAM foramen amplius fecisse & WINSLOWUS fatetur 1725. p. 385. 380. & ROUHAULT *reponse* p. 76. inconstantior idem nam p. 67. foramen per siccitatem etiam minus reddi dixerat. Porro in adulto fossa foraminis ovalis nunquam non depressa est ab ea parte, qua cor dextrum respicit, manifesto argumento, ab ea sede impulsus sanguinis praevalere VERHEYEN L. II. p. 375. Idemque in fetibus vitulinis vidit, foramen ovale diutius a parte dextra apertum manere L. II. p. 375. *Trewius* vero p. 28. f. 42. in homine, tuncque insigniter latius ad venam Cavam, angustius ad pulmonalem esse VERH *lettre anat.* p. 16. idque in vitulis adultioribus adhuc conspici posse p. 25. Sed & MORGAGNUS tubulos, a foramine ovali superstites DCXCI. ita obliquos esse vidit, ut a cava, ubi latiores sunt, ad venam pulmonalem, ubi angustiores, manifesto ducant *Advers. anat.* V. p. 24. f. 4. & TREW p. 73. eandemque MORGAGNIANAE fabricam vidit Cl. WEITBRECHT *act. petr.* IV. p. 264. Sed & chordulas reperiri aliquando addit MORGAGNUS l. c. & *Epist.* XV. n. 46. quae
ad

in dextrum. Sed eadem sequuntur, etiam, quando adiaphora ponitur.

DCLXXXI.

ad anteriorem partem venae pulmonalis valvulam religent, etiam TAUVRYO dictae p. 194. & RIDLEYO p. 181. Veram denique valvulam esse, de qua negat MERYVS, & perinde uti aliae valvulae aliquando in fibras dissolutam MORGAGNUS monet ibidem. Neque non verum est EUSTACHIUM valvulam ita se interponere auri dextrae, venaeque cavae inferiori, ut sanguinis ex vena Cava fluentum magis contra foramen ovale determinetur.

Tertio loco argumentum a pulmonibus petendum est, pariter, puto, demonstrationi simile DCXC. not. a. Ergo per eos pulmones adeo resistentes, sanguis omnis debet transire, ex MERYI systemate, qui per venam cavam rediit in cor, nam, ex ejus theoria, foraminis ovalis sanguis compensat eum, qui per ductum arteriosum abiit. Verum per experimenta CC. not. l. & DCXVIII. in homine sanguinis ea copia transire non potest, nisi respiret, & necesse est retineri in pulmone & congeri, & vasa rumpere.

Inde nunc non solum sequitur, nullum tempus in fetu esse posse, in quo tantum sanguinis in vena pulmonali sit, quantum in cava est, adeoque illam vinci & massa, & celeritate; sed praeterea inprimis apparet, HARVEII systema respondere necessitati naturae, nempe liberare inertem & resistentem pulmonem copia

sanguinis nimia, & noxia futura: MERYANAM vero hypothesein inutiliter pulmonem onerare, cum praeter cavae sanguinem, adhuc sanguinis sinus sinistri partem denuo accipiat per foramen ovale, quem potuisset utique aorta avehere, nullam denique veram rationem dare, quare a sinistris ad dexteris sanguis revehatur. Vide idem objicientem VERHEVENIUM *lettre anat.* p. 34. et LEMERYUM l. c. p. 43. inutilem nempe & absque scopo esse MERYANAM circulationem, neque video, quomodo MERVUS SYLVESTRIO respondeat, qui objicit *nouv. lettr. anat.* p. 6. in adulto necessitatem foraminis ovalis ex MERYI systemate etiam augeri. Sed etiam casus nobis favet. Vidit VIREUS-SENIUS *du coeur* p. 35. fetum, cui nullum foramen ovale erat: ei ventriculus dexter maximus, & arteria & vasa demum pulmonis amplissima fuerunt. Vidit LIEUTAUD in fetu maturo nullam valvulam foraminis ovalis adfuisse, hinc obrutum ventriculum dextrum, & mortem secutam p. 375 manifesto argumento, in illo quidem casu sinum dextrum, cum per foramen ovale se sanguinis portione nulla liberaret, cum corde & pulmonibus obrutum fuisse: in isto hominem fuisse MERYANVM, in quo manifestae fuerint noxae falsi systematis, & sanguinis a sinistro sinu in dextrum irruentis.

Nunc superest ut respondeam objectionibus. Princeps illa MERYANA est, arteriam pulmonalem aorta in fetu majorem esse. Ita non MERVUS solus,
&

& ROUHAULT reperit; sed MORGAGNVS etiam *adv.* l. n. 20. & RIDLEY *obs. anat. pract* p. 189. & TREW l. c. f. 3. 4. 69. Duplam tamen aortae esse, ut MERY apud du HAMEL p. 356. & 1699. p. 32. & VERHEYEN ll. p. 38c. non reperio, uti neque minorem unquam vidi, quod testatur se vidisse BUSSIERE *lettr. anat.* p. 67. & in vitulis demonstrasse se coram Academicis adfirmat TAUVRYS *object. & repons.* p. 71. *reflexions sur les faits* &c. p. 16. & *acad. des Sc.* 1699 p. 33. non fitis repugnante MERYO *de la circul.* p. 139. & ex homine excitat TAUVRYS ib. p. 4. aut aequalem denique utramque arteriam ib. p. 17. Invenio ego rationes diametrorum fere 15. 13. & 13. 10. Lumen autem aortae contra MERYVM p. 120. & ROUHAULT omnino junctis duobus ramis arteriae pulmonalis majus est, nempe :: 1600. 1341. Hoc phaenomenon varie explicaverunt varii: TAUVRYS densiori & resistenti pulmoni tribuebat 1699 p. 33 *object. & repons.* p. 77. & RIDLEY p. 192. SYLVESTRE vero p. 80. & VERHEYEN *lettre* p. 4. & L. ll. p. 419. & BUSSIERE *lettre anat* p. 65. majori celeritati sanguinis per aortam fluentis, & compensantis minorem diametrum hujus arteriae. DIONIS dextro ostio cordis majori tribuit p. 475. LEMERYVS pulmonis compressioni pariter rem acceptam refert, sed quam septum faceret sursum pulsus & thymus incumbens 1739. Ego vero valde miror neminem vidisse, quam facilis solutio sit. Foramen ovale equidem demit aliquid de

sanguine cordis dextri, ut minuatur arteriae pulmonalis diameter. Sed foramen ovale insigniter & enormiter minus est ductu arterioso DCLXXXI. *d.* Hujus autem ductus sanguinem recipit arteria pulmonalis, non recipit aorta. Non mirum adeo pene dimidio majorem esse pulmonalem.

Altera objectio MERYI a sinu & ventriculo sinistro majori, a CHESLE-DENIO recte soluta est l. c. p. 284. Multo plus enim aufert de sanguine sinistri cordis arteriosus ductus, quam addit ille, quem foramen ovale transmittit.

Tertia a testudine ducta, nihil ad nos facit. Huic enim animali fabrica a nostra alienissima est *Buffiere Phil. trans. abr. V. p. 356.*

ROUHAULTII hypothesis enormes subponit positiones v. g. auriculas semper plenas esse, quod manifeste repugnat experimentis dictis ad CLIX. *b.* & a venis repleri quando constringuntur ipsae *reponse p. 138.* & minus accipere a maximis venis, quam a tantilla illa copia, quae potest inter ambitum valvularum venosarum & earum tendineas fibras recipi, neque, dum expanditur valvula, inter eos tendines dilabi. Id jam WINSLOWIUS objecit 1725. p. 397.

Iterum neque id certum est, ventriculum sinistrum fetui adeo aut crassiores esse aut majorem. Ego contrario modo habere reperi, & SPIGELIUS *de form. fet.* c. 12. & RIOLANVS p. 409. & HARVEIUS (in fetu quadrimestri) p. 185. et ME-

DCLXXXI.

Sed ex paritate rationis , pulmo de sanguine cordis dextri recipit tantum eandem decimam massae totius , quae magnitudini pulmonis respondet , reliquum omne, quod accepit ex corde dextro arteria pulmonalis , non potest transmitti per pulmonem ^a , qui compacta massa est , hepatis similis , & continuo fun-

et MERYUS ipse *de la circul.* p. 106. & TAUVRY *reflex.* p. 5. ut etiam post aliquot menses diversitatem non maximam repperim. Neque hic quidquam in fetu est, quod non perinde habeat adultus, monente VERHEYENIO p. 414. contra MERYI opinionem, qui in adulto ventriculos & aures aequales esse credebatur *de circ.* p. 13. 110. cujus adeo sanguis, ex corde sinistro pulsus, perinde ex MERYI opinione diverticulo egeret.

- ^a Pulmo fetus, quam in adulto, multo minor est, DCLXXX. not. f. Deinde, cum aerem nullam recipiat, compacta carne est, ruberque GALEN. *de util. part.* L. XV. c. 6. THRUSTON *de respir.* p. 85. RIDLEY p. 203. & hepatis similis RIOL. p. 409. aut solidior p. 411. & specificè gravior aqua, ne MAZINO quidem repugnante, cujus e re erat pulmoni specificum pondus diminueret. Idem tamen fatetur, perpetuo majus esse, majori ratione in teneriori fetu. (: 450. 434.) sed etiam in maturo satis magna 3002. 2927. (*diff.* VI. p. 67. &c.)

Ergo

fundum petit, in aquam projectus. Sed neque in cor potest redire sanguis, quem arteria

Ergo ab omni tempore notum fuit, pulmonem in homine, qui respiravit, natare. in fetu fundum petere SPIGELIUS *de form. fet.* p. 20 THRUSTON. ALDES p. 547. DRELINCOURT *perioch* 55. MURALT. l. c. p. 427. E. N. C. Dec. I. ann. 6. 7. *obs.* 202. RUY CH *Cat. mus.* p. 171. RIDLEY l. c. p. 180. MOEBIUS *diff.* l. c. BOHN *de infantie.* p. 179. & in canibus BERGER p. 481. E. N. C. Dec. III. ann. 5. 6 *obs.* 256. Et caesareo partu editi catuli, confestim strangulati, pulmones habent fundum petentes BOHN *de offic.* p. 668. Non ignoro ZELLERUM, cujus opusculo careo, & CAMERARIUM *de usu antl. pneum.* p. 21. 22. & scepticum alioquin BOANUM, & ILL. HELSTERUM, nolle ita admittere talem experimenti perpetuitatem, ut legali responsioni sufficiat. Adducunt ergo exempla fetuum maturorum, sed qui nunquam respiraverint, quibus innataverit pulmo DIEMERBROFCK p. 307. maxime si putredo accesserit BRESL 1722. M. OÆ. HELSTER *de fallac. pulm. exper.* p. 21. E. N. C. Vol. 1. *obs.* 188. ERNDL. *It.* p. 90. ALBERTI *de pulm. subsidit.* p. 12. quod non recuso, cum videam integros minutos fetus putredine accedente natare. Addunt, aliorum tetuum, qui vivi editi, & aliquamdiu superstites fuerunt, languidi tamen, pulmones habuisse qui subsiderent

arteria pulmonalis accepit, intercedunt val-
vulae arteriae pulmonalis. Nunc in fetu
arteria

rent SCHUCHMAN E. N.
C. Dec. III. ann. I. obs. 104. HEI-
STER l. c. p. 15. BOHN p. 151. &
de offic. med. p. 664 MAUCHART E. N. C.
Cent. I. obs. 121. & in fetu in cloacam
continuo a partu lapso VALENTINVS,
& ZELLER ibid. In adultis porro ali-
quando pulmones repertos fuisse, qui
fundum petierint, vel post peripneumoniam
& intarctum sanguinis BRESLAV. 1722.
M. oct. p. 465. ALBERTI p. 25. vel a
scirrhis VALENTIN in PANDECT.
MED LEG. KVLIVS T. XXVII. A.
SUBCIC. 1721. p. 124. HEISTER l.
c. n. 8. Et in eodem denique pulmone
aliam particulam innataffe aliam fundum
petiisse E. N. C. Cent. VI. obs. 90. Select.
Francof. II. p. 371. Verum contraria ex-
perimenta reperio: & quidem in fetu
pulmones etiam post summam putredi-
nem, tamen fundum petiisse apud von
HORNE A. SUBC. l. c. & in epist. propr.
ILL. TEICHMEYRUM de mode leg. p.
236. seqq. COMM. NOR. 1736. heb. I.
ipso demum BOHNIO teste p. 175. &
VATERO de signis infant. viv. & mort.
p. 20 Adulterum vero etiam scirrholos
pulmones innataffe MOEBIVS obs. 5.
& perpetuo innatare si vel semel &
paululum aeris infans duxerit SWAM-
MERDAM de respir. Thes. 12 BOHN l.
c. p. 174. de offic. p. 663. CHESELDEN
p. 176. Cont. DCVII. not. 6. ZELLERI
experimenta video L. SCHROECKIO
non

arteria pulmonalis, ubi aortae accumbit, habet canalem ^b intermedium, qui utramque

non penitus placuisse, in morboſis facta vitulis E. N. C. *Dec. III. ann. I. obſ. 104.* Verum ſufficit ad finem meum adverſariorum conſenſus, qui fetus mortui nati pulmones tunc demum natare concedunt, quando ruptis membranis in vagina aerem hauſit HELSTER *de medic. util. in Jurisprud. p. 24. & diſſ. c. p. 23.* ERNDL. l. c. ALBERTI diſſ. c. p. 18. Tale exemplar exſtat apud Cl. Bolten *hamb. bibl. p. 728.* Pulmonem autem fetui ponderoſiorem eſſe, & compactiorem, & minorem, nemo negat.

^b *Ductus arterioſus* pariter notus GALENO l. c. ARANTIO *de fet. p. 39.* BOTALLIO f. 2. FABRICIO l. c. I. c. 10. f. 15. A. LAURENTIO p. 205. f. 1. 2. CARCANO, tener totus, & ſimilior arteriae pulmonalis (venae comparat ROUHAYLT *reponſe p. 13. 64.* & DUVERNEY ib.) continuus eſt in fetu truncus arteriae pulmonalis CHESEIDEN T. 38. TREW f. 57 GLASS *de circul. RIDLEY f. 5.* MEKY *de circ. ic. 1. 2.* qui tamen ductum nimis rectum pingunt. Haec nempe arteris ſuſum, retrorſum, ſiniſtrorſum inclinata, deinde parum mutata directione, magis tamen ſuſum, minus retrorſum, denique pene perfecte retrorſum ad angulum & in fetu & in adulto ſuſum acutum, ita in aortam ſe immittit (TREW f. 23. f. 24. *b.* flexionem vero habet f. 57. tum VERHEYEN L. 11. T. 6. f. 5. & AGRICOLA l. c.) ut perinde a Pulmoni,

que arteriam perforat, ita ut inferior pars canalıs ad pulmonalem arteriam pertineat, superior ad aortam. Adeoque de sanguine arteriae pulmonalis pars ea ad pulmonem feretur, quae respondet magnitudini pulmonis: sed in arteriosum canalem ibit ea tota portio sanguinis, quam non capit collapsus pulmo, & quae majorem in pulmone

nali, uti ab Aorta continua via sit in truncum descendens aortae, ab aorta vero arteria nulla via in arteriam pulmonalem superfit, nisi causa ponatur, quae sanguinem inpediat, ne subeat truncum descendentem, & cogat, ut in pulmonalem arteriam regurgitet. Ramus vero arteriae pulmonalis dexter primus ex trunco oritur, paulo ulterius sinister: quae causa est, cur arteriosum ductum ex sinistro ramo arteriae pulmonalis deducant FABRICIUS fere in icone 25 GARENGEOT *splanchnol.* II. p. 153. KVL-MVS T. XIV. Tres autem ramos arteriae pulmonalis facit SALZMAN *de circ. sang. in fet. n.* 15. & olim C. BARTHOLINVS p. 216. & C. BAVHINVS p. 236. sed isti male ductum arteriosum minorem faciunt reliquis ramis, cum utique ob directionem ductus arteriosi, cum trunco continuam, ramus sinister potius ramus ductus arteriosi dici debeat.

Valvulam ad ductus arteriosi ostium pulmonale dictam CARCANO l. c. & *Comm. Nov.* 1735. T. 1 f. 3. & nuper GARENGEOTO *splanchn.* p. 395. & TREWIO f. 30. 66. refutat HARVEIUS p. 62.

mone, quam in aorta resistantiam invenit, eademque tota in aortam demittetur ^c. Sic pulmo quidem sanguinis minorem in fetu portionem accipit & congruam moli suae, cum in adulto totum sanguinem cavae utriusque, in fetu vero eam copiam habeat, dimi-

p. 62. Alteram in ostio arteriosi ductus aortico ponit *Trew* 2. f. 15 38. 61. p. 67. 28. dictam *Agricolae*, & circuli modo depictam *Comm. lit.* 1735. T. 1. f. 3. Mihi nihil videntur, nisi necessariae plicae, quae in nullo arteriosi rami ostio defunt, neque multum ipse tribuit *Trew* P. 77.

^c Hoc, si quis negaret, facile demonstraretur & diametris valorum. Nam arteria aorta datis magnis ramis habet $\frac{576}{1000}$ ductus

arteriosus 1024. aorta descendens 1225. quae vix major ex corde prodiit *Rouhaute reponse* p. 13. 103. Sed truncum non majorem 576. partibus generare ramos duos, singulum duplo truncu majorem, enorme esset & absque exemplo. Egre- gie vero olim ductum arteriosum alteram aortae radicem vocavit *Harveius* p. 61. Deinde ductus arteriosus manifesto conicus est *Needham c. 5. Nicol.* p. 57. & vidi prope truncum fuisse 43. prope aortam 36. Ex anatome comparata etiam huc pertinet, quod in cornice ex ventriculo dextro via in aortam sit *PEYER obs.* p. 44. loco ductus arteriosi, eademque fabrica in homine visa sit *Ad. L. asu.*

diminutam ^d sanguine, qui per ovale foramen, & sanguine, qui per ductum arteriosum abiit. Sinistrum tamen cor & aorta eandem copiam sanguinis habet. Circulatio vero sanguinis perinde, uti in adulto, aequabilis est. Reliquus etiam sanguinis motus nihil differt, nisi quod sanguinis magna portio ab arteria aorta per umbilicales ad placentam feratur.

DCLXXXII.

ann. 1. bs. no. eoque in corpore arteria pulmonalis minor, quam aorta fuerit.

d Foramen ovale multo minorem, quam sextam partem sanguinis Cavae transmittit. Utraque enim singulatim cava vestigio ovali amplior est, cujus tertia forte pars sanguinem transmittit. duae vero tertiae solidae sunt. Quartae comparat RIDLEY p. 190. tertiam vero partem sanguinis venae cavae inferioris per hoc foramen transmitti credit *Verheyenius* II. p. 415. Verum ego lumen huius inferioris cavae, distentae, reperio 2025. cum lumen distracti patuli foraminis ovalis esset 196. aut paulo ultra. Cavae vero superioris lumen erat 961. ut in eo maturo fetu, minima omnino pars sanguinis per foramen ovale transmissa fuerit. Ductus vero arteriosus majorem quam dimidiam partem sanguinis cordis dextri in sinistra vasa devehit: Omnino enim utrovis ramo pulmonali major est MERY *de la circul.* p. 11. TAUVRY p. 179. & ejus lumen reperi 1600. cum lumina ramorum arteriae

DCLXXXII.

Vasculis) ^a Quorum ne vestigia adsunt, extra graviditatem. Haec vascula uteri mole augentur a primo tempusculo graviditatis, ad ultimum: uterus enim in latum extenditur, & sicut uteri moles increscit, ita etiam vascula in utero distenduntur. Hinc fit, ut uterus, mire crassus in virgine, in femina gravida enormiter auctus volumine, crassitiem ^b tamen eandem conservet: neque enim haec crassities est a novis vasis additis ad priora, neque ab aucto partium solidarum numero, sed in ipsa cavita-

teriae pulmonalis essent 1568. iterumque ductum arteriosum 1849. cum isti essent 1341. *Rouhault* minorem aliquando fuisse alterutro ramo scribit *discors.* p. 6. quod nunquam vidi. *Verheyen* ductum arteriosum dimidiaei parti pulmonalis arteriae comparat L. II. p. 372. conf. *Trew* p. 69, sed major est. Aortae vero vel aequalis est, vel paulo major, uti recte *Mery* p. 50. *Ridley* p. 186. & *Rouhault* *off.* p. 74. *reponse* p. 12. Ergo pulmo in fetu minorem tertiam partem sanguinis totius accipit, quam non facile crediderim excedere $\frac{5}{16}$ totius.

In juniore vero aetate fetus haec portio dicitur major esse, tunc enim & ovale foramen amplius est not. *f.* ad DCLXXX. & ductus arteriosus *Sylvestre* p. 30. ex *Cypriano*. De ea re experimenta propria non habeo.

^a DCLXIV. not. *c.*

^b DCLXXV. not. *n.*

vitae vasorum uteri, quam major liquorum copia distendit. Uti vero uteri pori distenduntur, ita necesse est etiam chorii ^c poros distendi.

Praeparatur). Incredibilis vis humorum est, quae per uterum fertur: verum motus eorum humorum lentus ^d est, & videntur calore, qualis incubationis est, foveri, & mutari. Hi humores sanguis fere sunt, tum chylus, quod apparet, cum is ipse liquor, qui in uterum fluit, etiam ad mammas altero die ^e post partum veniat, ubi chyli simillimus est. Pergunt adeo moveri & mutari humores isti, donec in naturam nutritii humoris, chylo simillimi, mutati fuerint, qui delatus ad internam superficiem uteri, ubi uterus placentae cohaeret, placentae tradatur, iturus ad fetum per venulas, quae in umbilicalem truncum confluunt. Verum auctores fidissimi observatum reliquerunt, chorion, in ea parte, qua placentam non ambit, contiguam esse reliquae parti uteri ^f, pariter a placenta liberae, ut omnino nulla inter uterum concavum & convexum ovum, distantia reliqua sit, & tota superficies ovi totam uteri superficiem undique contingat. Nam, si vel minima aquae portio media interflueret, necesse esset abortum sequi.

Deinde

c DCLXXVI. not. *l*.

d Ob arteriarum laxitatem, & duritatem atque parvitatem venarum DCLXI. not. *a*.

e DCLXXXVI. *ib*.

f DCLXXVI. not. *e*.

Deinde etiam placenta chorio & obducitur, ergo & in ea parte necesse est, per chorion venire ex utero humores omnes, qui a matre ad fetum ibunt. Nunc eo tempore, quo primum concipiebatur, fetus minima particula fuit, quae intra hos novem menses majori ratione increvit, quam fere credi possit: hoc incrementum omne venit ab utero, adeoque per chorion. Manifestum adeo est, chorion membranam esse poris instructam; qui similibus in utero poris ^h respondeant, neque enim aliud machinamentum notum est, quo humores transfundi possint. Non ideo velim docere artificium, quo haec membrana operatur, id enim mihi ignotum est, neque quidquam docent etiam ea microscopia, quae optima sunt: Sed certum est tamen, per chorion succum alibilem ad fetum venire, quocunque demum id fiat modo. Duplex autem per chorion via est, altera in placentam, altera in eam partem ovi, in qua nulla placenta est, diximus enim nullam uteri particulam esse, quam chorion non obducatur intus. Sed neque spatium inter uterum & chorion medium superest, hinc superfetatio, quam adferunt, ut demonstrent chorion alicubi liberum esse, si unquam, rarissime certe contingit ⁱ. Succus ergo pulpaе uteri venit etiam in chorii partem, ubi placenta nulla est, & immediate subest
amnios

g DCLXXVIII. not. *n*.

h DCCLXXVIII. not. *h*. seqq.

i DCXCIV.

amnios ^k. Duplex adeo succus ab utero per chorion transfudat, sanguineus alter, qui

^k Amnios verum & proprium fetus involucrum est, multo chorio firmior, & mediae etiam membranae robur superat. GALENO probe nota fuit *de util. part.* L. XV. c. 4. ex quo THEOPHILUS habet p. 896. Tota pellucet aquosa SPIGEL *de form. fet.* T. V. f. 1. intus levissima, extus ob cellulofam, qua mediae nectitur, subalperea VESALIUS p. 673. ROUHAULT *Mem. de l'Acad.* 1714. p. 187. Sub placenta leviter rugosa est, NOORTWYCK p. 17. ibi vix a reliquis membranis separabilis HOBOKEN *anat. rep.* p. 115. A funiculi externo involucro oritur, a quo ad aliquam ab amnio distantiam secedit DCLXXVI. not. *b.* etiam trium aliquando digitorum HOBOKENO notante, ut, flatu sub involucrum funiculi inmisso, bulla adpareat inter placentam & funiculum. Duplicem esse membranam FABRICIUS auctor est *de form. fet.* P. II. c. 6. & nuper Cl. NOORTWYCK. Sed iste mediam pro amnii lamina accipit. An veras glandulas in brutis habeat, non dixerim. Corpuscula certe albida, copiosa, in superficie interiori amnii vaccini vidit Cl. ALDES apud MANGET p. 547. & N. STENONIS *de gland. & musc.* p. 43. & HOBOKEN *anat. secund. vitul.* p. 58. f. 6. f. 22. f. 38. (etiam in funiculo similes f. 6.); & HARDER *apiar. obs.* 8. & ZELLER *de vita ex funic. pend.* & COWPER ad T. 55. Fistulosas vero appendices in interna super-

qui per placentae corpus ad fetum venit, alter amnii liquor, qui ex utero¹ in chorion, ex

ficie amnii, quae per infinitos poros liquorem fundant, MALPIGHIIUS addit *posth.* p. 47. In homine certe glandulae nondum visae sunt: neque huc trahi debet unicum glandulosum granum amnii humani, semel ab HOBOKENO visum, quod forte grando aliqua morbosa fuit, Lactea vero, aut lymphatica, in amnio vitulino ex suspitione proposita a BARTHOLINO p. 315. tum a MERYO apud la MOTTE *obs.* 24. nemo accuratiorum vidit, & refutat HOBOKEN *anat. rep.* p. 152. Nam etiam rubra vasa in homine non solum parva habet, ut VESALIUS p. 673. ARANTIUS *de fetu* p. 28. SPIGELIUS *de form. fet.* p. 5. sed omnino nulla HOBOKEN *secund. hum.* p. 21, *anat. rep.* p. 118. RUYSCH *epist.* XLIII. p. 10. NOORTWYCK p. 14. Fila tamen sanguinea vidit HOBOKEN *anat. rep.* p. 152. In brutis vasa habet, ut in vacca HOBOKEN l. c. p. 58. f. 3. 10. 13. 22. DRELINCOURT *de amnio* n. 4. HARDER *apiar. obs.* 8. RUYSCH *Thes.* VI. n. 57. Inde nata sunt illa vasa amnii, quae ex umbilicibus dicit oriri HARVEIUS *ex.* 57. GRAAF p. 284. & COWPER ad T. 59. & venae illae, quas inter laminas amnii repere dicit FABRICIUS l. c.

- ¹ De fontibus liquoris amnii omnia obscura sunt. Veteres solebant pro sudore fetus habere. Ita Rufus p. 45. & Galenus *de util. part.* L. XV. c. 5. ubi quasi sudorem vocat,

ex chorio venit in amnion, exsudat in cavitatem ovi, & ea aqua est, in qua medius fetus natat.

Chy-

vocat, tum *Vesalius* p. 674. *Fabricius* L. II. c. 7. *Spigel* p. 5. inter recentiores vero *Mauriceau* p. 220. & *Vieussens* p. 23. Pro urina & sudore *Riolanus* p. 367. 375. Verum huic sententiae nimis repugnat: quod & ante fetum in ovum receptum liquor amnii jam reperiatur, ut ex ovo subventaneo *Malpighius* auctor est *de form. pull. app.* p. 2. & in secundo ovo, sed cui fetus nondum inest visibilis, *Harvei* p. 281. *Graaf* p. 286. quod porro fetus destructo ova humana vacua cum superstitente liquore amnii passim reperiuntur DCLXXV. not. a. quod denique in primis initiis fetus maxima vis liquidi sit, *Harvei* p. 196. & centies major toto corpusculo. Ita in ovo illo PINNAEANO DCLXXV. not. a. enormis aquae copia fuit. In ovo quadagesimo die unciae tres, & quatuor, cum fetus formica non major esset *Riolan.* p. 388. In vitulo undecim drachmarum pondere sesquilibrium humoris amnii reperit *Verheyen* II. p. 362. Tunc vero minuitur, quando fetus grandior est *Harvei* ex. 65. *Graaf* I. c. *Tauvry* p. 149. Ita in vitulo tenero copiosior est, quam urina, in maturo vigesies paucior *Aldes* p. 546. & in cuniculis paulo ante partum pene nullus *Graaf* c. 15. Id autem valde repugnat analogiae. Humor enim pericardii & pectoris & ventriculorum cerebri &c. semper propriam rationem, & multo minorem ob-

Chylum) Liquor amnii nunquam deficit, ergo perpetuo suppeditatur, nunquam fae-
tet

servat ad viscera, ex quibus exhalat. Sed praeterea totus fetus proprio muco oblini-
tam cutem habet, *Vesalio* jam observante
p. 674. & *Arantio* p. 29. tum pro nova
re nomine unctuosi albi pinguis excremen-
ti proposito a *Fabricio* P. I. c. 1, P. II.
c. 7, & *Spigelio* l. c. p. 6. repetito a *Dre-
lincourtio* *Perioch.* 54. *Harveio* p. 514.
Mauriceau p. 468. quem miror ignotum
fuisse Cl. *Gutermanno* *Comm. Nor.* 1731.
hebd. 32. Is mucus huic abundanti secre-
tioni non favet. Qui glandulas amnii
admittunt, non aliam scaturiginem volunt
liquoris, ut *Hoboken anat. secund. vit.* p.
175. *Zeller* l. c. *Keil* p. III. & *Cowper*
ad T. 55. pro parte. A saliva fetus *Li-
sterus* deducit de humor. c. 48. Ex mam-
mis fetus, lacte seroso turgentibus *Bobnius*
p. 29. partem vero derivat inde *Cowper*
in *Introd.* Repugnant, quae contra sudo-
rem dicta sunt. A saliva & narium mu-
co & urina fetus *Drelincourtius* *Perioche*
42. de agnina n. 38. Ex urina denique
Arantius c. 28. & *Carpus* p. CCLXI. b.
sed, praeter perfectam obstructionem u-
rethrae DCLXXXIV. repugnant experimen-
ta., In fetu penis obstructus, ut etiam
faeteret in vesica urina, & tamen multus
liquor amnii la *Motte* L. I. c. 24. Ex
vasis amnii repetit praestantissimus *Mon-
rous*, idque injecta aqua demonstrari cre-
dit *Edimb. Soc.* II. p. 147. tum *Vogli* II.
p. 219. A lymphaticis amnii la *Motte*
obs. 24. vel a gelatina funiculi *Wharton*
p. 246.

per papillas funiculi p. 256. minimas, longitudinem funiculi ambeuntes stillare p. 243. Verum succus colliquamenti etiam ibi reperitur, ubi nulla in funiculo gelatina est. Ex ductibus succiferis funiculi simili fere modo deducit *Munniks* p. 88. nondum certe demonstratis. A chorii glandulis, vasis connexis *Malpigh. postb.* p. 47. 88. Ab utero denique per chorion, in amnion, uti *Præceptor*, repetit la *Courvée* p. 151. *Everardus*, *Tauvryus* p. 156. & *Needham* c. 2. & *Verheyen* L. II. p. 462. Ex cotyledonibus autem, quod in felibus manifestum esse dicit, *N. Stenonis* l. c. Ab utero, transfudatione aliqua, tum ab umbilicalibus etiam arteriis *Graaf* p. 288.

In re dubia respondere difficillimum videtur. Nulla quidem vascula pellucida demonstrantur, quae a chorio, per mediam, in amnion veniant. A vasis amnii separari, perinde conjectura est, & repugnant sacculi colliquamenti liquore pleni, qui in ovis subventaneis reperiuntur, repugnat liquor amnii in ovis humanis vacuis, & proportio demum contraria magnitudi-
ni fetus, et tempora, quibus ovum, ha-
stenus liberum, non a fetu nimis exiguo, sed ab utero, per poros bibulos chorii liquorem traxit omnem, excepta portiu-
cula, quam ab ovario habet. Haec ipsa ratio est, quare omnino inclinem in *Præ-*
ceptoris sententiam, fistulas nempe mini-
mas a chorio in amnion venire, et istas perforatas liquorem exhalare, quem ab utero inprimis habeant. Talia vasa *Rou-*
baultus rubra vidit, pellucida adfuisse nihil repugnat. Pars autem, quam ovum ab ovario adtulit, et a semine muliebri repetit *Riolanus*, p. 288. ea utique exigua est.

tet ^m, ergo semper recens advenit: estque verus nutritius humor, qui a maternis arteriis, per earum propriam fabricam elaboratus recipitur in bibulas fistulas chorii, amnii, in cavum ovi, ut in eo ipso humore fetus natet. Sapor ⁿ ejus blandus, dulcis, subsalsus est; in cochleare igni expositus

m Inde dudum *Cyprianus* conclusit, debere aliquem circulum obire, ne corrumpatur p. 52.

n Subsalsus in vacca *Aldes* p. 547. *Hoboken* p. 711. *Peyer obs.* 31. & pullo *Schrader* p. 180. odore & sapore grato *Everard* p. 159. *Bartholinus* p. 302. subdulcis *Vioussens nov. syst.* p. 22. hydrogalae more, acceptus matribus *Harvei* p. 195. pellucidus *Hobok* p. 71. in maturo vero fetu viscidior *Aldes* l. c. *Monroo* p. 174. *Maitrejean* p. 219: (de colliquamenti liquore), & acrior *Bohn.* p. 31. *Chefelden.* p. 280. glutinosus in fetu humano emarcido, diu in utero retento *Cyprian.* glutinosus denique non raro etiam in abortibus humanis minoribus, toties repiciente *D. Mauriceau & Muralto* p. 623. coll. anat. & gelatinæ similis *Needham.* c. 2. *Gibsonus* autem in maturo fetu tenuiorem & salsum facit *Edimb. soc.* I. p. 200. A spiritu nitri incrassatur & candescit *Langley* p. 166. ab alumine inspissatur *Tauvry* p. 148. in igne non cogitur *Needham* *Tauvry* ib. *Lister de humor* p. 440. *Sbaragli sceps.* ll. p. 415. *Bellinger.* p. 45. Subinde coagula in hoc liquore natant, quae frequentia ait esse *Needham*, rariora, fere adhaerentia

tus concrefcit: lentius tamen, quam albumen ovi, aut sanguinis serum, cui proxime accedit, aut albumini, cum aqua concuffo. Duplex ipfi utilitas eft, continere fetum, & alere o. Fetus omnis, etiam in utero, fi obftetricis digitum preh-

hen-

tia faciei internae, & forte glandulas *Hoboken anat. fec. vit. p. 73. 235.* Mihi omnino in fetu humano amnii liquor fimillimus videtur humoris, qui in pericardio, *Riol. p. 409.* (copiofior *Tauvry p. 153.*) pectore, abdomine *Verbeyen II. p. 379.* fetus, copiofe reperitur. Rubet certe, quem vidi, tenuis eft, exhalat reli-ctis cafeofis ftrigmentis, (quae in brutorum liquore pericardiaco etiam *Cl. Aldes* vidit *p. 548.*) ab alcohole vero adufo albefcit.

o Cogi dixerat *Vieuſſens p. 23.* & *Bohn. p. 28.* ita tamen, ut in maturo fetu minus cogeretur. Sed omnino plerumque non cogitur: uti ex *Ruyſchii* praeparatis ovīs demonstratur: haec enim liquorem amnii continent pelluentem, uti paſſim monet *Theſ. XI. n. 122.* neque mihi ſimilia defunt.

o * An fetus per os alatur, celeberrima quaefitio eft, quam adtigi *DCLXXVIII. not. b.* Ergo hunc ſuccum alibilem eſſe, poſt *Democritum*, qui apud *Plutarchum* legitur docuiſſe, „ fetus per os ali, *Harveius* auctor eſt *exerc. 58.* & per os ſolum, poſt prima initia, quibus per umbilicum alebatur *p. 199.* & in pullo pariter colliquamentum deglutiri: cum prius omnes ſcriptores humores fetus inter

hendere potuerit, fugit & ilico. Infans recens natus, si continuo a morte apertus fuerit, ventriculum plenum habet caseosis & strigmentis, quasi albumine ovi victitasset,

inter excrementa numerassent. Porro huc pertinent *Harveii* experimentis usus, sed ratiocinator *Claudius de la Courvée de nutrit. fet.* l. toto, & *Needham* c. 3. tum *Wharton*, *Diemerbroeck* p. 212. *Bartholinus* p. 315. *Hoboken anat. repet.* p. 444. *vitul.* p. 190. *Graaf* p. 287. 291. *Bohn* p. 31. *Tauvry* p. 165. *Comper introd. Lister* c. 48. (certe deglutiri adfirmat) *Verheyen* ll. p. 362. *Keil* p. 111. *Heister* p. 110. *Trevv de Chylosi fet. & de differ. fet.* p. 110. *Kaauw* n. 1049. *Gibson Edimb. soc.* I. Aliquid etiam subire per os admittit *Cyprian*, p. 47. aliquid autem per cutem recipi *Kaauw* n. 1049. post vetustissimas *Alcmaeonis* conjecturas, & recentiores *Diemerbroeckii* p. 223. & *Vieussenii nov. syst.* p. 24. Ultimis tamen temporibus amnii liquorem inutilem esse & acrem, & per umbilicum solum fetum ali *Harveius*, *Needham*, *Bohnus* & *Gibsonus* concedunt.

p Vide consentientem *Praeceptorum Galeni de util.* L. XV. c. 7. & *Harveium* p. 193. fetum nempe in ipso partu versantem, digitum adprehendere & sugere. Dudum *Hippocrates de carnibus* n. 8. & *Diocles*, carunculas fetum sugere, dixerant, sed rudiori modo, ut crederent cotyledones uteri exfugiri.

q Ex principibus argumentis est. Liquor nempe, qualis in amnio, etiam in ventri-

triculo & intestinis fetuum reperitur, similis colore, sapore, glutinositate, experimentis cum chemicis reagentibus factis. Ita invenerunt *Fabricius* P. I. c. 10. *Harvei* p. 238. 243. *Wharton* p. 247. *Everhard* p. 62. 94. 136. 137. *Needham* c. 3. *Barthol.* ad *Horst* p. 69. *Aldes* p. 547. *Verbeyen* II p. 362. *Brendel de nutr. fet.* n. 11. *Brunner de pancr.* p. 146. *Hoboken secund. vitul.* p. 24. *N. Stenonis Act.* *Hafn.* II. p. 228. *Graaf* p. 287. *Tauvry* p. 150. *Tiling.* de plac p. 135. *Maurocord.* p. 98. *I. M. Hofman* E. N. C. Cent. X. app. obs. 46. *Trew de diff. fet.* p. 110. *Harvei exerc.* 11. & in pullo gallinaceo *Deussing* apud *Maitrejean* p. 116. *Harvei* p. 68. 197. & in infante *Heister de fall. exper.* p. 14. *Murali vadem* p. 425. (qui subacidum, facile coagulabilem fuisse dicit.) Sero lactis vero comparat in damis *Harveius* p. 238. & lacti coacto in avibus *Harvei* p. 68. 69. 197. & *Schrader* p. 179. *Tiling* p. 135. et *Eyssonius* apud *Schook de signatur. fetus* p. 4. lacti denique *Malpighius de form. fet.* p. 11. *Harveius* p. 68. 69. acidumque in ove fuisse lego in E. N. C. Dec. I. obs. 154. & in monstro mortuo nato *Faber* apud *Hernandez* p. 603. Ego, ut plerique, gelatinam rubellam reperio, fila trahentem, qualis humanae amnii liquor est. Neque liquor solum, sed concrectiones pingues similes, & in ventriculo, & in amnio natantes reperit *Aldes* p. 546. *Rudbeck obs.* 9. Demum hunc liquorem amnii continuo ductu per os & fauces & ventriculum congelatum reperit *Trew de chyl. fet.* n. 26. & III. *Heister* not. 37.

Deni-

tasset, intestina vero tenuia massa cibaria & vasa demum lactea: chylo repleta sunt, certissime omnia. Hic, Leidæ, fetus fuit a matre hætenus sana natus, cui mala arte obstetricis, ruptis involucris, abdomen apertum fuit ^t, ut intestina pendula per tenuissimam cutem adparerent, & poterat oculis usurpari motus chyli, ex tenuibus intestinis, per lactea fluentis, cum tamen fetus nihil quidquam alimentorum unquam admisset. Ergo ventriculus, & tenuia intestina, in fetu eodem, quo in adulto, funguntur officio ^u: jussitque hæc organa

DEUS

Denique ipsos pilos cutis vituli, qui certe non potuerunt, nisi per os in colon fetus venire, in crassis reperit intestinis *Aldes* p. 548. & faeces proprias raro casu excretas *Needham* c. V. & *N. Stenonis* l. c. in ave vero stercus proprium in ingluvie *Deusing* p. 373. apud **TILINGIUM**, Vicissim in quinque catulis, ore destitutis, ventriculum inanem reperit **GRAAF** p. 292.

r Puer statim a partu, nullo cibo adsumto vomuit **LANZON** *animadv.* 33. liquorem lacti similem **DIEMERBROECK** p. 224.

s[Ex fetu vasa lactea omnino depinxit **VESLING** c. VIII, T. 2. f. 1. Ductus thoracicus in fetu facile reperitur, sed rubella lymphæ plenus, uti fere in adulto.

t Hujusmodi calamitates **RUYSCHIUS** describit *obs.* 72. 73.

u Cum & scybala præparent **DCLXXXIII**, & chylum.

DEUS affluere ei muneri, cui post nati-
vitatem erant inservitura. Haec materies
alibilis humor est, qui per duas membra-
nas transudat, uti in ovo gallinaceo vitel-
lus albumen omne recipit, itque per amnion
tradit in colliquamenti sacculum. Ergo
fetus ex antiqua HIPPOCRATIS doctrina
nutritur & sanguine, adveniente per venas
umbilicales, & liquore amnii, quem per
os accipit. Ratio duplicis alimenti haec
est. Animal non potest generare *
rubrum sanguinem nisi pulmonis ope, vel
branchiarum, si ex piscium genere fuerit.
Verum pulmo nihil agit in fetu, branchiae
non adsunt. Ergo chylus quidem, &
reliqui humores praeparari possunt, sanguis
praeparari nequit, cum pulmo non ope-
retur. Et tamen fetus nihilo secus, quam adul-
tus homo, verum rubrum sanguinem habet.
Videtur adeo, partem sanguinis, quae in
corpore fetus destituitur, & eget actione
pulmonis, per umbilicales arterias aman-
dari versus uterum & pulmoni materno
reddi, ut ibi fruatur pulmonis effectu v.
Tunc vero de sanguine materno per pla-
centam, & venam umbilicalem, tantum
redire in fetum sanguinis, elaborati in
maternis pulmonibus, quantum sanguinis
in pulmone non elaborati, per arterias ex
fetu in matrem iverat; atque adeo fetum
per venam umbilicalem non proprie nutri-
ri, sed accipere id beneficium, quod san-
guini ex actione pulmonum accedit. Vera
autem

x Posse utique vide, DCLXXVIII. g;

y DCLXXIX, not. aa.

autem nutritio fetus fit humore per os & nares ^z accepto, nam os naresque in fetu eo humore replentur in recens nato, qui in duodeno, bile & pancreatico succo adfulis elaboratur, in vasa lactea fetus recipitur, & per thoracicum ductum, venit in cavam venam fetus, & cor dextrum, inde partim per pulmones, partim per foramen ovale ductumque arteriosum in aortam transit, hinc in omnes arterias venit; & porro

- z Non ignoro, quae contra hanc nutritionem dixit *Monrous*, & simillima demonstrationi credit *Cl. Noortwyck*: & quae passim apud scriptores reperiuntur, qui veterum doctrina renovata humorem amnii nutritium esse negarat, *Mauriceau*, *F. Hoffman* p. 451. *Stahl* p. 51 *F. Bellinger of the nutrition of the fetus* toto libello, *Chefelden*, *Mery in Comm. Reg* 1709. *Gahrliet E. N. C. Dec. II. ann 10. obs. 4.* *Rauhault* 1714. p. 195. *Nenter &c. Nemppe* 1. Liquorem non alibilem esse, cum non sit coagulabilis *Mauriceau* p. 221. & ex ipsis fetus vasis secernatur *Monroo* p. 179. 2. Fetum non posse deglutire, quod os clausum habeat, praevalente robore musculorum temporalium *Monroo* p. 292. & ita in fetu humano reperiri *Noortwyck* p. 16. atque linguam palato adplicatam, & pharyngem clausam, ut nihil liquoris subiret *Monroo* ibi etiam in pullo *Maitrejean* p. 221. qualia etiam habet *D. Bellinger* p. 48. Addi solet absque respiratione nullam in homine deglutitionem esse, neque adeo, etiam aperto ore, descensurum

porro de eo sanguine ex aorta sanguis ineptissimus venit per arterias umbilicales in placen-

furum amnii succum, donec aeris usura libera fuerit *Nenter physiol.* p. 338. *Rouhault* l. c. Hinc pullos fatetur *Monroo* os aperire, deglutire negat p. 219. & testatur se lac in amnion vituli intudisse, nihil tamen in ventriculo reperisse p. 295. 3. Repertos esse fetas absque ore *Cbeselden* p. 279. *Littre Mem. de l'Acad.* 1701. p. 120. conf. DCLXXVII l. acephalos demum, non rarissimo exemplo; & unam canem quinque absque ore catulos genuisse, faecibus tamen alvi non destitutos *Graaf* p. 292. & in agno, cui os inperivium esset, tamen gelatinam in ventriculo, meconium in intestinis, repertum fuisse *Hist. de l'Acad* 1715. *obs* 7. 4. Liquorem, qui in pullorum ventriculis reperitur, mucum esse *Riolanus* p. 410. *Monroo* p. 153. etiam in avibus 1 D. p. 214: diversum ab amnii liquore, hunc enim in amnio viscidum, fuscum, in ventriculo vero pallidum & aliter diversum se reperisse 1 D. p. 182. & *Bellinger* p. 45. qui viscidum semper in ventriculo, tenuem & evaporabilem in amnio sub fines gestationis reperit; & *Gahrlied*, qui acidus dicit esse vomitus, neque rubicundos, ut amnii aqua *E. N. C. Dec. 11. ann. 10. obs.* 4. Ergo malunt humorem amnii secerni a glandulis oris *Mery Mem. de l'Acad.* 1709. p. 21. oesophagi & ventriculi *Bernhardi d. de nutrit. fet.* n. 14. Addi posset, legi exempla, ubi ruptis mem-

placentam , & matris sanguinem, quae tantum boni sanguinis fetus reddit per umbilicales

membranis fetus diu supervixerit. Fetus manum exseruerat, deinde retraxit & ad maturitatem gestatus est L. *Bourgeois* L. II. p. 6. *Hollerius*. E. N. C. Dec. II. ann. 5. *obs.* 13. Abortus ruptis membranis repositus & retentus est, si fides *Bartholino hist.* 57. Cent. IV. Inde videtur sequi, liquorem amnii non esse necessarium alimentum. Credit adeo Cl. *Monrous* vaporem esse, exhalantem ab arteriis amnii, & subinde per venas resorbturn p. 148. qui repleat vacuum amnion, ut fetus mobilis, & tamen a compressionibus externis tutus conserve- tur p. 188. Copiosum esse sub initia fetus, uti in languidis aegris aquae passim congeruntur, quod exhalantibus vasis satis roboris superfit, resorbentia in debilitate fere quiescant, IDEM statuit p. 132. neque adhuc certum esse, ante partum consumi p. 184. Inservire porro dilatando utero, ita ut minus doleat, quam a figurato fetu *Cyprianus* p. 47. & faciliiori gestationi cum minori matris incommodo *Galen* L. XV. c. 5. demum partum faciliorem reddere *Galeno* jam observante *de util part.* L. XV. c. 5. & *Listero* p. 444. & aliis.

Verum ne *Praeceptorem* deseram, multa faciunt. Non coagulari aliquando, in calore tanto, quantus arteriosi uteri incubatio est, non miror. Nam etiam uteri vasa lymphatica in brutis liquorem habent, qui perspirat totus *Malpighius posth.*

cales venas, quantum ab eo deterioris
 cruoris accepit. Et uno verbo chylicatio
 in

posth. p. 46. & fecundi ovi albumen ab incubatione omnino fluidius fit *Gahrlied* l. c. idemque modo concrefcit, modo minime *Monroo* fatente p. 200. Nam hora 330. liquor colliquamenti induratur in fervida *Maitrejean* p. 208. & die 14. *Malp incub.* p. 9. Sed die nono, negat coire hunc liquorem idem p. 181. 181. & negat unquam coire *Bellinus de motu cord.* p. 34. & *Schrader*. Ut omnino inconstantia in experimentis videatur pendere a majori & minori gradu incalescentiae & incipientis quasi putredinis in hoc liquore. Denique ne sanguis quidem in fetu, uti in adulto cogitur, manifesto argumento, etiam alibiles humores in ea aetate tenuiores esse. Porro fetum omnino deglutire certum est, neque diffitetur *Cl. Noortwyck* p. 199. Nam fetus humani os quidem a morte clausum etiam reperio, uti in aliis respirantium cadaveribus frequens est. Sed alii aliter repereunt. Cuniculo 14. dierum *Graaf* p. 312 & trimestri fetui os hiat & labra diducta sunt *Everard* p. 94. *Langley* os apertum 2. mense vidit p. 165. & in mortuis vitulis lingua super maxillas eminet *Stalpart van der Wiel Cent. II. obs.* 32. neque potest os non hiare, cum in fetu humano labra nulla, rictus insignissimus sit *Harvey* p. 239. *Riolan* p. 411. *Kerkring* et *Bianchi* in figuris. In fetu pollicis magnitudine os amplissime fissum *Venette* p. 266. conf. *Gibson I.* p. 182. Verum etiam vi-

in fetu ipso perficitur, sanguificatio vero ex majori parte ope materni pulmonis peragitur.

DCLXXXIII.

vos fetus in amnio hiantes citavi ex *Platero*. Pullus die 7. rostrum aperit *Harvei* p. 62. 197. et undecimo *Schraeder*. Ore aperto lingua exserta natare *Bartholinus* vidit ad *Horstium* p. 69. & *hist.* II. n. 82. *Cornelius Consentinus* p. 260. et alii. Movere demum linguam et deglutire omnino vidit *Schacher de deglut.* p. 15. et liquorem, uti dixi, ex amnio per os, et oesophagum, in ventriculum continuo filo subiisse, frigore constrictum *Trevv* et *Heister*. Ipse demum *Monrous* fatetur in vitulis p. 190. os hiare. Sed hiante ore liquor a pressione atmosphaerae in vacuum determinata omnino absque motu deglutitorio subit in catellorum mortuorum ventriculum, dum os vero clausum est, nullo atmosphaerae pondere subit *Staehelin spec. anat. bot.* 1731. n. 10. Si ergo os apertum est in fetu, et in liquore natat, et liquor copiosus similisque in ventriculo reperitur, et demonstratum est pressu subire, quidni is liquor sit ex amnio? et si ventriculum subit, quid aliud facit, nisi nutrit? Mucum autem ventriculi esse nemo crediderit. Nam in vitulo maturo ad triginta et quadraginta uncias reperit *Aldes* p. 547. super omnem mucum aut exhalantis liquoris proportionem. Deinde omnino tempus fuit, quo fetus vix nisi per os ali potuit: dum nempe vermiculi specie vixit, quem plus quam probabile est, omnium aquatilium anima-

DCLXXXIII.

Faeces) ^a Fetus tertio ^b jam mente in
crassis

animalculorum more, per os alimentum
sumfisse. Iterum dum ovum liberum fuit
neque villos exseruit, credibile est ipsam
lympham ovi fetum aluisse *Drelincourt.*
parerg. de ovis n. 4. *Berger* p. 470 uti
pridem *Galenus* semen muliebri pro pri-
mo fetus alimento habuit *de util.*
part. L. XIV. c. 11 et nuper *Diemerbroeck*
p. 177. Sed maximum etiam analogiae
robur est, quae demonstrat, omnium in-
sectorum et piscium plerorumque fetus de
ea materia unice vivere, quae in ovo est,
cum umbilico destituantur *Rai synopsis*
quadr. p. 48. Denique fetus illi umbilico
nullo, et animalia quibus aut nulla, aut
obcurissima placenta est DCLXXVIII,
not *h.* per os fuisse nutrita necesse est.
Facile tamen crediderim ex ipsa comparata
multitudine liquoris amnii plus in initiis,
minus sub finem per os adsumi, et forte ante
partum mora, atque calore ita acrem reddi,
ut ex causis sit, quae partum irritando
faciunt.

- a Solent vulgo hae faeces adduci inter argu-
menta cibi per os adsumti, eoque sco-
po *Praeceptor* adfert. Verum alii contra
mere a mucos & liquore glandularum ce-
sophagi &c. esse statuunt *Monroe l. c.*
Bernhard de nutrit. n. 14. &c. Nenter
p. 338. Agnum ore inpervio habuisse &
gelatinam in ventriculo & in crassis
meconium *Hist. de l'Acad. 1715. n. 4.*

crassis intestinis faeces habet, eo plures e continuo^d, quo propior nono mense fuerit. Quando prius exstinguitur, quam aerem hauserit, tunc ab ano sursum totum colon intestinum, ejus tres sigmoidicos flexus, caecum, appendicem

Mihi videtur utrumque liquorem concurrere. Fame enim enecta animalia, quibus saliva & bilis, & reliqua adsunt, nullas in intestinis faeces habent. Ita *Graafius* vidit aliquas sed paucas faeces, in catulis absque ore natis p. 292

b Tertio, & quarto mense, stercus flavescens in crassis est *Everard* p. 137. Hoc forte album meconium est, dictum *Aristoteli hist. anim.* L. VII. c. 13. Quarto mense meconium *Harvei* p. 185. In cuniculis die 25. a conceptu stercora in crassis *Everard* p. 137. tum in pullo gallinaceo *Harvei* p. 69. *Tiling* p. 135.

c Recte autem copiosum vocat *Arantius de fetu* p. 37 cum crassa omnia aequaliter, in cylindri speciem, & tenuium non minimam partem repleant, e viridi fusca, mollia, & saponis nigri similia. Amaram fuisse faecem in recens nato, lego in *E. N. C. Dec. I. ann 6. obs. 282.* quod miror, nam bilis ipsa eo tempore insipida est.

d Hinc forte est, quod intestina fetus aliquanto longiora sint *D. de Marchettis* p. 55. *Hirschel de differ. fet* n. 13. septies nempe superant corporis proprii longitudinem *Vesling* c. 8.

dicem e vermiformem, & ilei f ultimam partem plenam habet stercore, quod a nigro colore, consistentia, tenacitate, & pinguitudine peculiari *μικρὸν* dixerat s. *papaverculum*, qua voce latinissimus CELSVS usus

e Veteres solebant intestinum caecum (nempe appendicem), pro quadam apotheca meconii habere, hinc in fetu pro portione grandius dixerunt esse *Varolius* p. 112. *Spigelius* l. c. c. 18. *Marchett.* p. 55. *Molinett.* p. 336. *Bartholin* p. 296. (& cum tempore minui *Everard.* p. 185.), faecibusque repleti *Linden* p. 53. atroque succo *Molinett* l. c. abusi illa nimia amplitudine caeci animalium. Res ipsa modice vera est. Paulo quidem majus est caecum, quam pro adulti corporis portione *Morg. epist.* XIV. n. 39. video enim dimidio ileo aequale esse: absolute vero majus esse, recte negat *Riolanus* p. 387. Alia etiam directione, manifestissime continuat directionem coli, atque ex eo conicum continuatur *Trew. de differ.* f. 77. 78. Sed faecibus distentum nondum vidi. In caeco nullum meconium fuisse (nempe appendicula) *Harvei* p. 185. E. N. C. Dec. II. ann. 4. obs. 115. *Aët. Balb.* 1699. p. 20. Caeterum vide ClX. not. 1.

f In Ileo flavum stercus *Marc.* l. c. *Barthol.* l. c. Verum etiam viride genuinum meconium in ileo & jejunio vidi, & *Drelincourt Periob.* 47. In Ventriculum demum nonnunquam adscendere, demonstrat meconii a partu vomitus *Mauricean obs.* 300.

usus est. Ex hoc phaenomeno certi concludimus, fetum jam tertio mense gestationis chylum digessisse, & ex reliquiis succi nutritii confecisse faeces, quae non abeunt in maternam alvum, & in apotheca propria reconduntur. Inde adeo plena faece appendicula vermiformis fetuum. Neque enim sphincter ani exire finit faeces, quem homo absque aeris adminiculo nequit superare. Eo vero temporis momento, quo fetus prima vice aerem adducit, eodem etiam alvum deponit. Quoties ergo in partu faeces egeruntur, certum est, fetum jam hausisse aerem, & in praesentissimo vitae periculo versari. Nisi enim eo ipso tempore extrahatur, suffocatus est. In utero demum stercus nemo reperit.

Mucum) Fetus totus turget muco. Narium cavitas, & membrana, quam late patet, Schneideri, muco ^h undique replentur. Sa-

g Reperio tamen passim, certe in animalibus, faeces alvi in amnion integram effusas. In suibus *N. Stenonis* l. c. & in apris *Redi lettere Vol. V. p. 172.* In vitulo *Cl. Weiss Comm. Nor. 1735. n. 1740.* In dama *Harvei p. 238.* In ove *Harvei p. 243. E. N. C. Dec. II. ann. I. obs. 154. Graaf p. 287.* In homine denique *Carpus p. CCLVII. CCLXI. b. Harvei p. 198. Petsche obs. anat. n. 9. & L. Bourgeois II. p. 68.* Adeo manifestum videtur, non accuratissime eo tempore sphincterem officio fungi, neque plenam esse necessitatem respirationis.

h Omnino, eumque recens natus ex ore nariumque ejicit rubicundum, spumofum.

Salivam) Adeo copiosa fetui adfluit, ut perpetuo deglutiatur, juvatura *χυλοποιησιν*. Ita pancreaticum ⁱ succum maxima copia secerni probabile videtur. Cum enim in fetu glandulae mesentericae ^k multo, quam in adulto majores sint, & thymus ^l & mammae ^m, quam feminae lactenti magis turgeant; simili ratione major ubique glandularum ^o ad reliquum totum corpus ratio est. Hi humores omnes equidem puri generantur, sed in quiete & stagnatione faeces producant, quae cum purgamentis liquoris amnii efficiunt materiam meconii: huic demum copiosior ^p bilis colorem ex viridi fuscum conciliat.

DCLXXXIV.

i Nam pancreas fetui majus est *Herschel* l. c. p. 36.

k *D. de Marchettis* p. 56. et lacte plenae *Harveii* p. 186.

l Notissimum est, magnum, multilobum, lacte plenum esse *Harveii exerc.* 55. cclvii. not. b. Sed secernere liquorem, quem fetus ore resorbeat, non fuit credere perfecta caecitas hujus glandulae, quae utcumque pressa, nulla directione, aut lacteum succum dimittit, aut prodit ductum excretorium.

n Observante etiam *Harveio* l. c. conf. DCLXXXVII.

o *Lister de humor.* p. 7. Fetui nervi maximi, vasa magna, & viscera, & glandulae, parvi muscoli, & ossa parva. Illis semper eget, his nondum utitur.

p Ita etiam *Trewius*, sed iners est, rubra, viscosa, bilis tota dissimilis *Ettmuller &*

DCLXXXIV.

Majoresque) Etiam sextuplo ^a, pro reliqui corporis ratione.

Aggregati) Quo propior suae origini fetus est, eo magis renes ^b distinctis constant renculis; quo maturior fetus est, eo magis conpinguntur in unam massam hi renculi: *EVSTACHIVS* tamen etiam in adulto corpore, post macerationem, renem in duodecim corpora pyramidalia discerpfit. Verum, si renes fetui & majores sunt, & laxiores, superest ^c, ut plurimam perinde aquam secernant.

Blan-

Wideman. de corpul. nim. Colleg. Amstel.
p. 11. conf. *eccxxxii. a.*

a Majores omnino reperio *Hirschel de diff. fet.* tum in primis capsulas renales, quod etiam *Veslingius* vidit, & *Everard.* p. 265. & *Muralt* p. 426. & *Cowper* T. 63. & in *E. N. C. Dec. I. ann. 6. obs. 202.* & *Morgagn. epist. XX. n. 49.* ut in ea aetate tula renibus paulo minores sint. conf. not. *l* ad *ccclxiv.*

b not. *gg.* ad *ccclii.* & *Spigel. de form. fet.* p. 21. *Harwei* p. 186. *Marchett.* p. 56. *Molinett.* p. 336. *Bidloo* T. *lxiii.* f. 1. *Everard.* p. 265. *Verheyen* L. *ii.* p. 378. T. 6. f. 2. Non solum adeo ad tertium mensem renes lobulosi sunt, ut *Riolanus* p. 410.

c An certum? Magna quidem semper vesica in fetu est, teste *Varolio* p. 113. *Spigelio* l. c. & longior *Heister comp.* p. 112. & conica *Bidloo* l. c. & T. 62. & fere ad umbilicum adscendit *Heister* ib. *Trew Comm.*

Blandae) Urina non olet ^d in sano fetu,
non falsa est, neque amara, & oculo vix
ullum

Comm. 1737. *hebd.* 13. T. I. *de differ.*
f. 47. non tamen ideo triplo major ven-
triculo, ut *Varolius* volebat, & *Riolanus*
p. 410. & nunquam admodum distenta
lotio. Vacuam vidit *Hildanus Cent.* II.
obs. 59 Plenam urina esse dicit in matu-
ro fetu *Everardus* p. 167. sed iste hu-
mano cadavere vix unquam viso. Fetus
recens in lucem editus non continuo min-
git *Bohn* p. 31. & frequens est in illis ho-
muncionibus urinae difficultas E. N. C.
Dec. III. *ann.* III. *obs.* 69. nondum satis
apertis viis.

d Certissimum est, & in renibus, & in vesica
(*Drelin.* *Perioch.* 50. 51. *Aldes* p. 546.)
fetus, urinam naturaliter inspidam & ino-
doram esse, & in recens nato blandam
pariter & aqueam reperiri *Lister* p. 440.
Per morbos aliquando faetet la *Motte* l. c.
24. In brutis animalibus liquor allantoi-
dis pellucidus, subalbus, in cerva dulcis
Stenonis A. Hafn. *ann.* II. *obs.* 227. insipi-
dus *Aldes* p. 547. in vitulo dicitur repe-
riri, neque falsior, quam amnii serum
(*Peyer obs.* 31.) neque urinae similis
Courvee p. 208. hinc in amnii locum
succedere consumto ejus liquore *Courveus*
credidit p. 147. & nutritium esse *Harveius*
& *Rai* p. 95. Sed omnino falsum & urinosum
esse *Hobokenus* testatur *secund. vit.* p. 69.
189. & *Verbeyen* L. II. p. 347. *Vieuiff.* l. c.
p. 22. & in aere turbari *Hoboken* p. 68.
flavumque esse *Galen.* *de diff. vulv.* c. ult.
Causa

ullum dolorem infert instillata. Assiduo fecernitur eadem, nam pelvis semper humore plena est, semper madent papillae.

Respirationis) Nemo, etiam sanissimus, vel urinam absque nixu inspiratorio * excernere potest, vel liberare alvum: requiritur omnino nixus respirationis, ut laxetur urina, nisi partes solidas paralytis, aut morbus aliquis violaverit. Verum fetus quarto * jam mense urinam habet, & pergit secernere quinque consequentibus mensibus, parce quidem, sed assiduo. Neque haec urina in amnion effluit: Ea enim aqua, quae hac membrana continetur f, eo parcius, quo partui fetus

Causa diversae historiae procul dubio in diversa aetate fetus est. Teneriori enim blandior urina, acrior in maturiori esse videtur *Needham* l. c. c. 3. 5. In eo liquore natant coagula peculiaria, crassa, viscosa *Hoboken secund. vit. f. 19. 20. 21. 37. p. 64. anat. repet. p. 474. obs. 31. N. Stenonis l. c. Needham c. 3.*

e Ita etiam *Cl. Hale*. Sed demonstratum est, etiam scybala aliquando in fetu expulsa fuisse *DCLXXXII. not. g.* Urina in urethra constricta gelu, habetur apud *Cl. Bernhardi diss. cit. n. 14.* Et persuasus his rationibus *Cl. Noortwyck* credit, non repugnare, urinam in amnion exire, non repugnante sphinctere p. 197.

e* Quinto reperit *HALE*, sed etiam in teneriori adesse recte credit.

f *DCLXXXII. not. l.* In tenero vitulo liquor allantoidis paucior, quam amnii, uti *Galenus* viderat *de vulv. c. ult.* Mense primo

fetus propior est, urina vero eo majori copia reperitur, quo fetus ad exclusionem magis accedit; & urina nunquam ad ignem cogitur, quod in succo amnii & succedere videmus.

Vesicam) Urachus ^h venit ex vesicae fundo, pergit ad umbilicum, & funiculum

primo humor amnii tres pintas habet, allantoides *chopinam* (nempe tertia, puto, parte minus) *I. Sylvius*. In septimo estri vitulo liquoris amnii libras duas, in allantoide vero libras septem reperit *Faber in Hernand.* p. 613. In maturo vitulo amnii liquor ne vigesima parti liquoris amnii aequalis, cum allantoidis lotium viginti librarum esset *Aldes* p. 546. & quadraginta librarum *Verheyen* l. c. Centuplo majorem in *chorio* (nempe allantoideae) copiam, quam in amnio esse, in ove vidit *HARVEI* p. 333.

g Contraria vide not. o. z. ad DCLXXXII. In allantoide evaporabilis *Aldes* p. 547.

h Urachus in brutis latus, & tener canalis est, omnino cavus *RUFUS* p. 45. *PEYER* l. c. *HOBOKEN* *sec. vit.* p. 90. *NEEDHAM* c. 3. etiam urethra latior *GALEN.* *de util. part.* L. XV. c. 5. & apertus etiam in vitulis *Amst.* p. 11. & in tauris adultis *WEPFER* *F. N. C.* *Dec. I. ann 3. obs.* 167. & arietibus *IB.* Is a fundo vesicae *RUFUS* L. I. p. 44. *HOBOKEN* *secund. vit.* f. 24. 25. *GALEN.* l. & *de form. fet.* per funiculum umbilicalem *HOBOK.* f. 45: venit, investitur amnio *HOBOK.* *secund. vit.* p. 89. & in mediam fere, *ID.* f. 9: 13. longissimam *ID.* c. 3. super amnion ex-

expansam HOBOK. f. 9. 10. 13. cylindricam vesicam, sed inaequalem GRAAF p. 113, HOBOK. f. 10. 13. FABRIC. f. 30. amnii satis similem, paucissimis vasis praeditam HARDER *apiar. obs.* 8. (quae etiam FABRICIUS habet P. I. c. 8.) aut nullis, ut HOBOKENUS c. 3. implantatur, HOBOKEN f. 13. 25. & GALEN. *de form. fet.* c. V. Hanc vesicam allantoideam vocant GAL. ib. & eo urachus urinam omnino advehit GAL. l. c. RUFUS l. c. Neque crediderim solidum urachum esse in canibus, ut EVERARDUS p. 165. aut damis, ut HARVEI p. 238. aut cuniculis, ut EVERARDUS l. c. et p. 62. GRAAF p. 284 aut in universum in monocotyledonibus, ut TAUVRY p. 114. etsi *Harveius* in ove solum & cervo pervium se invenisse dicat p. 278. Nam in cane patulum invenit *Carpus* p. CCLX. & *Moebius obs.* 13. & *Peyer exerc.* p. 197. & nuper ipse in catella duodecimo a partu die apertum reperi, idemque *Peyer* in fele, in cerva vero *Stenonis* l. c. & in turstone ipso *Bartholinus hist.* 25. Cent. II. & in avium pullis *Malpigh. de incub.* p. 10. Uti vicissim cavos illos urachos humanos a *I. Sylvio* inflatos & praeparatos *calum. depuls.* p. 156. *Isagog.* p. 69. ad bruta animalia opinor merito relegari.

Sed in homine simile equidem aliquid uracho ex vesica exit *Trew Comm.* 1737. hebdomadae 13. T. I. *de differ.* f. 47. 70. ex vertice summo, *Trew* ib. *Spigel* T. VII. *Fabricius de form. fet.* f. 23. &c. sed antea *Weitbrecht syndesm.* p. 227. CCCLXVI. not. b. idque cavum esse

esse veteres crediderunt, & *Munnik* p. 87. aut certe destillare lente & guttatim aquam resorbtam, ut *Ridley* l. c. p. 202. & *Hale* l. c. atque urinoso liquore semper turgere, quod *idem* repetit, uti fere *Fabricsius* P. l. c. 7. aut quocunque modo urinam vehere, ut *Hobokenus anat. repet.* p. 470. aut urinam denique per gelatinam funiculi percolari, ut credebat *Diemerbroeck* p. 221. Verum ego omnino continuum urachum reperio, substantiae, qualis vesicae est *Lieutaud.* p. 374. *Trew de differ.* p. 104. & fibris fieri longitudinalibus & sursum in conicam naturam adtenuari *Fabric.* f. 23. *Spigel* T. 7. 8. *Lieut.* p. 374. *Trew de differ.* p. 104. *Schulze de vas. umbil.* p. 16. solidumque esse. Ita *Carpus*, *Arantius* p. 31. *Partus* p. 109. *Paw obs.* 1. 16. 3. *Arnisaetus & Hildanus Epist.* 45. 46. *Needham*, *Riolanus* p. 379. *Faber* apud *Hernandez* p. 616. *Bartholinus hist.* 14. *Cent.* I. *hist.* 25. *Cent.* III. *Molinetti* p. 334. *Salzmanus senior* passim, *D. de Marchett.* p. 52. & apud *Rai Phil. trans abr.* IV. p. 7. *Wagner act. mar. Balth.* 1699. p. 19. *Bartholinus anat. renov.* p. 320. E. N. c. *Dec.* II. *ann.* 7. *obs.* 204. *Manget theatr.* II. p. 97. 98. *Weitbrecht* l. c. ut etiam mercurium ex vesica impulsu refutet *Cl. Hebenstreit progr. ad anat. mul.* aut aquam, etiam ligato pene *Carpus* l. c. *C. Bartholin.* L. l. c. 36. *Harvee* p. 186. *la Courvee* p. 33. *I. von Horns* p. 139. *Mauriceau* p. 229. *Gayant ib.* 218. & E. N. c. *Dec.* I. *ann.* 6. *obs.* 202. *Lieut.* l. c. & *Ruysh.* toties expertus apud *Verheyen* L. II. p. 349. & *Tbes.* VI. n, 83.

lum i, inde deferit vasa reliqua, & centrum petit placentae, ibique inseritur tertiæ

n. 83. Vesicam omnino ligamenti modo sustentat *Paw* l. c. *Arant* l. c. I. *van Mekren* c. 7. *post obs.* *D. de Marchett.* l. c. *Junker tab. phys.* p. 154. *Weitbrecht syndesm.* p. 227. & pro puncto fixo fibrarum vesicae est *ID.* Semel tamen papillam, quae in cavitate vesicae adhaesioni urachi respondet, dictam *Ridley* & *Trewio* f. 48. p. 108. & quae solet farta esse & caeca *Trew* l. c. p. 104. cavam reperiri, uti *Ridley* l. c. medium nempe urachum in receptaculum cavum, pene avellanae capax dilatari, ita tamen, ut ea cavitas cis umbilicum desineret, ut *Ruyschius* vidit l. c. & *Cowper* l. c. & *Saviard* obs. 97. Ita etiam ad umbilicum usque pervium urachum reperit *Hale*, *Tauvry* p. 116. *Bourdon* p. 133. (semel). *Saviard* l. c. *Bianchi de gener.* p. 37. (pro re vulgari), *Cowper* T. LIX. *Heister E.N.C. Cent.* IV. obs. 194. & ad digiti transversii longitudinem *Moebius* l. c. obs. 2. *Ruysch. Thef.* IV. p. 36. *Thef.* V. n. 57. *Thef.* VIII. n. 56. *Cl. Hilscher de gener negot.* p. 27. *Molinet.* p. 337. *Trew Comm. lit.* 1731. sp. 26 & fere similia vidit *Peyer de uracho*, & olim *A. Laurentius* L. VIII. *Quaest.* 17. sed, vereor, ex conjectura.

¶ In funiculo urachum recensuerunt *Rufus* l. c. *Galenus de diff. vulv c. ult.* *Theophilus* L. V. c. 19. *Riolanus* p. 377. & aliqui allantoideae defensores, ut *Higmore* p. 114. *Collins* p. 636. & *Hartjaeker*
Suite

Suite des conj. phys. p. 124. & la Motte p. 297. qui addit breviori inter vasa aequalem esse *obs.* 211. & *Littre Mem. de l'Acad.* 1701. p. 116. Canalis etiam flava materie plenus, a vena & arteriis diversus *Muralti Coll. anat.* p. 686. huc videtur revocari debere. Sed praeter istos viros, in praeparatione sua accuratissimus *Albinus* aliquid nervuli simile vidit, sub involucro umbilici, ad placentam usque continuum *Neufville de allant.* p. 43. Addit *Peyerus*, se in uracho orificium vidisse, quod ad aliquot ab umbilico uncias admitteret setam *obs.* 4. quae sola, ni fallor, aperti supra umbilicum urachi est observatio. Verum ante me *Car. Stephanus* p. 297. *Pareus* p. 109. *Arantius* p. 18. *Drelincourt de uracho* n. I. *Hoboken. anat. rep.* p. 239. 344. *anat. prior.* p. 43. *Gayant l. c.* *Needham c. VII. l. v.* *Horne microc.* p. 139. *Hon. Fabri de homine* p. 181. *Bartholinus* p. 320. *Ruyfch. apud Erndl.* p. 86. *Saviard l. c.* *Manningham* p. 6. *Trew de differ.* p. 105. *Noortwyck* p. 24. *Rouhault* 1714. p. 414. urachum in funiculo non potuerunt reperire: ipseque *Graafius.*, cum allantoidem admitteret, pingeretque, nullam tamen ab ea ad vesicam viam esse fatetur p. 285. & similis est allantoidem adfirmantis *MANGETI* confessio. Ego quidem seiscuncem supra umbilicum progressum, adtenuari, findi, ut *Fabricius l. c.* *Riolanus* p. 378. & membranescere vidi, & in tunicam alterutrius arteriae quasi amitti, *Spigelio* etiam teste l. c. p. 7. & *ROUHULT oss.* p. 39. & *Hobokeno anat. repet.* p. 251.

&

tiae ^k membranae fetus, humanae allantoideae, apothecae lotii, quam solus Britan-

& *Backio de corde* p. 47. *Albini* demum urachum demonstrat *Cl. Noortwyck* potius unum vasorum umbilicalium esse. Deinde nervulus ille urachi similis *Hobokeni anat. repet.* p. 344. aut albicantia corpora *Verheyeni* L. II. p. 244. ad septa pertinent, quae funiculum distinguunt *Noortwyck* p. 22.

k Hanc allantoidem plerique anatomicorum receperunt. Alii quidem simpliciter brutinam fabricam ad hominem transtulerunt, ut peculiarem, et *topicam*, neque circumfusam fetui cavam membranam hoc nomine acciperent, in quam urachus urinam adduceret, & effunderet. Ita *Galenus de util. part.* L. XV. c. 4. *de diss. vulv.* c. 10. *Theophilus* L. V. c. 19. *J. Sylvius Isag.* p. 69 *Vesalius* p. 674. pro fabrica non perpetua, *Spigelius* p. 5. (cum frigidissimis rationibus), *Highmorus* p. 112. & *Mangetus*, qui adfirmat saepe se vidisse, & aquam continere ab amnii aqua diversam l. c. hucque refero reniformem illam sub amnio allantoideam *Graafii* p. 300. etsi alibi *mediam* fetus membranam velle videatur p. 285. Sed & *Munnikius* credit se demonstrasse, in quadrimestri fetu, allantoideam p. 86. non ibi facillimus intellectu. Plures scriptores membranam *mediam* pro allantoidea recensuerunt, ut *C. Gemma* ic. 2. p. 84. *Needham*, *Collins* p. 636. *Hoboken. anat. rep.* p. 434. *Fantonus*, *Bidloo*, *Littre Mem. de l'Acad.* 1701. p. 115.

1702. *obs.* 8. & urinam inter eam & chorion effundi crediderunt *Fantonus*, *Diemerbroeck* p. 215. &c. Alii vero inter chorion & amnion [in loco a placenta libero] *Fallopianus obs.* p. 206. & ex eo, ut solet, *Vidus*, et *Vesalius* p. 674. pro una fabricarum possibilium, & *Plater* p. 163. et *Tauvry* p. 117. aut inter mediam et amnion, ut *Littre* l. c.

Qui ex brutis allantoideam receperunt, facile refutantur viso ovo hominis integro. Ergo allantoideam istam refutant *Eustachius de off. exam.* p. 204. *Arantius* p. 26. *Varolius* p. 113. *Riolanus* p. 367. *Fabricius* P. I. c. 1. P. II. c. 5. [sed is male etiam bovi, equo, porco, cani, feli, denegavit], *Harvei* p. 284. qui & ipse etiam in brutis negare videtur p. 278. tum *Everard* p. 124. et *Heisterus* E. N. C. Cent. 2. *obs.* 190. [contra quos vide *Needhamum* c. 3.] et *Faber* p. 613. & *D. de Marchett.* p. 54. et *Bartholinus* utereque, et *Drelincourt de chorio* n. 24. 25. et *Verheyen* L. II. p. 348. et *Bohn* p. 23. et *Rau* apud *Valent.* II. p. 95. et *Ruyssch Thes.* IV. n. 30. et *Mauriceau* p. 28. et *Ettmuller de exclus. secund.* p. 7. et *Berger* p. 475. et *Pascoli* L. III. p. 86. et *Petsch diff. cit.* et *Heister comp.* p. 170. et *Noortwyck* p. 22. & *Monroo Edimb. soc.* II. p. 219. et *Trew de differ.* p. 105. et *Hilscher* l. c. Istos autem, urinam inter amnion et chorion admittentes, facile redarguit valida, quae passim reperitur, mediae membranae cohaesio cum chorio, cellulosaque interposita *Haleo* observante, et *Monroo* l. c. et *Cl. Noortwyck* p. 22. et amnii pariter chorique (i. mediae)

tannus Cl. HALE ¹ bene ^m descripsit, veteres

accuratus coalitus Varol. l. c. Harvei p. 284. Rouhault 1715, p. 136. atque contiguitas Bohn p. 23. Hobok. secund. vitul. S. II. c. 3. Eustach. l. c. Nullam etiam aut in chorio, aut inter amnion & chorion aquam reperit Faber p. 615. Hoboken anat. prior. p. 38. & olim Arantius p. 28. & Drelincourt de chorio n. 24. 25. ipseque contra hypothefin Diemberbroeck p. 184.

1 Sed Cl. Hale verae vesicae, peculiaris, ovalis f. 3! 2. 1. in Phil. trans. abrigd. IV. P. II. p. 87. sqq. perobscuram & iconem dedit & descriptionem. Dicit amnio teneriorem esse, tegere tantum partem fetus, quae chorion respicit, & poni inter eam partem amnii choriique, quae placentam respicit, angustioris vero esse placenta, (in iconibus), ut tamen in descriptione ajat eam ad oram placentae usque separari posse). Porro cervice quidem sua placentam contingere vult, opposito vertice fetum absque medio corpore urgere f. I. H. Cum amnio ad duas tertias sub vertice conjungi E. cervicem vero urachum admittere f. 2. qui, a funiculi ad urachum conjunctione, non per amnion, sed sub amnio, recto longo itinere f. 2. ad cervicem adrepat. Addit, in tenero abortu allantoideam ovalem se reperisse f. 3. quae distinctam ab amnio vesicam faceret, & similem adducit Tysoni observationem: Sed etiam Keilius allantoideam Halei apud auctorem vidit p. 113. 114. Pro allantoide etiam sen-

teres autem ex brutis fere tradiderunt. In eam nunc cavitatem lotium suum infundit, quod

sentit, sed modeste *Cheselden anat. p. 281.* Cl. *Albinus* denique, sed in tenerissimo fetu 7. septimanarum, invenit vasculum, quod potest pro uracho haberi, insertum in propriam vesiculam ovalem, majorem urinaria, parum distantem a funiculo, inde sinistrorsum latescentem, ab amnio separatam, inter eam & chorion positam, liberam undique, & continua factam firmulaque membrana. Ita *Noortwyck p. 202* qui praeparatam vidit, tum doctiss *Boehmerus de situ uteræ p. 4.* & *Neufville de Allant. p. 43.*

m Satis demonstrat Cl. *Noortwyck* quam parum vel sibi constet, vel nobis profit Cl. *Hale.* Enormis certe urachus in f. 1. 2, toties major arteriis, omnem fidem superat, & repugnat descriptioni, ubi urachum acu textoria non majorem facit: Deinde non satis repetitas observationes habet, sed imprimis unam, in gemellorum factam secundinis, uti luculenta est suspicio Cl. *Noortwyck*., inter amnion & mediam flatum impulsam fuisse: cum alioquin inter has membranas sub placenta, facile, per ipsam macerationem vesicae nascantur p. 189. subeunte in cellulosa telam humore. Ita dudum peculiarem chorii aquam *Harveius* agnovit p. 283. tum *Rolsink de fetu fusc, & Stahl. p. 514. 515.* & *Diemerbroeck* in tenero ovo amnion a chorio separabilem reperit p. 183. *Ruyfchius* vero inter duas chorii lamellas subinde aquas intercipi *Thef. X.*

quod ad matrem redire videtur, neque enim fere acre est. Adtræcta vesicam, videbis

n. 155. *Thes. V. n. 57.* Et *Bohnius* primis mensibus, decimaque septimana in proprio experimento inter chorion & amnion intervallum reperit p. 23. ibique aquam *Schurig sylleps. p. 105.* Inter mediam porro & amnion gelatinam vidit *Littre 1701. p. 110. Rouhault 1714. p. 165.* & inter duas laminas amnii *Borbsstaett de circ. fet. n. 7.* quod eodem redit. Denique, inter amnion, ad funiculum adfurgentem & placentam, intercapedo aliquando est trium digitorum *Hobaken anat. repet. p. 222.* Adeo multae causae sunt ampullarum, quae possunt ab incauto pro allantoide haberi. Cl. vero *Albini* observatio necdum satis repetita, & in tenerrimo corpore, & principe demum circumstantia destituta est, certa nempe urachi in allantoidem insertionem, quae demum, cum continuati ex vesica pervii urachi demonstratione, potest allantoideam extra dubium ponere,

n Ex FERNELIO quidem, „adulto urinam affatim, quasi mingenti“ per umbilicum fluxisse *Schenk obs. L. III. c. de ur. p. 508.* Sed multae hujusmodi historiae passim habentur, et collegit *Hale l. c.* In fetu ad quartum diem urina per umbilicum *E. N. G. Cent. VIII. obs. 35.* Duodecimo die urachum in catella apertum vidi, quod jam monui. Hydropicus sanatus urina ex umbilico erumpente *Benivenius c. 12. Marc. Donatus*

tus

debis urinam in urachum subire. Confirmat hoc urinae iter SCHENKIUS ⁿ duabus, quas adfert, observationibus. Homini adulto abscissus est casu umbilicus, huic ab eo tempore per umbilicum lotium exiit omne, & urethram neglexit. Alius homo vesicae vitio urinam excernere non poterat, ergo natus est tumor circa umbilicum, eoque rupto, per reliquam vitam urina per eam viam, perpetuo effluxit omnis.

Copiosior)

tus p. m. 425. & Hildanus Cent. I. obs. 47. Cent. VI. obs. 58. Urina prope umbilicum in adulto exeuns, quam et ipse pro fistula urachi habet Idem Cent VI. obs. 58. Ex umbilico urina in parturiente Slevogt apud Cl. Hilscher de gener. negot. p. 18. Per venam umbilicalem aliquando exit aqua hydropicorum Varol. p. 106. & Dan. Horstius apud Moebium p. 321. In ancilla ex umbilico ad quatuor pollices producta urina Cabrolus p. 100. cum urethra obstructa esset. In hydropica urachus apertus Moebius phys. p. 361 In ischuria urina per umbilicum E. N.C. Dec. I. ann 3. obs. 208 In adulta urina per umbilicum SIG. KOENIG. In puero decem annorum urina infra umbilicum exiit, argumento urachum pervium fuisse HIGHMORUS p. 115. Mingentium per umbilicum exempla habet D. de MARCHETTIS p. 13. In uracho viri arenulae HARDER apiar. n. 49. Puer per umbilicum mingens YONGE Phil. trans.

n. 323. et alius duodecim annorum LIT-
TRE *mem. de l'acad.* 1701. p. 117. ura-
cho manifeste aperto, tum trigenarius
alius I B. Urachus per quinque transver-
sos digitos apertus in juvene octodecim
annorum, & in urethra calculus I DEM.
In quatuordecim annorum puero urachus
pervius *Verdries E. N. G. Cent. VI.*
obs. 14. In adulto Cl. ALBINUS ura-
chum per duos pollices apertum, & aquam
ex vesica admittentem vidit apud *Neufville*
p. 19. Hominis, qui per umbilicum, &
alterius, qui sub umbilico urinam ederit,
exempla habet CHESELDEN p. 281.
Haemorrhagia cum urinae odore ex um-
bilico *Hist. de l'Acad.* 1727. n. 1.

Verum dudum observavit DIEMER-
BROECK p. 266. haec exempla non id
demonstrare plerumque, quod putatur.
Nam aqua hydropica etiam passim per
ipsam integram cutem sudat, & facilius
omnino per debiliorem sedem umbilici si-
bi viam facit. Deinde potest ulcus vesic-
ae urinam sub umbilico emittere, possunt
ureteres praeter vulgarem naturae ordinem
ibi cuti inserti fuisse. Ita certe in tumore
spongioso ad umbilicum vidit S T A L-
P A R T *Cent.* II. *obs.* 32. & huc forte
pertinent exempla *Breslaviensium* 1726.
M. nov. & Edimburgensium Vol. III. p.
276. & *Phil. trans.* n. 464. & atretae
BARTHOLINIANAE *hist.* 65. *Cent.* I.
quibus omnibus per spongiosam carnem
urina, vel in umbilico erupit, vel pro-
xime. Adulorum denique rara exempla,
quibus urachus apertus fuit, pertinent ad
eas, quas ex fetibus excitavi, cavi urachi
historias. Facile enim crediderim, in
homine

Copiosior) Quando in partu haec allan-
toidis aqua effluit, solent vocare aquas po-
steriores. Nempe chorio & amnio ruptis
exit

homine certe, urachum, semel apertum,
tamquam aliqua vesicae appendix esset,
porro apertum manere.

- o *Harveius* vidit, in media graviditate aquas
erupisse, absque noxa, deinde geminas in
partu aquas p. 293. Has etiam *Ruysebius*
vidit *Thes. X. n. 155.* & vocari *wilde*
Wasser auctor est *Hilscherus* de *impedim.*
partus p. 11. raras autem esse oportet,
cum neget dari *la Motte obs. 347.* Porro
post aquarum multam eruptionem felix
partus successit *Mauriceau obs. 1131* & se-
cunda vice aquae ruptae ante partum
quinque diebus *la Motte obs. 57.* & sex
ante partum diebus *Mauriceau obs. 240.*
402. & septem *obs. 610.* & novem diebus
ante partum *obs. 652.* *Pechlin cent*
I. obs. 29. & quatuordecim *Maur.*
obs. 49. & mense *Gouey* ex versione *Hof-*
manni p. 103. & *Mauriceau obs. 361.* pro
frequente, tum *obs. poster. 37. 85. 94.* *la*
Motte obs. 306. Quatuor, & quinque &
sex septimanis *Cramer Comm. Nor. 1732.*
hebd. 36. & sex septimanis, ad novem
pintas *Mauriceau obs. 19. 148.* & duobus
ante partum mensibus *Pechlin l. c. &*
E. N. C. Dec. 11. ann. 2. obs. 100. *MAURICEAU*
obs. 688. & longe maturius *ID.*
obs. 60. & repetitis vicibus *la MOTTE*
obs. 307. & tertio mense ad duas tresve
libras *SALMUTH Cent. 11. obs. 59.* & se-
cundo conceptus mense *MAURIC. obs. 219.*
Vide *TILING de placent. p. 120.* Prio-

exit aqua amnii, & relaxat viam pro trans-
 ituro infante, qui facillimo partu edetur,
 si continuo hanc aquam infans secutus fuerit:
 quando vero aliquot horis post ruptas aquas
 fetus

res ergo illas aquas solent referre ad li-
 quorem allantoideae, cum absque aquis
 amnii fetum sanum, & tutum vivere posse
 non videatur. Verum haec aqua saepe
 ab hydrope uteri fuit MAURICEAU p.
 178. quod ipsa novem pintarum copia
 demonstrat, multo major ullo liquore hu-
 mani fetus. Alias peculiaris hydatis, aut
 denique aqua minus naturaliter inter
 membranas collecta, conjiciente CRAME-
 RO l. c. pari, ut in hydrocele, vitio po-
 tuit contineri, & inviolata profluere
 amnio. Veras autem aquas fuisse, quae
 per rimam membranarum effluxerint, ut
 MAURICEAU p. 178. *obs.* 361. & *post.*
 94. aut reliquias prioris fetus, ut STUAR-
 TUS *de secund.* p. 66, vix crediderim. In
 priori hypothesei fetum sanum manere dif-
 ficile est, posteriora mala nimis rara sunt.

Sed quid demum sit de urina fetus? an
 remittitur ad matrem, ut MAUROCOR-
 DATUS? cur bruta pleraque conceptacu-
 lum urinae nata sunt, homo nullum?
 Paucam nasci crediderim, cum amplae &
 liberrimae umbilicales arteriae sanguinem
 aortae descendantis pene omnem usurpent.
 Videtur etiam fetus aliquid hic posse,
 quem fetus humanus ab arterioso utero
 patitur, multo major calore uteri mem-
 branacei, & pene exsanguis brutorum.
 Ergo de pauca illa urina & aquea, quae
 in vesicam descendit, pars major forte
 re-

fetus sequitur, tunc via sicca fit, & partus difficilis. Verum in hoc casu saepe subsidio venit alia aqua, quam secundam vocant. Ea ex allantoidea membrana est.

DCLXXXV.

Aucta) Faeces etiam in adulto absque ullo tenesmo paulatim in crassa intestina conferciuntur. Verum in sano homine faeces crassae & putridae reperiuntur, in intestino recto, & colo, & caeco: in ileo nulla unquam inveniuntur. Nunc in fetu, si tanta faecum copia congesta fuerit, ut crassa intestina amplius distendi recusent, neque adeo faeces in ea apotheca recondi queant, tunc ipsum ileon intestinum a distendi incipiet, & faeces non ultra retineri poterunt. Tormina enim nascuntur, quando ileon subeunt, neque enim hujus intestini sensibilitas crassum aliquod corpus ferre potest. Sed neque fetus faecibus se liberare potest prius, quam respiravit. 2. Urina, distenta prius fetus vesica, vix potest tota in allantoideam membranam deponi, neque tamen emingi potest: hic alter stimulus est. Ex hac nunc recti intestini, & vesicae conjuncta irritatione, oritur in adulto homine ineluctabilis convulsio; sed etiam in fetu non poterit non magna molestia nasci;

resorbetur per venas bibulas vesicae not. d. ad cccLxxv. in fetu procul dubio patientiores. In summa necessitate non negaverim aliquid in amnion elabi, sed raro crediderim fieri, cum vesica fetus nunquam distenta reperiatur.

a DCLXXXIII. not. c.

ici. Accedit forte alia aliqua causa ^b huc disposita a creatore, quae fetum urgeat ad aerem capiendum, neque haëtenus explicata

b Partus naturalis causa varie proposita est. Meconium, tormina faciens, hinc fetum magis nitentem *Drelincourtius* habet *Perischo*. 10. & *Fabricius* l. c. P. ll. c. 9. Alii caput inversum & praeponderans, ut *Hippocrates* *περὶ αὐτοῦ φυσίος* n. 37. *Varolius* p. 114. *Bergerus* p. 493. & alii: sed vide not. l. Alii addunt his causis defectum respirationis, ut *Fabricius* l. c. *Bohn*, p. 36. vide not. c. autimenti penuriam *Hipp.* *περὶ αὐτοῦ φυσίος* n. 40. consumto jam amnii liquore *Harvei* p. 264. aut intolerantiam caloris *Diemerbroeck* p. 243. VENETTE, aut taediumimenti VOGLI l. c. Alii pondus fetus auctum, ut FABRICIVS, (praeter priores causas), & magis magisque detrahens placentam nexumque cum matredissolvens HARVEI p. 241. VOGLI ll. p. 182. Hanc sententiam DRELINCOURTIVS refutat, & negat chorion a pondere fetus trahi, & argumento esse, quod rarissime placenta ante fetum excludatur *Per.* 55. 57. & addi potest inferiorem fundum uteri placentam sustentare. Alii accusant convulsionem uteri, a nervis sub finem graviditatis magis, quam prius tensis, irritatisque ex tractione radicum vasorum placentae, tum a circulatione inter matrem fetumque magis inpedita, ut ROUHAULT *offerw.* VI. p. 94 &c. MAZINUS denique, perfecte contra notissimam anatomen, mutationi uteri a sphaera

cata est: Videtur sanguis plus indigere aeris ad digestionem suam, hinc circulationem sanguinis magis impeditam esse. Haec tertia causa-

sphaera breviori in sphaeroides longius minusque capax tribuit *diff. 7. de respir. fet.*

Prima causa irritans procul dubio in ipso fetu est. Nam, etiam in aliis animalibus, fetus suo proprio conatu, in quadrupedibus aliquando HARVEI p. 265. semper in avibus p. 266. & viperis p. 267. atque insectis *ib.* ovum rumpit, & paritur *id.* p. 71. 72. MONROO *Edimb.* li. p. 214. LANGLEY p. 152. li. Molestia vero fetui perpetuo augetur; tum ex faecibus, tum ex ipsa loci angustia, & aquarum decremento, ex quo frequentior oritur ad uterum adfrictus ex ipsa sensibilitate incommodi, quae cum perfectione cerebri incrementa capit. Hinc exempla fetuum vivorum a morte matris editorum *E. N. C. Dec. III. ann. 4. obs. 83. 175.* RIOLAN. p. 398. conf. DCLXIII, aut ex uteri immobilis prolapsu *l. c. & E. N. C. Dec. II. ann. IX. obs. 149.* SAVIARD *obs. p. 83.* Deinde III. procul dubio accedit uteri irritatio a fetu magis inquieto, graviori, robustiori, paucioribus aquis cincto. Videatur enim utero finis aliquis crescendi fixus esse, & dilatationem, in quam supra eum terminum increscens fetus nititur, cum magno incommodo matris fieri. Haec nunc irritatio, primo constrictionem uteri efficit DCLXLV. not. c. quam non excludo, & sentio cum HARVEIO *l. c.* RIOLANO p. 403. BERGERO p. 493. STAHLIO p. 519. Sed iste paulo nimis tribuit utero

causarum est partus ^c, quae ad fetum pertinent. Experimento vero constat fetum in aquis mediis, extensis manibus & pedibus ad ranae modum se movere. Hic motus manifestissime percipitur, sed imprimis in feminis tenerioribus, minus obesis. VESA-

LIVS

utero : tum NENTERUS p. 345. & hujus sectae alii. Proxima denique causa efficiens est inspiratio materna enormiter aucta, qua se ab onere intolerabili vindicat. Hujus robur hic praecipuum est, cum quotidie mortuos fetus elidi videamus, & instinctu caeco fetus parum omnino se adjuvare queat, neque unquam partus naturalis edatur, nisi ex summo nixu. Recte tres causas conjungit VERHEYEN II. p. 384. Ideo HARVEIUS subtiliter, quando partus a fetu expectatur, caput extrahi debere, quando ab utero, praestare pedibus educere p. 267.

- c Non ignoro VESALII et PLATERI alibi citata exempla hiantium in aquis fetuum. Sed eam potius ad desiderium soliti cibi refero, nempe liquoris amnii DCLXXXII. confer quae dicuntur ad DCXC. Unde enim miseris ignotae lucis tam dira cupido? Experimentum facile est. Calcitrant, matri incommodi, a secundo usque mense. Sed motus edunt perpetuo validiores, et non aliquo consilio, aut determinato tempore pari volunt. Verum certo demum mense potius, quam prioribus mensibus, efficaciter matrem ad partum stimulant, quia tunc motitatio et pondus fetus eam propriam ad tolerantiam matricis rationem habent, ut ulterius nequeant ferri.

LIVS Bononiae, Patavii, & Pisis experimenta fecit ^d, exemit ex vivo bruto, v. g. ex porca uterum una cum fetubus, integrum in mensa anatomica explicavit, ita vidit animalcula miris modis se movere, & nixus edere, quos nemo a tantillis bestiolis expectasset. Dissecabat uterum & amnion, continuo respirabant omnia. Res adeo vera est, etsi causa paulum recondita est. CICERO ad MILONEM de lege se ipsum tuendi dicit, eam nos non edoctos esse, sed ab ipsa natura hausisse.

Uteri) Uterus mulieris, neque gravidæ, neque menstruatae, figura turbinata est, & cavitatis figura obtuse conica ^e. In eo statu uterus non multum distat a vaginae ^f initio, sive a pudendis externis. Quando vero mulier utero concepit, adscendit continuo uterus ^g, & removetur a pudendi externo orificio. Hoc primum signum est facti conceptus. Causa mutatae figurae ovum est, quod in uterum descendit, & majus

^d p. 824. ed. 1555.

^e DCLXIII.

^f DCLXXV. not. *n*.

^g In minus resistens abdomen, et magis inter tubas dilatatur, quia ibi sinus copiosiores. Maturo fetu praegnans uterus totum pene abdomen occupat, vide icones SPIGELII *de form. fet.* T. I. ubi nimis regularis pingitur, et BIDLOI T. 54. communicatam a I. B. LAMZWEERDE *hist. molar.* p. 322. et uterus gravidus diaphragma in thoracem urget DESNOVES *lettres* p. 32.

majus nunc, quam ovi cavitas, eum distendit, ut sphaericus fiat. Novimus enim omnem membranam a qualicunque fluido aequaliter undique distentam, sphaericam fieri. Utero nunc eam figuram adepto, etiam os uteri mutationem uteri sequitur, & planius fit, ut nempe in sphaerae superficie jacere possit, neque perinde in vaginam prominet. Quo diutius vero uterus incrementum accipit, eo altius ascendit, quia pelvis angustior est, quam sphaera uteri gravidi, ut ea in pelvi locum non inveniat, sed cogatur ascendere in abdomen, ut superior ipso umbilico fiat.

Vertice) Fetus, quando unicus in utero gestatur, & placenta fundo uteri adhaerescit, ut plerumque fieri solet ^h, sedet in utero pedibus deorsum positus, calcaneo nates feriente ⁱ, genibus ori admotis,

^h DCLXXVI. not. i.

ⁱ Hic situs est, in quo plerumque fetus mortui reperiuntur, & quem pene omnes anatomici describunt: ARISTOTELES *hist. anim.* L. VII. c. 8. HIPPOCRATES *de natura pueri* C. Stephanus L. III. c. 5. Columbus p. 252. (non tamen pro frequentiori), Arantius p. 33. Fabricius P. II. c. 9. Harvey p. 257. Mauriceau p. 233. Bidloo T. 65. Dionis *des accouch.* p. 188. Deventer f. 6. Monroo, Noortwyck T. III. Causa est in ipso musculorum praevalente robore, flexis nempe partibus pene omnibus, quod fere ubique flexores extensoribus robustiores sint. Non ideo perpetuus est, ne in cadavere quidem. Quinto enim mense

tis, spina dorsi incurvata, manibus ori adpositis, quasi sugeret. Primis nunc gestationis mensibus mater hunc fetus situm absque molestia fert, & fetus frontem umbilico matris obponit, genua pectini. Sed caput fetus multo magis crescit, quam partes reliquae, atque adeo centrum gravitatis non in umbilico est, verum multo superius. Nam in recens edito fetu caput fere tertia ^k pars corporis est, in fetu vero secun-

menſe fetum tranſverſum vidit la Motte *obſ.* 55. & duos pingit *Fabricius* f. 6. 8. & citat etiam ſibi viſum *C. Bauhinus* *app. ad Rouſſet.* *Columbus* denique, ſed rariſſime, tranſverſum caput, raro ſurſum elatum, plerumque deorſum poſitum reperit p. 252. Multo minus in vivo certa lex eſt, in quo calcitratio perpetua, etiam tangenti manui demonſtrat, caput modo ſupra modo infra, modo propius pedibus eſſe, modo remotius. Vide contra definitum fetus ſitum *Riolanum* p. 367. *Cowper* ad T. 53. *Drake* L. I. c. 24. de la Motte *obſ.* L. I. c. 23. L. III. c. ult. *Noortwyck* p. 127. In ipſo pullo pariter incertus eſt *Maitrejean* p. 138.

^k *Salzman de diff. fet. n. 4.* In primordiis fetus caput corpore majus *Harveii* p. 56. In fetu pollicis magnitudine caput corpori aequale *Venette* p. 266. In bimeſtri abortu caput thorace & ventre majus *Faber* apud *Hernandez* p. 651. Crescendo fetus, etiam gallinaceus elongatur *Maitrejean* p. 55.

secundi mensis , fere dimidium : Verum etiam pulmo collapsus gravis est. Denique fetus in liberis aquis suspenditur mobilis. Ocyus¹ ergo aut serius , caput pondere suo abreptum cadit, & fetus totus invertitur,

¹ Ita vulgo traditur, fetum circiter septimo mense vel octavo vel nono ineunte *Dionis* p. 188. capite praecipitem se in pelvem dare, ut facies, os sacrum, pedes umbilicum matris respiciant *Sirantius* p. 35. etiam per experimenta p. 33. *Mauriceau* p. 234. *Manningham* p. 10. *Heister. Comp.* p. 111. Vide iconem apud *Spigelium* T. 2. 3. *Fabricium* t. 7. & descriptionem in *E. N. C. Dec. III. ann. III. obs. 123*. Et antiqui vulgo pro causa partus hunc situm adtulerunt. Contra eos vero dixit *Chefeldenius*, & contra inversionem definito tempore partum praecedentem *la Motte* L. I. c. 23. 63. 97. qui adseruit, etiam in partu incertum situm esse, non dissidente *Mauriceau* p. 234. & *van Hoorne vehementer* p. 17. & *D. Onymos in diss. inaug. Leidae habita* 2. 1743. Aliquando enim jani sexto mense fetus in eo situ reperitur *PAW obs. 6. la Motte obs. 53 & citius Idem obs. 55.* & tertio demum *Bianchi* p. 69. f. 17. Cl. vero *Onymos* post *Columbum* et *Venette* p. 275. ex 43. exemplis vigesies & septies situm verticalem reperit, ut omnino non pro situ solum naturali ultimi temporis, sed ex considerato situ fetus, pro penitus & perpetuo naturali habeat l. c. p. 22. Verum certum est, etiam ultimo mense caput fetus in ventre materno tangi, & etiam paulo ante partum

tur, ut faciem ossi sacro ^{1*} obvertat, verticem uteri osculo. Id fit communiter octo, septem, sex septimanis ante partum, aliquando tamen tantum quindecim, aut paucioribus ^m diebus, prouti fetus tenerior fuerit, aut torosior. Una vero abdomen matris, quod hactenus superius tensum fuerat, nunc descendit ⁿ ad subsidentis sacci modum, atque inferius ad pubem prominet. Quando id factum est, tunc
no-

tum facillime dimovetur *I. Siegmundin* p. 22. & in ipso partu p. 145 ut rarum sit, uno, ut *Mauriceau* p. 235. aut duobus integris mensibus fetum in eo situ fuisse, in quo caput in pelvim pendet *L. Bourgeoise* I. p. 213.

1* Nempe partus naturalis est, quando fetus faciem ossi sacro matris obvertit *Mauriceau* p. 206. *Verheyen* II. p. 388. Non rarissime tamen facies anteriora respicit, ut apud *Siegmundin* p. 69. *Mauriceau obs.* 354. [391. 415. & p. 234. & ita natus est *Dux Andegavorum*, filius *Henrici IV. Louise Bourgeoise* II. p. 187. Sed praeter naturam tamen & difficiliter in hoc situ paritur, *Mauriceau* p. 262. & *obs.* 698. et *la Motte* L. II. c. 8. et mavult *Chapman* pedibus extrahere, si faciem eo modo praetulerit p. 32.

m Ita melius *Deventer* p. 55. et *Heister* p. 116. paucis nempe ante partum diebus caput fetus in pelvim illabatur, et ab eo tempore mater vix unquam absque molestia degit. Aliquando paucis ante horis ut *v. Hoorne* l. c.

n *Deventer* l. c.

norunt mulieres, primum stadium ad partum esse. Eadem opera liberantur organa respirationis matris, & diaphragma, minus nunc compressum incipit agere, & omnia viscera versus os pubis urget. Sed ibi haeret crassum pueri caput: idemque pedibus suis recalcitrat, vasaque prope os uteri ea ratione aliter premuntur, arctantur, effluit mucus ^o, inter omnes mucos mucosissimus, ex vesiculis *Nabothi* (l. G. cryptis), qui totam viciniam ita inundat aliquot fere ante partum septimanis, ut lubricam viam paret descensuro fetui. Haec secunda periodus est (l. G. ab hoc enim muco defluente partum haud longe abesse vel feminae norunt p.) Verum quo uterus plenior est sphaeraeque propior, eo adscendit altius, & a vagina, cui in virgine proximus est, vix duobus remotus digitis discedit, inferius interim vix increscit, neque descendit.

Nunc

¶ **DCLXXV.** not. f. maxime ex cryptis uteri, & vaginae sinulis, **DCLXLV.** not. m. tum, forte, ex lacunis urethrae dictis ad **DCLXV.** not. m. Glandulae vero sebaceae alarum, quas excitat ex *Morgagno Praeceptor*, hic parum possunt, ceram enim strigmentosam potius, quam mucum secernunt, quae in plicis partium corporis humani ad dolorificum adstrictum impediendum necessaria est, a muco vero longe differt, solida tenacitate, indole inflammabili, paucitate.

¶ **Cont.** *Mauriceau* p. 212. Addit jam septimo mense os uteri mucosius reddi *Mauriceau* c. 7. Etiam in brutis ante partum mucus den-

Nunc vero uterus omnino descendere cogitur, infans enim capite suo deorsum nititur magis adeo distenditur uterus supra ostium suum, idemque explanatur, quod tertium est ante partum stadium. Nam os uteri non rotundo, sed transverso & rictu hiat, oris humani simili, & intercepto inter conniventia labra. Hujus oris labia nunc magis distenduntur^r, & divergunt,

densior defluit, ut in vaccis vidit *Aldes* p. 547.

q Id naturale est & perpetuum DCLXXV.^o not. *b*.

r Sed distenta sub ultima praegnationis tempora cervice DCLXXV. not. *n*. p. 219. necessario utique retrahitur sursum os uteri, & hiatus non quidem in utraque, sed in transversa tamen diametro augetur: & una, cum contra abdomen surgat, minus utique in vaginam prominet, quod idem vocant adparere brevius & planius *Mauriceau* c. 7. p. 93. 97. &c. *Deventer* c. 15. *Hoorne vvehmutter* p 15. & tenuius *Mauriceau* ib. & pro bono signo habet *Mauriceau obs.* 446. Conf. *Cl. Boebmer de situ uteri* p. 19. Haec mutatio successive fit, & melius est, si sensim sensimque contigerit *Siegmundin* p. 194. Incipit secundo & tertio mense *Deventer* c. 16. quarto mense & quinto *Onymos* p. 9. & eo tempore os uteri non ollescere docet *Mauriceau* p. 93. Sexto & septimo mense hiscere *Deventer* l c. & post sextum mensem *la Motte* c. XI. octavo *Aristoteles hist. anim.* L. VII. c. 4. &

gunt, & apertura nascitur *. Interim fetus agitur tenesmis, quos diximus, & motus edit varios, quos ex VESALIO citavi, magis ergo uterum maternum deorsum promovet, & capite suo in angusta pelvi
ita

Mauriceau p. 123. nono ineunte *Hoorne* p. 17. duobus ultimis mensibus *Riolanus* p. 365. *Siegmundin* l. c. tuncque os altissimum, tenuissimum, planissimum fieri *Hoorne* p. 16. inde semper magis, ut ineunte nono mense etiam obstetrices diversitatem percipiant I. *Siegmundin* p. 24. Duodecim diebus ante partum os uteri unciae latitudine apertum reperit *Mauriceau obs.* 195. & quindecim diebus digiti capax *obs.* 467. Tertia ante partum septimana ad unciam hiare vidit *Ruyssch obs.* 43. & ad tres digitos *Mauriceau obs.* 178. & *post.* 105. Viginti tribus diebus idem unciae latitudine *obs.* 166. et mense ante partum digiti capax *Manningham* p. 10. et pollicis *Mauriceau obs.* 2. Sexto demum septimove mense jam ad aurei magnitudinem aperiri *Deventer* c. 16. Sed etiam constringi aliquando, quando jam aperiri ceperat, *Chapman* vidit *case* I. et *Mauriceau* p. 96. Alias ad partum usque clausum est, et a doloribus demum aperitur *Siegmundin* p. 194. Addit *Harveius*, ostium parturienti molle esse, et molle manere, si aliquid intus in utero manserit p. 196.

- 3 Non ideo continuo partus instat, si uteri osculum ad unciam hiaverit. Ita *Mauriceau* p. 214. et adparet ex not. r. Id autem signum vix fallit, si successive uteri

ita in os uteri nititur, ut capite tangat hinc urinae t vesicam, inde rectum intestinum. Ergo etiam matri tenesmi nascuntur, & nixus ad lumbos, qui per musculos abdominales versus os pubis determinantur u.

Haec

uteri osculum se dilataverit DIONIS *des accouch.* p. 130.

t Hinc ante partum femina urinam vix continet ARISTOTELES l. c. & micturit Mauriceau p. 138. 212. Dionis p. 158-159. & aegre tamen urina se liberat Deventer p. 55. & vesica crassior fit, & minima Littre *Mem. de l'Acad.* 1708. p. 388. atque maxime prope urethram comprimitur Koch *de affect. vesic. rariss.* p. 7. Parsons *of the bladder* p. 18. Aliquando ita valide vesica comprimitur, ut ischuria succedat E. N. C. vol. Dec. VI. obs. 126. la Motte obs. 49. 220. quae fetu digitis repulso solvitur. Inde vesica aliquando enormiter dilatatur, ut octo pintas ceperit EDIMB. SOC. IV. p. 449. & novem chopines, enormem certe molem 36. librarum, ni fallor, la Motte obs. 51. Mortes ex hac retentione urinae vidit Chapman *improv. of midwifry case* 40. Vicissim autem plena vesica resistit partui, & ab urgente capite fetus rumpi visa est Parsons p. 21. Pinaeus p. 95. la Motte obs. 49. Remedium est, si femina decubuerit, aut in majori malo chirurgus digito uteri fundum repulerit Dionis l. c.

u Ea nota Slewogt *de dolor part. spur.* p. 8. & quod os uteri per hos nixus dilatetur Siegmundin p. 196. Deventer p. 60. van

Haec nunc est *odurn*, non verus dolor, saepe enim interrogavi, semper responderunt non dolorem esse, sed tenesnum. Is est intolerabilis conatus: qualem fere viri in se ipsis experiuntur, quando durissima, & maxima scybala conantur egerere: tantus certe aliquando, maxime in hypochondriacis, ut sanguinem ex naribus expresse-rit, aut ruptis demum vasis apoplexiam produxerit. Hi tenesmi semper ad lumbos incipiunt, inde progrediuntur ad umbilicum, hinc ad os pubis, & muscoli abdominis ita indurescunt, ut a ligno parum differant. Nam ubi ii muscoli oriuntur, qui nunc maxime convelluntur, ibi etiam dolor est. Haec ipsa nota, quod muscoli abdominis durescant, dolores ad partum separat ab iliatis & hysteriacis doloribus. Sed hi muscoli oriuntur ab ossibus pubis & ilium, & caput fetus etiam pergit urgere antrosum, uterus adeo traditur in pelvim, neque enim alius fetui exitus est. Superius enim, posterius, & inferius ossa resistunt. Porro convulsiones eo magis augentur, quo magis uterus in angustam pelvim protruditur, dum tota sphaera sequi nequit. Hoc nunc stadium est, in quo *nativitas* nasci incipit, quam dicimus nasci, quando digi-
tus

Hoorne Wehmutter p. 35. 38. mucusque adpareat, & aquae augeantur la MORTTE L. II. c. 13. dignoscuntur ab inutilibus illis doloribus, quos vocant *spurios*, & os uteri observantur potius claudere *Dewenter* l. c. *Hoorne* l. c. *Siegmundin* ib. & p. 5.

tus obstetricis, vaginae inmissus, os uteri sentit explanari, & longiorem fieri fissuram. Sed nunc quartum stadium sequitur, nixus increscunt, os uteri dilatatur, & aqua amnii deorsum truditur, atque ante caput fetus pellicula tangitur, quae aquam ^{u*} continet. Hoc quintum stadium est. Quando vas plicabile aqua plenum, & corporibus in aqua natantibus solidis, urgetur undique, utique aqua eo ibit, ubi minor resistentia opponitur, non ideo corpora, quae in aqua natant. Ergo ovi pressio omnis determinatur versus uteri rimam, & istud cogit prominere, atque labia adtenuat, quae ipsa tenuitas signum est instantis partus. Eminent interim saccus iste aqua plenus ^x, & premitur extrorsum versus os uteri, & pila aquis plena magis & magis increscit, & digitis tangitur, hoc vocant *aquas formari*. Tunc porro nititur caput in locum, quem aquae fecerunt, augentur dolores, & uterus magis premitur, sic aqua amnii, tanquam vesicam distenderet, & aequabiliter dilatat os uteri, & haec optima machina ^{x*} naturae est, quam male lacerant ^y ignarae &

^{u*} Certum signum partus instantis est ostium uteri dilatatum, & aquae per hoc ostium eminentes *Mauriceau* p. 238. & molles membranae p. 213.

^x A doloribus membranae repletae durescunt, remittente dolore mollescunt, ut caput tangas *I. Siegmundin* p. 27.

^{x*} HOORNE p. 48.

^y MAURICEAU p. 241. nisi situs fetus contra naturam fuerit, aut membranae

& temerariae obstetrices : ita enim effluunt aquae, saccusque concidit ; Quamdiu vero integer est, os uteri aequabiliter distenditur undique ab urgente liquido, absque dolore, quia omnes partes dilatandi osculi aequabiliter urgentur, atque adeo nulla violente premitur : rupto vero sacco a fetu ipso uterus inaequaliter comprimitur. Solidum enim omne inaequaliter premit, plus in una sede, minus in altera, pro figurae suae varietate, sic, dum una pars quiescit, altera totam vim nitentis solidi experitur. Haec certe artium pessima, multas matres, fetusque multos occidit, quamprimum nempe sentiunt rimam uteri se aperientis, rumpunt bullam & aquas emittunt. Si nunc neque obstetrix nimis festinaverit, neque mater, caput fetus subit os uteri, & pelvis dilatatur, tunc convulsa mater y* edit nixum, majorem prioribus, tam validum, ut muscoli abdominis ad asseris modum durescant, & una plurimum aerem inspirat diuque retinet, tandem summa compressione pectoris diaphragma deorsum in abdomen premit, ut ovum uno excidat inpetu. Hi nixus nunc non sequuntur, si
ovi

nimis fortes. Sed omnino vetat la MOTTE fere in omni casu *obs.* 167. 57. & nihil metuit, quamdiu aquae integrae adsunt ib. Male adeo lacerare jubet GOUEY, & hunc partum, quando pedibus extrahitur fetus ab obstetrice, pro naturali habet p. 105.

y* Signum partus certum tremor febrili similis DIONIS p. 204.

ovi ruptura accelerata fuerit. Tunc enim fetus solo suo nixu proprii corporis os uteri dilatare debet. Vel etiam dum ovum fetu gravidum exsilit, & os uteri dilatatur, eodem tempore rumpitur aqua, & cum fetu effluit: etiam id bonum est, malum autem, quando aqua diu ante partum effluit, & fetus per sicca y** loca cogitur transire, & fetus figuratus debet transire specie solidi, qui prius sub fluidi specie transibat, neque membra fetus æquabiliter aut premunt, aut premuntur. Quem vero descripsi partus integri z ovi, is maxime naturalis est, tuncque amnion, chorion, & placenta, una

y** Amnii liquor inservit utero absque dolore distento CYPRIAN p. 47. & mucus naturalis omnibus oleosis præstat MAN-
NINGHAM p. 37. Humores partum
faciliorem reddunt GALEN *de util. L.*
XV. c. 5. Partus sicci periculosi *Mauri-*
ceau p. 268. 349. *Siegmundin* p. 128.
E. N. C. *Dec. ll. ann. ll. n. 91.* & lenti
Hoorne p. 48. uti vulgo notum est: hinc
etiam noxia & periculosa nimis præcox
ruptura aquarum *Motte obs.* 57.
Siegmundin p. 65. ante ostii aper-
turam *Harvei* p. 196. Aquæ ante
partum male habent feminas gravidas
Hipp. coac. L. Ill. c. 3. n. 1. & *Dure-*
tus ib.

z Bruta animalia ita pariunt HARVEL p. 265.
& ipsæ viperæ BALDO teste, & feminae
aliquando HARV. *ib.* eumque partum pro
naturali habet IDEM p. 196. Exempla
etiam producit T. BARTHOLINVS
epist.

una prolabuntur. Hujusmodi partum credibile est EVAE contigisse, idemque communis est tot gentibus indis, quibus absque ulla arte obstetricia sanissime parere familiar²² est. In eo casu ars non potest, nisi nocere. Proximus naturali, & vulgarissimus

epist. 2. Cent. IV. & STALPART van der WIEL C. II. obs. 32. REIES. RUVSCH obs. 11. & MAURICEAU obs. post. n. 64. 87. de abortu bimestri, & olim HIPPOCRATES gemellorum quinquemestrium alterum velut in tunica vidit EPID. L. VII Bonus la MOTTE cum talem partum videret, male timuit, ne suffocaretur obs. 165. ignorans HARVEIANI problematis.

- 22 *Feminae Indae, die puerperii in aquam lotum eunt Thevenot voyag. L. I. T. III. c. 48. & Guineenses Bosman p. 153. & Conganae Zucchelli relat. p. 165. & Nigritae in universum Ligon descr. of Barbados p. 92. & Americanae facile pariunt, atque postridie ambulant Americus Vesputius in relat. idemque in Groenlandiae indigenis vidit Egede gamle Groenland p. 31. Etiam in Europa partus nonnunquam facillimi occurrunt: qualem Pechlinus descripsit Cent. I. obs. 27. & stantis in partu mulieris Riedlinus: & minime rarae sunt mulieres, quae continuo a partu omnia, etiam rustica opera edunt, prolapsibus uteri ideo magis obnoxiae. Vide Sennertum prax. L. IV. p. 430. Harvei. p. 276. & vulgo a partu in remotum lectulum puerperas Nosodechii l'hoteldieu incedere testatur Mauric. p. 210. Omnis autem partus vul-*

mus ^{aa}*, neque tamen perfecte naturalis partus est, quando in ipso ultimo nixu aqua exsilit, tunc autem duae membranae, & placenta in utero manent. In hoc genere partus oportet fetum quidem repone-
 nere, & involvere, ut respirare possit, & interim mater liberatur toto onere, dum placenta cum duabus membranis educitur, & funiculus umbilicalis opportuno loco resecatur ^{aa}** : neque enim unquam resecari debet prius, quam placentaeducta fuerit : ^{bb} atque porro infans vitam vivit propriam. Ars ipsa locum nullum invenit, & felicissimi partus sunt, a qua longissime abest; quales sunt deceptarum virginum ^{cc} : Huiusmodi puellam vidi inter convivium prehensam doloribus, quos vocabat hystericos, secessisse in alteram cameram, atque

vulgo pro naturali habetur, in quo facinus, neque nimis capitatus, fetus, in eadem cum utero & vagina directione (*Deventer, Bæhmer, Onyinos* p. 7. 13.) praecunte capite, & facie versus os sacrum conversa editur.

^{aa}* Qui vulgo ab omnibus pro naturali describitur *la MOTTE obs.* 56. *SIEGMUNDIN* p. 128, p. 64.

^{aa}** Neque nimis longus neque duabus unciiis brevior, ne umbilici sedes debilitetur & nascatur dispositio ad hernias umbilicales *CHAPMAN* p. 64. *MAURICEAU* p. 465 &c.

^{bb} *MAURICEAU* p. 248. 464. *SOLINGEN Embryule.* p. 318.

^{cc} *MAURICEAU* p. 210. *HARVEI.*

que continuo totum ovum una cum secundis, exclusisse integrum. Quando vero arte conamur, ut adjuvemus, turbamus fere naturam, quae sola totum opus perficit. Si vero partus praeternaturalis fuerit, tunc oportet artem advocare, quae res in naturae ordinem revocet, & obstacula removeat. Quando vero nondum matura placenta est, tunc perinde, uti fructus acerbi solent, nimis ^{ad} firmiter annexa est utero, quam ut facile cadat, uti cadit matura. Ergo fundo uteri adhaeret fortius, quam quae possit excludi conatu nitentis matris, tunc fixa ibi manet, dum fetus, seclusus ab utero, solus respirat, & oritur continuata quaedam series corporum: fetus nempe funiculo, iste placentae, haec utero adhaeret. Tunc perita obstetrix una quidem manu funiculum sustentat, altera sequitur ductum funiculi, subit per os uteri

dd Rarius vitium esse SIEGMUNDIN: sed fatetur *Eadem*, inter omnia maxime perniciosum esse p. 101. 102. 221. Ego vero nimis frequens esse invenio. Exempla mortis ab hac adhaesione refert *EADEM* p. 102, *Salzman* in *obs.* p. 43. MAURICEAU *obs.* 504. FUCHS E. N. C. vol. 3. *obs.* 146. MURALT *coll. anat.* p. 238. Ab adnato placentae frusto, inflammatus uterus E. N. C. Dec. I. ann. IV. *obs.* 192. A retenta placenta mors per febrem malignam die octavo, MAURICEAU *obs.* 162. Causa varia est, immaturitas, nam abortubus valdius adhaeret; major proportio solidi, centralis placentae

ri patentissimum ^{ce}, neque enim id ita subito clauditur ^{ff}, venit ad membranas, inter istas

& funiculi insertio, strictura spasmodica
 RUYSCH *Adv. Dec. II. n. 10.* scirrhus.
 ce Uterus a partu quidem patet, ut campana,
 RUYSCH *Adv. II. n. 10.* & unus cum
 vagina continuus tubus est *Dionis des
 accouchemens p. 54. Rapports en Chirurgie
 p. 445. &c.* Sed postea totus uterus, liber
 jam a fetu & placenta, contrahitur,
Galeno jam observante, & ad priorem
 parvitatem redit Sedecim diebus id
 fieri *Graaf p. 184.* quindecim & decem
 diebus *Fabricius P. I. c. 9.* octavo vel
 nono *Deventer p. 44.* & quinto *Plater
 apud Schenk obs. p. 555.* intra paucas
 aliquando horas *Manningham p. 21.
 Chapman case 45. Horne obs. 4. Riolanus
 p. 365.* ut continuo a puerperio uterus pugno
 non major fuerit la MOTTE *obs. 397.*
 aut vagina *Riolan. p. 365.* & tertia hora
 os non latius cavitate uteri I D. p. 366.
 Aliquando continuo *crampi* os uteri
 constringunt *Siegmundin p. 11.* Idem os
 statim a partu valide contrahi, deinde
 lentius expertissimus la MOTTE testis
 est L. V. c. 6 Vidit etiam *Harveius*
 continuo ita clausum, ut ne stylum ca-
 peret, unde retentis grumis sanguinis
 maximum vitae periculum p. 275. Tar-
 de quidem claudi *Ruyschius* ait l. c. &
 14. die se apertum reperisse, idque mi-
 nime rarum esse *Thes. IX. n. 15.* in multi-
 paris denique minus claudi *Art de faire
 des rapports p. 434.* habetque *Harveium*
 consentientem „ uteri nempe os non
 clau-

istas & uterum digitum insinuat, versus
latera orbiculi placentae, quaerit locum &
adhae-

claudi, quamdiu aliquid praeter naturam
in utero manet p. 274. Ita quarto die os
uteri pugni capax, cum secunda adhae-
reret *Muralt.* l. c. Quinto dies duos di-
gitos latum reperit *Chapman case* 44.
Sed omnes auctores obstetricii recla-
mant, ajuntque os uteri circa placentam
se constringere *Mauriceau* p. 251, 257.
la MOTTE p. 598. &c. atque circa pla-
centae relictam partem, *la MOTTE obs.*
397. etiam in abortibus, unde pericu-
lum ab haemorrhagiis p. 258. post eje-
ctos exiguos fetus, & facile intus ma-
nent secundae *Mauriceau obs.* 360. &
difficulter eximuntur. Iubet ideo *la*
MOTTE & alii, continuo a partu &
prius, quam os uteri se contrahat, inse-
rere manum, quod tunc absque dolore
fit *Manningham* p. 12. & *Chapman* p.
66. 67. & extrahere secundam, *Arantio*
monente, qui etiam jubet manum conti-
nuo inserere p. 16. ante recentiores:
tum *Mauriceau* p. 251, *la Motte obs.* 99.
Solingen embryulc. p. 321, *Chapman* p.
65, 66 67. *Cl. Hartranst de extr. secund.* &c.
¶ Vide *Hartranst* sub fin. *Stuart de secund.*
p. 35. *Chapman* p. 70. Initium vero
facere jubet *Mauriceau* in ea sede placen-
tae. in qua minus firmiter adhaeret p. 253.
Weisman de part. difficili p. 23. Verum
Solingen p. 335. & *Cl. Hartranst.*, com-
mendant marginis extremitatem inferio-
rem, digitumque unum sub altero in-
serere jubent, alternis, oppositis ad ute-
rum

adhaesionis, ibique digito in arcum flexo
uterum sustinet, & reprimat, dum interim
funiculum leniter adtrahit, ita sequitur
placenta, & , si vel paulum successerit,
continuo facile exit. Haec in negotio isto
summa ars est. Si vero obstetrix digitum
inseruerit inter membranas disruptas, quae
fetus emisserunt, amnion nempe & chori-
on, tunc membranae lacerantur, & vix
absque inflammatione uteri liberatur femina.
Exemplum a pueris sumendum est: quando
nempe ex plateis stratis volunt lapides exi-
mere, corii orbem arcte apprimunt ad la-
pidis superficiem, tunc funiculum, qui co-
rio adhaeret, adtrahunt, & ita lapidem ex-
trahunt. Quando vero pars una corii inae-
qualiter minusque arcte lapidi adplicata est,
tunc corium de lapide abstrahunt ^{hh} uti
placen-

rum dorsis, & retinere uterum, dum
placenta extrahitur *Horne* p. 66.

^{hh} *Ruyssch obs.* 10. 26. qui observat, vix un-
quam alio tempore contingere; *Zod. Gall.*
ann. III. M. aug. E. N. C. Dec. II. *ann.*
I. *obs.* 112. 141. *ann.* II. *obs.* 195. *Stalpart.*
Cent. I. *obs.* 67. la MOTTE *obs.* 425. 426.
MAVRICEAU p. 248. *obs.* 355. 685.
WALDSCHMID de abortu. SCHVRIG.
embryol p. 146. P. AMMAN *Prax.*
vuln. letbal. Dec. V. n. 1. SAVIARD
obs. p. 84. ILL. WERLHOF de febr.
p. 292. CHAPMAN *case* 29. Ab obste-
trice tubam extractam vidit MANNING-
HAM p. 49. Tunc in utero pori ad-
parent, per quos sanguis effluit LIT-
TRE

placentam de utero oportet detrahere. Si obstetrix unice funiculum traxerit, neque interim sustinuerit uterum, tunc, si placenta cohaesio firmior fuerit, poterit totum uterum extrahere, inversum: ita, si inversus ^{hh*} manserit, puerpera intra tres horas exspirat, neque servari potest, nisi eodem temporis momento uterus repositus fuerit. In eo enim statu uterus sanguine stagnante ⁱⁱ, & vix moto plenissimus est, & quamprimum aer accedit, inflammatur, & putrescit, etiam in reposito, sanguis. Verum etiam

TRE *Mem. de l'Acad.* 1707. p. 281.
 SALZMAN *obs* RVYSCH l. c. WALD-
 SCHMID l. c. Mortem vero secutam
 fuisse testatur MAVRICEAV, STAL-
 PART & reliqui omnes, atque fere
 semper mori feminas RUYSCH, etiam tunc,
 quando uterus restituitur HILSCHER *de*
negot. gener. Conf. Cl. a. BERGEN *de*
prol. uteri. Servatas fuisse tamen aliquando
 RVYSCHIVS testis est l. c. tum exem-
 plum est in E. N. C. Cent. II *obs*. 195.
 Hunc novum morbum esse credo, de quo
 CELSUS in *praef.* ait „splendidam feminam
 post paucas horas exspirasse, cum caro
 ex pudendis prolapsa exaruisset. Alias
 uterus cum placenta protrahitur, sed
 absque inversione, paulo minori periculo.
 Talem prolapsum restituisse video J. von
 HORNE *obs* 4.

hh* Exemplum RUYSCHIVS habet *de musc.*
uteri.

ii Uterus ante partum plurimo sanguine
 distenditur HAKVBI p. 243. Conf.
 DCLXIV. *nos*, m.

etiam tunc caute agere oportet, quando digitus in uterum inseritur, nam, si vel paulum ungue laeteris^{kk}, inflammabitur^{ll}, & cum inflammato utero paucissimae feminae servantur.

Matris

kk Cum placenta uterus elapsus, & cultello leniter incisus fuisset. inde statim lethalis haemorrhagia RUYSCH *obs.* 25.

ll Haec ipsa rudior extractio adeo frequentes fecit morbos puerperarum miliares p. 294. mortesque puerperarum, illustri observante WERLHOFIO *de febris* p. 290 *Comm. lit.* 1733. *hebd* 38. verissime, uti ex tristissimo exemplo didici: cautasque jubet esse obstetrices, ne rudius eam partem tractent, cujus adeo periculosae passionis sunt RUYSCH *obs.* 61. la MOTTE *obs.* 166. 473. &c. Cum placentam separasset digitis, uterus quasi setosus mansit. & aegre servata est puerpera SIEGMUNDIN p. 105. &c. Mors a subita & rudi extractione placentae MAURICEAU *obs.* 658. Haec ratio fuit, quare optimus RVYSCHIVS tot locis suaserit, quando placenta adhaesit, relinquendam potius esse, neque enim nocere, sed in molam abire *Adv.* II, n. 10. aliquando vero sponte post aliquot horas decedere expulsam a vi muscoli sui *de musculo uteri* p. 13. aut a clystere deturbari *Adv.* II, n. 10. (quem etiam commendat MAURICEAU p. 259.) neque putrescere, neque mortem inferre *ib.* p. 14. Ego non diffiteor exempla existare, in quibus secundae diu retentae absque noxa expulsa fuerint. Secunda a partu septi-

Matris) Dixi tres causas partus, quae ad fetum pertinent. Totidem a matre pendent : 1. Defectus alimenti. Quo vastior enim

mestri retenta motu animali expulsa E. N. C. *Cent.* 1. *obs.* 51. Triduo, absque corruptione & sponte expulsa placenta *la MOTTE obs.* 163. Post triduum expulsa sponte *MAVRICEAV obs.* 162. E. N. C. *Dec.* 11. *ann.* 9. *obs.* 116. Aliquot diebus E. N. C. *Dec.* 11. *ann.* 5. *obs.* 179. Die sexto vel septimo in sana femina discedunt secundae putridae *Hippocrates γυναικεων α* & die septimo *Maur. obs.* 414. Aliquot septimanis retentam & frustatim absque malo exclusam placentam habet *Vater ad Ruysch p.* 7. & mense integro E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 3. *obs.* 117. Quadraginta quinque diebus E. N. C. *Dec.* 11. *ann.* 1. *obs.* 184. Quatuor mensibus a partu *Kerkring. obs.* 36. & septem *Büchner misc.* 1728. p. 1497. & adhuc diutius *Hist. de l'Acad.* 1738. n. 5. Vide plura exempla apud *Ettmüller diff. de secund. exclus.* p. 12. 13. 25. 26. Inprimis minores illas placentas abortuum diu conservari, atque per putridam subpurationem abire, aut in molas degenerare satis video experimentis confirmari *Hildan. Cent.* 111. *obs.* 59. *Mauriceau obs.* 169. 440. 688. 621. *obs. post.* 20. 144. &c. *Werlhofio* etiam teste p. 292. Verum placenta & lochia inter omnes humores partesque corporis humani putrescibili natura eminent, & in teterime olens liquamen contabescunt. Inde a secundarum ad naevum superstitionis adfri-

enim fetus est, eo uberiore indiget alimento 2. pressio augetur in partibus matris inferibus, hinc plus sanguinis ad superiora regurgitat, & 3. irritantur nervi.

Sanguis) Eo momento, quo placenta secedit, prorumpit sanguis, non guttatim, sed uno impetu ^{mm} deorsum ruit, nisi mulier pene

adstrictione inflammatio & pene gangraena in recens nato E. N. C. Dec. III. ann. 9. obs. 131. Lochia valde cito faetent *Verheyen* II. p. 324. Neque aer arceri potest a partu maturo, cum aliquot certe horis os uteri pateat. Inde putredines & febres a resorbto gangraenoso liquamine, & mortes etiam expulsa placenta, ut apud *Bartholinum* hist. 39. Cent. V. *Mauriceau* obs. 162. E. N. C. Dec II. ann. V. obs. 173. *Comm. lit. Nor.* 1735 n. 17 *Lentil. Fatromnem.* I. p. 294. Omnes adeo, excepto *Ruyfchii*, anatomici consentiunt, quantum fieri potest, eximendam placenta, neque negligendum, nisi certioris mali metus in nimia adhaesione manus vinciat. Vide Cl. *Leporini* in *Ruyfchii* paulo nimis universale consilium animadversiones. Extrahi etiam jubebat *Hippocrates*, sed prudenter, fetus ipsius pondere qui utri impositus esset, ex quo aqua paulatim sublideret.

^{mm} Omnes consentiunt, placenta vel partialem *Mauriceau* obs. 585. *Muralt. coll. anat.* p. 642. 658. vel integram discessionem haemorrhagiarum veram causam esse: *Mauriceau* p. 123. etiam si primis mensibus exiguum falsum germen fuerit p. 158. apertis ostiis vasorum uteri,

pene absque sanguine fuerit ^{mm*}. Non prius erumpit sanguis, nisi vel partus minus naturalis

quibus vasa similia placentae opponebantur DCLXXVIII. not. l. Haec vasa minuantur, quando uterus ab integro partu contractus, ad priorem exilitatem redit. Sed, dum fetus in utero manet, uterus nequit contrahi, vasa adeo distenta manent, & pergunt sanguinem cum summo matris periculo, effundere, *Dionis des accouch* p. 334. & cita morte, si haemorrhagia major, atque adeo major placentae portio soluta fuerit Ergo educendus semper fetus, siue falsum germen fuerit, siue immaturus fetus, siue infans perfectus L. *Bourgeoise* l. p. 64. seqq. *Chapman* p. 74. *Siegmundin* p. 99. *Bohn de sal. abortu* p. 609. *Mauriceau* p. 158. 160 id autem facile fere fit, cum in hoc casu placenta jam dissoluta parum adhaereat *Mauriceau* p. 161. & uterus late pateat *Chapman* l. c. Neque quidquam relinquendum est, cum haemorrhagiae finis exspectari nequeat, nisi uterus perfecte liberatus fuerit p. 171. etiam si tantum grumus major, aut pars placentae retenta fuerit *Mauriceau obs. post.* 25. *Chapman* p. 26. la MOTTE *obs.* 396. Quoties id neglectum est, cum maturis inprimis fetibus, certa mors succedit *Mauriceau* p. 158. *obs.* 210. 238. 330. 650. *Bohn de abortu salubri* p. 604. 605. Educatione vero facta saepe servantur S I E G M U N D I N l. c. *Mauric.* p. 168. *obs.* 284. 216. 279. 457. *obs post.* 57. 80. 98. 110. 120. Aliquando tamen post

turalis fuerit, aut aliquid laceratum fit; aquae vero & mucilago utique ante placentam exeunt; nunc vero, dum placenta secedit ⁿⁿ ab utero, purus sanguis exundat. Uterus, in femina nono mense gravida, ad minimum vigecuplo major est se ipso, primo mense praegnante. Haec diversitas pendet unice a majori sanguinis copia. Sanguis iste stagnat in fungosi corporis uteri caver-

post nimias haemorrhagias, etiam educto fetu, inter deliquia extinguuntur MAURICEAU p. 162. 166. aut aegerrime servantur la MOTTE *obs.* 401. 402. Commendat autem PUZOS, in maturis fetibus non manu adeo fetum, in tanta matris debilitate, extrahi debere, sed os uteri digitis distendi, sic dolores nasci, & haemorrhagiam a soluta placenta necessariam minus subitam, aut lethalem succedere ACAD. CHIR. II. Simile fere consilium fuit D. MAURICEAU *obs.* 624.

mm* Ab abortu tanta haemorrhagia, ut nullus in corpore puerperae sanguis reliquus esset L. Bourgeois I. p. 67.

nn Hinc periculosissimae haemorrhagiae fiunt, quando placenta circa os uteri adhaeret HOORNE p. 27. Quando placenta fetum praecedit, quod tunc necesse est fieri, enormis sanguinis fluxus sequitur, ob vasorum multitudinem, neque cohibendus, nisi subito fetus extrahi potuerit HIPPOCR. de *superfet.* n. 2. MAURICEAU p. 331 *obs.* 175. 210. 423. 428. 502. 651. DIONIS p. 299. la MOTTE L. III. c. 15.

cavernis, chylosus est, & ante placentam stat, quod nemo negat, neque enim hic quaero, an etiam subleat placentam ^{oo}. Nunc aufertur placenta, ergo vasa aperta sunt, & sanguis, qui in utero est, & ex vasis uteri in placentae vasa communicat, non redit in venas, neque id fieret cum matris commodo, sed expurgatur in uteri caveam, dum de arteriarum finibus tot epistomia ^{qq} removentur, atque saltu prorumpit, quicumque steterat in vasis, quae placenta haecenus quasi obturaverat. Haec adeo haemorrhagia peritum non turbat ^{qq}. Quando vero sanguis exit ex gravida, in cuius utero fetus adhuc remanet, oritur omnino timenda haemorrhagia, funesta, nisi fetus continuo extrahatur. In hoc enim casu fetus uterum expansum tenet, neque sinit collabi ^{rr}, sic pergit sanguis erumpere ad mortem usque.

Nul-

BOHN. l. c. p. 616. SIEGMUNDIN p. 98, E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs. 34.

^{oo} DCLXXVIII.

PP Hinc etiam a naturali partu subitae nonnunquam post avulsam placentam ab haemorrhagiis mortes visae sunt la MOTTE p. 723. obs. 423. CHAPMAN case 7. &c aut funestae convulsiones MAURIC. obs. 230. cont. not. mm.

qq Nisi nimia sit, tunc enim minime periculo vacat MAURIC. p. 384.

rr Collapsus uteri, quando fetus eductus est, in cohibenda haemorrhagia tam efficax est, ut

Nullum ergo sanguinem ante secundas oportet exire utero. Quando vero aqua rubra exit ante partum, aut quando secunda aquam praecedit, respiravit fetus, & in summo periculo versatur *.
1732.

DCLXXXVI.

Dimissis) Femina & ante partum, & in partu maximos dolores patitur, in primis dum caput fetus & humeri exeunt. Quando nunc placenta obsecuta est, nascitur status tranquillitatis exoptatissimus, cum quo, ut feminae ajunt, nulla alia beatitas comparari potest. Verum haec ipsa periculosa pax est, neque unquam in naturali partu feminae pereunt, nisi post nixum editum, tunc enim omnis sanguis ad abdomen fertur, & nihil ad cerebrum, & cerebellum, venit. Ergo jam ante partum cingula ^a, britannorum more ex corio facta, debent abdomini
cir-

ut etiam ob eam rationem haemorrhagiam in sectione caesarea modicam esse
GALENUS, & ROUSSET *de sect. caes.*
S. I. C. 8.

a An errore codicis? An credidit PRAECEPTOR, posse aliquid haec cingula ad frenandum effluxum sanguinis. Possunt utique, sed tum demum, quando enormiter abdomen comprimunt, & tunc facile lochia supprimunt la MOTTE *obs.* 420. Sed millenae feminae ex lochiis suppressis pereunt, si una ex haemorrhagia nimia a partu legitimo perit. Mihi naturae

circumdata adesse, ut, quamprimum femina peperit, abdomen contrungi possit, & coerceri sanguinis nimia determinatio ad inferiora. S.c. caventur apoplexiae, deliquia, convulsiones matrum. Porro cavendum est, ne frigidus aer ad uterum venire possit.

Contrahere) Eductus est fetus, & sanguis, quem uterus per totam graviditatem retinuerat, nunc effluxit: uterus autem se contrahit, & qui prius distentus fuit, ad priorem parvitatem redit, neque superest corpus, quod uterum distrahat, conprimuntur adeo vasa & omni momento angustiora fiunt, & collapsu uteri clauduntur ^b. Primo adeo inpetu ^c evacuatur sanguis, qui stabulabat ^d in arteriis uterinis, alendo destina-

tus

adversari videtur, ea comprimere vasa, quae per aliquot dies aperta manere necesse est, nisi feminam perire velimus. Vide la MOTTE L. V. c. 9. dicentem contra receptam patriae suae consuetudinem, quam sequebatur MAURICEAU, sed alio scopo, ut forma feminis conservaretur. Hinc ab initio laxas facere jubet ligaturas p. 376. post decimum quintum diem strictiores p. 377.

^b La MOTTE L. V. c. 6. id *crassefcere* vocat MAURICEAU p. 21. 22.

^c Lochia primo ad sesquiheminam effluunt, tanquam sanguis a victima HIPPOCRATES *γυναικιστορα*. Die primo multa & rubra lochia MAURICEAU p. 411.

^d Ex poris illis minoribus uteri supra citatis ad DCLXIV. & magnis osculis sinuum caver-

tus fetui , neque in venas rediturus , sed in placentam infundebatur sensim. Hic sanguis haeret per totius uteri ambitum , ergo abrepta placenta vehementer exilit ^e. Alterum lochiorum stadium est , quando purus quidem floridusque sanguis , ad sextum & decimum ^f diem usque (1. G. 3. 4. 5. diem , raro ultra : FELDM. per biduum) lente , atque leniter ^g effluit , quia per aperta quidem vasa destillat , sed jam magis contracta:

Expellit) Uterus repurgatur ; nempe ea portio sanguinis , quae in expansis valis uteri potius stabulabat , quam transfluebat velociter , is sanguis derivatur extra corpus feminae.

cavernosorum VATER *fig. uter. grav.*
p. 16.

^e Placenta avulsa uterus est quasi latum vulnus HARVEI p. 274. MAURICEAU p. 412.

^f Secundo , tertiove die lochia pallida fiunt , & semper expallescent , donec lactis fiant similia MAURICEAU l. c.

^g Dictum est , uterum a partu contrahi DCLXXXV. not. *ee*. vi fabricae musculosae DCLXIV. & elatere arteriarum , nimis dilatatarum , quae ad priorem exiguitatem redeunt. Ita necessario primum rubri sanguinis inpetus minuitur , deinde eo vergunt humores in eo ordine , quo sanguini succedunt , rubellus , ichoris similis HARVEI p. 274. flavus , pallens , denique albidus. Cl. VATERUS credit valvulas sive rugas cavernarum uteri aliquid etiam posse ad moderandum lochiorum inpetum l. c.

nae. Si retentus fuerit, magna mala faciet: neque enim in venas redit, sed stagnat, oritur phlegmone uteri, deliria accedunt, febrisque ^h vehemens, & proxima mors sequitur. Ergo semper maximam curam adhibere oportet, ne lochia retineantur. Id fieri potest per frigus ⁱ aut rudem obstetricis tractationem ^k.

Tandem) Denique vasa uteri ita se coarctant, ut sanguinem nunc nullum accipiant, verum proximam crassitie sanguini materiam, semirubram, semimucosam. Tunc uterus semper magis contrahitur & tenuior redditur, donec naturale omnino liquidum ^l, majori tantum copia, excernat,

^h Ex retentis lochiis uterus inflammatus & totus ater BRESL. 1723. *m. nov.* Ex levi terrore suppressa lochia & mors la MOTTE *obs.* 411. Mores a suppressis lochiis per febres acutas HIPPOCR. *Epid.* I. *aegr.* IV. *Epid.* III. S II. *aegr.* 2. 13. & in universum a lochiis retentis febris calida, uteri inflammatio *YUVALT. a.* summumque periculum *Prorrh. I. n. 10.* Felices, quibus abscessus a lochiorum suppressione morbum solvit: ut apud la MOTTE *obs.* 409. 410. 413.

ⁱ La MOTTE *obs.* 409.

^k DCLXXXV. not. II. quae frequentior causa est. A parte membranarum relicta lochia suppressa la MOTTE *obs.* 400. &c.

^l Lacti simile MAURICEAU p. 411. a die quinto ROUHULT *observ.* p. 44. Vulgo pro vero lacte habetur, sed male
ROU-

nat, atque ultimo exsiccetur constriktus. Haecenus tamen supra virgineam suam parvitatem in majorem molem distentus manet, donec septem, octo, novemve septimanis priorem exilitatem ^m recuperet, tuncque inpraegnari aptus fiat, & retinere fetum, quod non poterat ante ⁿ, nisi in valde vegetis mulieribus.

Varia) Pro varietate temperiei, mensium abundantia, aut paucitate. Aliae mulieres lochia per integrum mensem o patiuntur, quibus nempe menses copiosi fuerant, aliis vix aliquid sanguinis erumpit, nisi primo inpetu p, quibus etiam ante partum parca menstrua stillaverant.

DCLXXXVII.

ROUHAULT. MAURICEAU p. 413.

Mem. de l'Acad. 1708. p. 247.

m DCLXX. not. n.

n In brutis vero, v. g. cuniculis, uterus unica a partu hora ad venerem, & conceptionem, aptus est HARVEI p. 274. Naturalis terminus in femina est tertia septimana MAURICEAU p. 381.

o Sunt, quibus lochia rubra ad quinque, & sex septimanas stillant la MOTTE p. 622. uti in regionibus calidis videtur familiare esse. Nam a partu masculo triginta, a femina quadraginta diebus fluere ait HIPPOCRATES *περί γυναικ. α.* graecus homo.

p Dantur, quibus absque morbo lochia intra bidaum sistuntur BELLINGER *of the nutrit. of the fet.* p. 32. la MOTTE L. V. c. 6. & quinto la MOTTE p. 622. aut omnino nulla fluunt SALMUTH *Cent.*

DCLXXXVII.

Contractis) Nunc vasa uteri arctiora sunt, & magis resistunt sanguini, huc deponendo, ita ut sanguinem chylosum, crassiores, non recipiant. Tunc pars sanguinis chylosa ^a, quae prius cum mensibus

Cent. III. obs. 89. E. N. c. Cent. VI. obs. 76. Hist. de l'Acad. 1738. obs. 5. TRUMPF Comm. lit. 1735. hebd. 40. Aliquando diarrhoeae puerperis lochia auferunt la MOTTE obs. 160. alias copiosum lac MAURICEAU p. 413. 419. alias per alvum sanguinea effluunt BRESL. 1720. p. 617. LANZONI anim. 126. Visa sunt ex utero in abdomen per tubam elapsa STAEHELIN spec. anat. bot. 1724. n. 4 Confer DCLXVII. not. b. & seqq.

^a Lac procul dubio chylus est, colore, sapore, contentis DCLXXXIX. simillimum: conf. CXXVII. Salsiorem unice facit ductus thoracici chylum LOWERUS p. 237. quae diversitas forte ad lympham admistam pertinet, consentiente MICHELOTTO. Sed chylus iste non subito in sanguinem vertitur, & plusculis omnino horis cum sanguine circumducitur CXXIX. CCIV. LIEUTAUD. p. 212. conservato colore, & sapore. Inde non penitus rara exempla sunt, lactis alieno loco effluentis. Ex tumore duro cruris lac salire vidit DIONIS p. 410. & abscessu tali SCHURIG *syll.* p. 517. Ex pustulis femoris verum lac JOURNAL DES SAVANS 1684. n. 16. Ex ulcere COWPER T. XIX. Lacteus succus ex minimo

bus effundi solebat, deinde stagnabat in uteri arteriis, neque redibat in venas, nunc, cum

nimo foramine inguinis fluens soc. EDIMB. V. p. 398. Lac ex umbilico effusum, per canalem non satis notum, ascendentem versus hepar E. N. C. Dec. II. ann. 8. obs. 177. Lac per os effluens Dec. II. ann. 6. obs. 76. Denique thymi succus, lactis simillimus I. POZZI Comm. epist. p. 66. & nonnullarum glandularum conglobatarum, in situ & recens nato homine, succus lacteus est. Non ergo opus est minime probabili commento MAZINI, qui alborem & dulcedinem lactis a figura ovali glandularum mammariarum deducit *Inst. med.* p. 234. Sed chylus videtur globulis suis respondentes habere diametros in vasis mammarum lactiferis, & in eos deponi, non dissimiles forte pororum ad cellulas adiposas ducentium, quae satis analogum, sed minus aquosum liquorem recipiunt, & perinde uti lactei ductus, & facile ab arterii chylum admittunt DCLXXXVIII. not g. & expedite remittunt in venas. Haec enim proprietas sola explicare potest, quare in virgine, muliere vidua, paucissimis temporibus exceptis, nempe a partu, & imperfectius in inpraegnatiss, nihil omnino per ductus lactiferos feceratur, sed collapsi, clanculum quasi adsint, & tenuissimo tantum & aegre visibili liquido perfluantur? Eo nempe toto tempore resistentiam a collapsis ductibus lactiferis ita magnam esse oportet, ut ex horum ductuum principio, continuo arteriis,

cum definit effundi in uterum, redditur venis uterinis, venae cavae, cordi, vasis pulmonalibus, aortae, & circulationem obit per corpus. Inde febricula oritur plerumque, quam vocant lacteam, vel puerperalem, naturalis omnino, sed paucis duratura horis: simul mammae durescere incipiunt, & intumescere quasi oedemate, & lochia minui ^b. Si nunc accesserit suctio ^c mammae

teriis, lac facilius, & expeditius in venas rubras, quam in progressum ductuum lactiferorum transeat. Hinc viis mammariis obstructis in femina lactante & febriente sanguis lacteus *Bartholinus de hepat. defunct. desper. caus. p. 51.*

- ^b Succus uterinus omnino a vero lacte differt, pallidior est, mucosior, aquosior, minus aut pinguis, aut dulcis. non autem valde a colostro recedit, sive lacte aquoso gravidarum, aut puerperarum nunc primum nutricum. Nam primo a partu die secundo, tertio demum & quarto lac venit *Stahl theor. med. p. 363.* Verum sufficit, opinor, a partu insignem aliquam excretionem suppressam esse, ut succedat alia, & naturaliter ea, quae similioris liquidum est, uti alibi catarrhos diarrhoea solvit, sudor diarrhoeam, urina sudorem. Ergo experimentum, uti certum est, ita non obscuras causas habet. Multae feminae pauca lochia habent, quibus abundius lac ad mammas venit *Mauriceau p. 419.* Nutrices lochia vix patiuntur *id. p. 413.* Nutricibus paucillum mensium *Aristoteles hist. anim. L. X. sub fin.* Porro a terrore lac ad uterum reperiendum, ut per integram

mæ a lactente puero ^c, vel pressio a matre, tunc mammae fiunt quasi uterus, nempe superpondium sanguinis, quod in plethoram menstruam consumebatur olim, & postea inpendebatur alendo fetui, id nunc mammis traditur, quarum vasa per suctionem aperiuntur. Et, si perrexerit fetus, aut docta mulier, mammas exsugere, intra paucos dies nihil ultra de lochiis stillabit, nisi paucae puris guttulae, ex secreto & stagnante liquore paratae.

Communicantes) GALENUS ^d, deinde RIOLANUS, porro NUCKIUS, vasa habent, quae

grum mensem lochiorum specie fluxerit
Boccone Mus. di Fisic. p. 122.

^c Suctio per inspirationem explicatur. Infans in dilatato pectore, spatium parat, aerè minus elastico plenum. Sed incumbit mammae pondus atmosphaerae. Ergo lac jam depositum in tubulos lactiferos, urgeatur vi nova, atque superat papillae difficultates. Deinde, & eadem opera, papilla leniter titillata DCLXXIX. *i. l.* intumescit, erigitur, ductusque lactiferi in rectitudinem porrecti, facilius succum chylosum emittunt. Utraque causa facit, ut lac in os infantis descendat. Idem, etiam in cadavere, pressio potest, & in feminis levis titillatio mammae, qua lac accersitur & coactum resolvitur *Stabl. l. c. p. 366.*

^d DCLXVI. Caeterum sanguinis ad mammas determinationem ex clauso utero & funiculo umbilicali resecto etiam *Simsonus* explicat

quae lac ad mammas ferant. Nempe 1. arteria mammaria, ex arcu arteriae axillaris oritur, retrogreditur sub claviculam, adit costas, inde descendit ad centrum mammarum, iisque inpenditur. 2. A trunco arterioso hypogastrico, qui etiam utero arterias dat, arteria contrario ductu adscendit, perforatis abdominis musculis, ad mammas, & utriusque arteriae ejusmodi directio est, ut truncos truncis perfecte obponant, & motui cordis contrariae eant. Neque voluit CREATOR, ut recta via sanguis ad mammas veniret, uti neque recta via ad uterum reduxit. Verum per arterias retrogradas appellitur ad uterum is sanguis, qui minime aptus est ad motum, chylosus e nempe, qui nondum diu circulum per corpus obiit, neque in naturam humanam excoctus est. Ergo per has arterias, chylosus maxime sanguis, ad mammas adfertur, qualis ad uterum ferebatur: partim enim ab utero venit, partim a singulari vasorum apparatu praeparatur.

DCLXXXVIII.

*plicat of the womb. p. 46. & ab hypogastricarum cum mammariis communicatio-
ne Kaauw n. 1073. Sed demonstravi l. c.
posse nos carere hac, satis dubia, anastomosi.*

e Cui globuli molles, magni & inaequales, atque facillima discessio elementorum
DCLXXXVIII. exigua adeo ad expedite
fluendum aptitudo sit.

DCLXXXVIII.

Dilatabili) Mammæ liberae sunt, neque ullo ambeuntur musculo. Inponuntur musculo pectorali majori, ita tamen, ut interponatur pinguedo, inter musculum mammaeque discum. Hic totus discus facile ab anatomico, aut a chirurgo, qui mammam extirpat, eximitur, & exemptus ex pinguedine enucleatur,

a Figura externa mammae notissima est: Glandulosa vero congeries, quae proprie mammam constituit, utique insulae modo, in media albissima, mollissima, sub papilla vero paucissima, *Winslow Exp. tr. de la poitr.* n. 2. pinguedine ponitur, a musculo pectorali abunde libera, *Morg. Adv.* V. p. 8. contra, quam Cl. *Lieutaud* visum est & Cl. *Gunzio D. de mammis* p. 10. undique ab ea pinguedine separata, albo, satis tenaci, cum cellulosa tela & cinis interposita continuo involucro, dicto *C. Baubino theatr.* p. 180. *Ravio* apud *Valent.* II. p. 100. *Molinetto* p. 87. *Winslow* n. 11. *Gunzio de mamm.* p. 10. quod glandulam mammae undique continet, iis exceptis locis, ubi ductus excretorii exeunt, uti glandula *Whartoni*, aut *Stenonis*, involucro pene tendineo, cum cellulosis earum glandularum internis vinculis continuatur. Haec ipsa pinguedo est, a qua princeps mammae moles, & rotunditas pendet, & qua consumpta mammae evanescere videntur in vetulis *Ruyssch Thes.* IV. n. 23. Inde virginum mammae fororiantes, non a glandulosa fabrica *Fantonius diff.* XI.

cleatur , ut liberrimus sit undique , nisi , ubi papilla cuti tenui adhaeret. Ergo mamma facile dilatatur ^b.

Communicantes) Haec ratio est , quare per adeo varios vasorum anfractus sanguis ad mammas veniat. Voluit enim natura , ut ex quolibet horum vasorum in alterum libera via perpetuo pateret ^d.

Reſta)

b Demonstrant subiti tumores , a lacte , a re-
percussa perspiratione , a causis obscuris.
Mammae subito tumidissimae E. N. C.
Cent. I. obs. 67. In herniosa , cum abdo-
men constringeretur , mammae intume-
scebant *Barthol. hist. 47. Cent. VI.*
Mammarum sexaginta & quatuor libra-
rum exemplum *Phil. tr. 1669.* & aliud
vastissimarum mammarum *Salmuth. Cent.*
II. obs. 89.

c *Arterias , in Textu.*) vide DCLXV, not. b.

d l. c. DCLXVI. a.

e *Abeunt , in Textu.*) Mamma glandulam
conglomeratam in centro habet , dictam
J. Carpo Isag. p. 25. b. Vesalio p. 676.
Spigelio p. 267. Lieutaud. p. 211. & c.
pictam a *Bidloo T. XIX. f. 1.* Ea sola lac
generat , & mihi videtur unica , he-
misphaerica , & mammae concentrica ,
propior tamen cuti , ubi papillae respon-
det , ut unicam non male dixerit *Riola-*
nus & C. Bartholinus p. 182. Nam acini
omnes , uti in conglomeratis , in unam
molem conpinguntur *Wharton p. 259.*
Rau l. c. T. Barth. Cent. II. b. 92. Morg.
Adv. IV. p. 90. Adv. V. p. 7. Heister
in praef. comp. Winslow n. 10. Guter-
mann

Reſta) Ut finis arteriae rubrae absque interposita glandula fiat ductus lactifer, & ex trunculo quidem arterioso in continuam venam

mann de mamm. & lacte p. 10. *Gunz* l. c. p. 11. Minus adeo recte plures mammae glandulas facit *Diemberbroeck* p. 240. & in icone *Verbeyen* T. XVIII. f. 2. neque novi *Vesalii*, aut *C. Bartholini* glandulas minores, quae magnam circumstant, neque bene decem numerat glandulas *Molinetti* l. c. Cohærentes mavult vocari *Cl. Böhmer de mamm. progr.* p. VIII. Conponitur hæc glandula ex numerosissimis acinis subrotundis, *Böhmer* ic. I. rubris aut e rubro lividis, duriusculis, membrana clausis *Rau*, cellulosa tela conjunctis. Has glandulas vesiculosas vocat *Vieussens nov. syst.* p. 60. *Ruyschius*, ut solet, nullas glandulas mammarum admittit *Epist. XV. Thes. VII. n. 70.* non bene tamen pinguedinem pro glandulis dicit haberi *Epist. cit.* nihil enim, vel ipse, potest mutare, nisi intimam acinorum fabricam non vesiculam esse cavam, sed vasorum glomerem. In vivis negat glandulosam fabricam adeste *Vesalius*, sed repugnant experimenta, & *Morgagnus Adv. V. p. 3.* Et glandulam & pinguedinem habet *Cl. Gunz* l. c. p. 27.

f *Lactiferos, in Textu.*) *Vesalius* venas mammarum in lactante lacte plenas viderat p. 677. *I. Possenius* ductus dixit ad papillas euntes, & lac fundentes p. 511. *Spigelius lactiferos* candidos canales pariter vidit, & addit in progressu angustiores fieri p. 266. Tubulos candidos in centro mammae

venam rubram sanguis fluat, in ramum vero lateralem lac feratur. Quando enim vasa arteriosa mammarum replentur, liquor in

coeuntes reperio apud *C. Bartholinum* p. 183. Porositates obscurius vocat *Wharton* p. 261. Fufius *T. Bartholinus* sexta septimana a partu ductus vidit & pinxit *hist. 92. Cent. I.* ductus ramosos, divisos in glandulosam mammae substantiam *anat. renov. p. 332.* Ab eo tempore vulgo noti fuerunt, & in femina, aut gravida, aut non supra sextum mensem a partu extincta facile reperiuntur. Hos adeo ductus ego reperio laxos, membrana albissima & tenerrima factos, ut oculorum aciem inanes fere eludant, multo, quam in iconibus latiores, certe sexto a partu mense ne duabus quidem lineis angustiores, ut etiam *Ruyfchius* dixerit, in praegnante reddi amplissimos *Thes. IV. n. 23. conf. Trew E. N. C. vol. 2. obs. 54.* Sinus vero peculiare a *Cl. Trewio* in originibus horum ductuum dictos l. c. & repetitos a *Gutermanno* p. 11. & *Cl. Gunzio* p. 14. nullos vidi. Oriuntur radiculis suis in glandulam principem mammae dispersis, *Nuck adenogr. f. 1.* & semunce a papilla confluunt in viginti fere trunculos, qui undique circumstant papillam, ita arcte stipati, ut nihil fere nudum relinquant, *conf. Morg. Advers. III. f. 3.* perque papillae fungosam carnem adscendendo ita arctantur *Spigel* p. 266. *Nuck* f. 1. & p. 13. *Rau, Böhmer, Keil* p. 116. *Winslow* n. 13. ut setam argenteam crassiorem non facile capiant *Nuck* l. c. *Trew* l. c. difficilior

cilius vero per orificium inter rugas collapsae papillae admittant, quod Cl. *Böhmer* p. XIII. & nobis successit, sed raro eventum *D. de Marchetti* p. 61. ut non male minimis & visum fugientibus canaliculis papillam perforari scribat *Molinetti* p. 87. Valvulas nullas vidi, uti neque *Cowper* ad Tab XIX. neque *Nuck* p. 11. habet autem *Bidlous* l. c. *Mangetus*, & *Palsyn anat. chir.* p. 256. & ex ove describuntur in *E. N. C. Dec. 1. ann. 2. obs.* 154. Neque spincteres *Keilii* l. c. vidi, neque valvulam ad orificium papillae dictam a *D. de Marchettis* l. c. neque transversas demum anastomoses ductuum, pene ab omnibus propositas, nempe a *Ravio* l. c. *Keilio comp.* p. 115. *Nuckio* p. 16. f. 2. *E. E. E. Verheyen* f. 4. & ex capra *Mangeto theatr.* II. p. 169. ex quibus factum est, ut *Cowperus* omnes per unum ductum inflari posse doceat T. XIX. & *Gutermannus* idem adfirmet, & *Nuckius* omnino omnes describat conjungi in circulum, a quo ad papillam, & excretoria oscula rami exeant p. 16. Hunc circulum perinde recensuit pro vero Cl. *Gutermannus de mammis & lacte* p. 10. & ipse *Winslowus* n. 13. 19. & *Gutermannus* quidem experimento demonstravit, ut agnosceretur a *Trewio Comm. Lit.* 1734. n. 16. Ego vero ductus vidi manifestissimos, circulum nullum, nullum etiam pingit *Bartholinus* & *Verheyen* T. XVIII. f. 2. & diserte negat se reperisse *Trew* l. c. & Cl. *Böhmer* p. XV. & Cl. *Gunz* p. 18. Insulas autem ejusdem ductus manifesto vidi, quales inter ramos ejusdem ductus etiam Cl. *Böhmerus* pingit f. 1. 2. An

in vasa lactea mammarum transit &, & quando in ductus galactophoros vicissim liquor inji-

viderunt clari viri circulum venosum subcutaneum, qui eleganter areolae ambitum circumscribit, & minutis ipsorum vasis melius respondet? an unice radices ductuum prope papillam in truncum confluentes, pro transversis habuerunt anastomosibus? an fabricam omnino veram, sed diversam a meis experimentis omnibus, etsi plurimos ductus lactiferos mercurio repleverim? Nunquam denique vidi pauciores quindenis, cum quinque vel sex habeat *Gutermann* p. 11. octo *Morgagnus Adv.* I. in *ic.*; septem & octo *Keil*; sex ad undecim *Heucher ars magn. anat.* n. 6. *Winslow* n. 19; sex ad novem *Nuck* f. 2. 3. 4. 5.; sex ad septem *Gunzius* p. 17.; Decem numerat *T. Bartholinus hist.* 92. *Cent.* I. & *Ravius* p. 100. Decem aut plures *Bartholinus anat.* p. 332. Decem & duodecim *Lieutaud* p. 211. *Verbeyen* T. XVIII. f. 2. Septem ad decem *Cl. Böhrmer* p. 10. *Ruysehius* unice multos vocat *Thes. Aff.* 3. n. 3. In balaena unicus ductus est eleganter margine crispo, fimbriatis ostiis, ne lac effluat *Thes.* I. T. IV. f. 5. 2.

g Experimentum passim habetur. Aqua ex arteria mammaria per lactea vasa rediit *Manget theatr. anat.* II. p. 168. & materies injecta p. 169. & idem experimentum successit *Albino*, & vicissim mercurius per ductus lactarios injectus, rediit per arterias *Nuck* p. 11. *Cowper* ad T. XIX, Nihil ergo indigemus obscuris illis *Vicussenii*

injicitur, inplentur venae & arteriae. Hinc lac, quando non coagulatur, potest in sanguinem redire ^h. Hi iidem ductuli, demonstrati a NVCKIO, conjuncti, faciunt unum ductum

senii adsertionibus, vasa lymphatico • nervea in cavitates glandularum vesicularium inferi p. 60. & multo minus propriis vasis chylosis, quae a ductu chyliifero ad mammas lac vehant, qualia *Everardus* habet p. 15. 117. 118. & in *Phil. trans.* n. 67. recensentur, repetita in mammis vaccarum a *Pascolo* III. p. 116. & in cane a *Lanzono anim.* 31. & *Zypaeo*. Olim negavit, vasa a ductu thoracico adire mammas *Auzout* apud *Pecquet* p. 157. & *Whartonus* p. 264. & *N. Stenonis de musc. & gland.* p. 46. & *Nuck* p. 20. & *Dionis Cours d'Anat.* p. 408. cum frustra in cane inquisivisset, & in femina, & constat nunc satis, lymphatica omnino a mammis, ut alibi in corpore, ad cisternam confluere *Böhmer* p. xi. Vidit autem vir Clarissimus vas lymphaticum ex parte hepatis convexa, euns ad cartilaginem ensiformem, juxta sternum edens ramos, & furculos inter tertiam quartamque costam a mammis accipiens l. c. In vaccis *Whartonus* viderat p. 260. tum *Needham* c. 1.

- ^h Non subito equidem, ut repetito expertus sum. Sexto enim a partu in infanticida mense lac flavum in ductibus lactiferis, & utcunque fluidum reperi. Sed redit tamen in feminis, quae pueros ablactant, uti pinguedo, in sanguinem, neque pergit secerni, postquam mammae prius ad tumorem saepe tumorem adfurrexerunt.

ductum majorem radicibus, & iterum in fine arctatum. Haec nunc vasa replentur lacte, & faciunt, ut mamma turgeat, absque sanguinis ope, nihilo enim plus sanguinis est in mamma puerperae, quam in alia quacunque aetate feminae:

Spongiosae) Papillae i spongiosa corpora habent, fere uti penis virilis, ea perinde a tenuitye adficiuntur, si confricata fuerit papilla.

Plura) Decem, vel duodecim, non in medio, sed in ambitu papillae terminati. Per hos ductus magna lactis copia exsilit, postquam semel a suctione pueri aperti fuerunt,

i Papilla cylindrus est, obtuse terminata, extus varie celliculosa & rugosa, rimosaque *Winslow* n. 20. spongiosa, fungosa, uti penis *Vesal.* p. 677. *Nuck* p. 25. quae leni contactu erigitur, & sanguine, quem roseus color praedit, tota turget. Fibras autem, duarum serierum, majores & minores, quas *Nuckius* p. 24. & ex eo *Cooperus* ad T. XIX. & *Keilii* describit p. 116. reticulatas, spatia spongiosa intercipientes *Nuck* f. 6. 7. 8. in quas sanguis effundatur, nondum satis notas habeo, neque fascias ligamentosas, ex quibus inprimis papillas componi *Winslowus* auctor est n. 18. Tota porro papilla plena est ostiolis ductuum lactiferorum, inter plicas collapsae papillae latentibus *Spigel* p. 268. *Ruyseh Thes.* I. T. IV. f. 4. inordinatim dispositis, ut in iconibus *Nuckii*.

k *Nerveae, in textu.*) Nervus princeps mammarum ex intercostalibus est, & ad quintum

fuerunt, neque unquam effluit ¹ in sana muliere, etiam si mammae plenissimae fuerint, nisi infans suxerit. Si vero suctionem duo, aut tres pueri continuaverint, poterit educi per mammas chylus maternus omnis, & ipse denique sanguis succedet: Sanguinem autem qui falsus sit, repudiat infans, neque pergit sugere.

Areo-

tum costarum intervallum exit *Vesal. p. 678.* quem fusius describit *Cl. Gunzius p. 22.* propria enim experimenta non habeo. Multos vero esse, ut *Whartonus p. 260.* & *Needhamus*, facile summa huius partis sensilitas demonstrat. Papillas denique mammarum in balaena primo detexit *Ruyschius Adv. II. sub fine*, ubi instar penicilli in multos villos dissolvuntur *Thef. 1. T. IV. f. 7. 8. 9.* Deinde ex femina ibidem *f. 1. 4.* & in mamma fetus optime vidit, amicus olim suavissimus *Ill. Bohlius de viis lact. n. 15.*

- 1 Non naturaliter certe, effluit tamen nutrimentis, maxime quando ablactant, tum gravidis, serosus humor, qui vestes maculet. Nempe ductus lactiferi, ubi per papillam adscendunt, longiores sunt papilla languente, hinc in plicas collabuntur, & oscula retrahunt, & resistunt liquori. Papilla vero a sanguine rigente in rectam lineam extenduntur, cum eadem, atque plicis deletis, leves tacti, facilius permeantur *Morg. Adv. V. p. 6. Winslow. n. 21.* Hanc causam esse confirmat modus, qua vaccarum ubera mulgentur, mera nempe & mechanica extensione *Winsl. l. c.*

Haec

Areolam ¹⁾ In ea cryptae sunt, quae succum mucaginosum & oleosum continent, ut papillae a pressione infantis defendantur.

Refectio) Vidi casus, in quibus cerevisia m crassior, quam jejuna nutrix biberat, post quinque minuta horae aegre elapsa per mammas efflueret, peragrato, in tantillo tempore, toto itinere in massam sanguineam

I Haec arcola tenerrima, & a pellucente sanguine subfusca cute fit. In ea tubercula sunt, verrucarum similia *Bidloo* T. XIX. f. 1. 3. sparsa *Morgagn.* *Adv.* 1. p. 10. T. 4. f. 2. in apice perforata *Morg. Winslow* n. 15. & obsita acinis sebaceis *Morg. Adv.* V. p. 13. *Boehmer* p. XVI. ex quibus cera secernitur papillam defensora, pili vero rarius prodeunt *Morg. Adv.* IV. p. 4. In iis tuberculis non raro lactiferos ductus aliquos minores desinere vidit in nutrice *MORGAGNI Adv.* I. p. 11. & *Adv.* IV. f. 2. c. c. in fine angustatos, in media glandula dilatatos *Adv.* V. p. 10. f. 2. & serum quasi lactis edere, pressos, & lac, sed rarius *Verheyen* p. 151. 152. serum denique perinde & lac *Winslow* n. 15. 16. In meis, non numerosis, experimentis, ductus lactiferi omnes in papilla hauserunt. An inde lac ex abscessu prope papillam aperto *Salmuth Cent.* II. *obs.* 12. Papilla denique etiam aliquas glandulas sebaceas proprias habet *MORG. Adv.* V. p. 15.

m Exemplum, ut vocant, in terminis, habetur in *E. N. C. Dec.* I. ann IV. *obs.* 15. sed vide *DCXC.*

neam, & per eam massam. Quamprimum enim fistulae evacuatae sunt, replentur a succedente humore, & a suctione laxantur, atque dilatantur. Quando mulier unum fortiozem fetum nutrit, aut omnino duos, eosque famelicos mammae adplicat diutissime post ultimam refectionem, mox mammae flaccescunt, ad linteorum modum; tunc, si puerpera biberit cerevisiam avenaceam dulcem, vel lac, inplebunturⁿ denuo mammae, eadem ratione, ac si spongia, lacte plena, in eas expressa foret. Vidi feminam, cui lac per totum biennium^e, absque intervallo, per mammas exstillavit, quae, quoties biberat, omne per ubera reddebat, &, nisi biberet, animo linquebatur. Eam peculiari methodo sanitati restitui, postquam toto biennio languerat.

DCXIC.

Quod) Primum lac, quod a partu elicitur, odore & sapore alio est, quam lac quod sequi-

ⁿ Post inediam sanguis ex mammis fugitur, replentur eadem a pastu, & hilaritate
Diemerbroeck p. 245.

^o Lactis tanta abundantia, ut post octo menses praeter eam copiam, quam puella consumebat lactendo, duae librae quotidie emulgerentur *E. N. C. Dec. II ann. 5. app* p. 475. Duodecim pintae lactis singulis biduis & triduis in puerpera *Weinreich*. In gravida mammae sponte per viginti septimanas lacte fluentes *E. N. C. Cent. IV. obs. 131*. Femina, cui per quatuordecim annos nunquam lac in mammis defuit *Bresl. 1723. M. Jun.*

quitur, & purgante vi praeditum, meconium expellit. Hoc privilegio carent principum pueri, qui continuo, ubi lucem adspexerunt, sugunt lac nutricum, quae jam aliquamdiu lactaverunt, his ergo meconium retinetur, unde multa mala^a

Lac) Humor inter humores corporis humani candidissimus, dulcissimus^b, ex quacunque

a Lac recentis puerperae mellus est pueris recens natis, quam lac, quod sexta a partu septimana genitum est *Mauriceau* p. 256. Ex lacte annuo, pingui & caseoso, aegrotant nuper nati pueruli *E. N. C. Dec. II. ann. VI. obs. 7.* Nam lac recentis puerperae tenuius est lacte aetate magis provectae, & ferosius, minus oleosum, paulum stimulans, saluberrimum *Morgan mechan. pract. of phys. p. 316. SPIGEL. l. c. HARVEL p. 204.*

b Hoc seculo causa & sedes hujus dulcedinis detecta est. Sal nempe essentialis lactis dulcis est, quem miror a *Praeceptore* in chemicis experimentis non proponi: in patria vero mea magna copia parant. Auctor est *Lud. Testi E. N. C. Cent. III. obs. 33.* laudator ex primis *Aloysius della Fabra de arthritide.* In patria mea paratur ex lactis sero, absque acido parato, incoctis ovis. Separato coagulo serum continuo coquitur, ne acescat, inspissatur repetito trans linteamina adigendo, donec omnis viscositas abigatur. Tunc hoc tenue serum denuo coquitur, et, quamprimum cuticula adparet, ab igne removetur, idemque in frigore repositum crystallos ponit albas sed ab aere ilavas, dul.

cunque materia paratus fuerit. Utrumque ab oleo habet, cum aqua diluto, quod ex cremore lactis adparet, qui carminatus butyrum exhibet ^c. Id oleum a chylo est: adeoque pars chyli maxime oleosa, lac est, reliqua lymphæ. Non negaverim etiam spiri-

dulces, neque acidas, neque alcalinas, neque cum utrovis sale effervescentes, in aqua solubiles, ab aere humiditatem non facile contrahunt. Conf. *mercure fuisse* 1734. *A. Maj* Haec praeparatio multo elegantior est, quam *Testiana*, qua fere sola evaporatione obtinetur sal dulcis, albus, friabilis, informis. An etiam notum hoc saccharum Brachmanibus? quos *Kæmpferus* ait, ex lacte saccharum educere nosse.

c Et in emulsionibus artificialibus manifestissimum est: ibi enim oleum recens vegetabile cum aqua tritum alborem & dulcedinem lactis perfecte imitatur. Hoc oleum specie globulorum adparet LEEVWENHOECK. & pinguitudinem lactis ex numero globulorum licet aestimare. In equae lacte paucissimi globuli sunt, plures in nutrice BONANNUS *microgr.* Plures in junioribus, pauci in vetulis *Lanzoni observ.* 79 B N C Dec. I. ann. I. *obs.* 31. Hos globulos pellucidos etiam *Hugenius* habet in *dioptr.* p. 175. & conf. CXXVII Levitate sua secedunt, & stipati cremorem album dulcissimum efficiunt, concussione vero coacti, majori aquae parte abacta coeunt in speciem solidioris olei, id vocant butyrum.

spiritus ^d adfundi, & lac perficere, & aliquid forte conferunt ad eam dulcedinem, qua humanos liquores omnes superat. Crassius autem lac est lotio, tenuius ^e vero quam sanguis, & sanguinis serum, unde fit ergo ut urina vias lactis nunquam subeat? non certe absque necessaria conditione, quae in partium fabrica latet, neque a sola canalis magnitudine pendet.

Serum) Quando lacti fervido aliquid acidum ^f adfunditur, coagulatur in unam
&

^d Spiritus ad lac adfundi *Wharton* p. 269. *Nuck adenogr.* p. 16. *Mazin Inst. med. mech.* p. 231 &c. Verum, uti hoc non negaverim, ita repudiare oportet spiritum ardentem, quem passim reperio ex lacte destillari. Fabulae origo est ex *Johannis de Luca* descriptione Tartariae: ex eo *Purchas* habet, post quem a *Lislero* repetita est *de hum.* p. 432. & a *du Halde descr. de la Chine* V. IV. p. 46. Disertius *Strahlenberg* Tartaros in pelibus lac equinum concutere, crassamentum exprimere, reliquum serum distillare, ita nasci ardentem spiritum, quem vocent *areki*. Addit *Isbrand Ides* bis vel ter destillari *in itin.* p. 237. Verum apud eundem *I. de Lucca* reperio, Tartaros lacti equino addere hordeum, & nunc demonstratum est, serum lactis non solum, sed cum frumento addito fermentari, adeoque farinae vegetabili unice pro aqua esse *Comm. Lit. Nor.* 1742. *hebd.* 24.

^e Neque enim ad ignem cogitur, sed exhalat

^f Uti notissimum est in alpibus, ubi unice
utun.

scissilem massam, quae colostrum ^{f *} vocatur, & de vase in aliud vas transfundi potest, ut ne gutta quidem destillet. Quando idem lac stat, sibi relictum, secedit pars ejus in tenuius *serum* ^g, ut vocatur: pars altera, caseosa, expressio liquido omnino in caleum abit, adeo durum, ut pene lapideus ^h fiat, sola repetita expressione per lintea, trans quae lapides inpositi lactis partem tenuiorem urgent, maxime, si butyrum prius separatum fuerit, neque enim caseus valde induratur neque fragilitatem deponit, quamdiu

utuntur coagulo ex vitulorum ventriculis parato cum sale *Scheuchzer* post *It. alp. I. p. 56. Boerh. Elem. Chem. Proc XC.* Ab omni vero acido lac cogitur, etiam integri adhuc Gallii flavi. Sed etiam in febre coactum legi *Schrader obs. 5. Dec. IV.*

^{f *} Colostra vel colostrum est primum lac a partu *Palladius* in novembri M. n. 13. *Spi-gel. de form. fet. p. 17. &c.* Tenuis, aquosum, albuminis colliquati simile est *Har-vei p. 199.* sensim crassescit p. 205.

^g Scythae lac concutiunt, secedit ad superiora butyrum (cremor), medium serum est, in imo densum quid subsidet, vocant Hippacem *Hippocrat. περὶ νοσ. 5.* Ex lacte serum & caseus *Aristoteles hist. anim. L. III. c. 20.* Hoc serum aquam habet, a chylo, & lympham, a sanguine & itinere per ductum thoracicum.

^h Vasa lactaria diuturniori usu obducuntur tartaro lactario terrestri durissimo *Scheuch-*

zer

diu butyrum admistum habet. Serum autem adhuc multum habet particularum nutritiarum ⁱ, inde enim homines robusti ali possunt, & ipse expertus sum, solo sero vitam trahi posse. Haec omnia & de brutorum, & de mulieris ^k lacte vera sunt.

Ex-

zer It. alp. p. 59. Lac in puero tabido specie tophorum egestum ex inferiori gutture BENNET *theatr.* p. 73. Calculus in ductus chyli ferri cisterna, le DRAN apud ILL. amicum BOHLIUM *de viis lacteis* n. 48. Haec vera terra est, conf. PRAECEPTOREM *Elem. Chem.* II. p. 301.

ⁱ Aqua casei, (nempe sero lactis) ARABES plurimum utebantur MESVE p. 148. op. omn. *ed. Juntin.* &c. Sero & quidem macilentissimo SCHEUCHZER p. 61. porci in albis unice saginantur. Hydrogala per tres annos solo puella vixit MISCC. BUCHNER 1728. p. 979. & I. FERGUSON octodecim annis aqua & sero lactis, & hordei decocto, vitam aluit, ex nuperis Anglorum commentariis. De lacte vulgo notum est, podagricos maxime vitam unice lacte trahere LOBB. *de calcul.* p. 270. & phthificos. Philinus, apud ATHENAEUM, dudum lacte solo, absque ullo alio cibo vel potu vixit.

^k Butyrum ex lacte feminino etiam obtinetur BORELLVS *Cent. III. obs.* 82. ita tamen, ut lac humanum valde dulce sit & tenue, serosius adhuc caprillum & eo tenuius asini.

Exhalat) Non bene adeo feminae pueris prospiciunt, quando lac, quo puer alitur, ad ignem prius excoquunt, fere per horam, donec imaginariam, quam accusant, cruditatem deponat. Depravatur enim coquendo, amissa parte fluidiori, salubriori, multoque salubrius foret ^l, si absque ullo igne, unice cum panis mica parvulis propinaretur.

Sponte) ^m Intra sex horas, quando is, qui nunc obtinet, coelo calor est (14. maji coelo satis aestuoso.

Ino-

asininum, vaccinum minime aquosum
LANZONI l. c. BOERHAAVE *Elem. Chem.* ll. p. 198. demum lac femininum minus de acida, plus de putrescibili natura habeat, homo enim est de gente carnivora. Non coit lac utrimque dentatis
ARISTOTELES l. c.

l Vaccini lactis recens emulsi odor omnino perit sola quiete, & nubes est particularum facile visibilium, quae de calente lacte adscendunt. Hinc Phthificis solet lac de mamma muliebri commendari fugendum, de quo nihil avolando periit. Caeterum calidius lac praestare, etiam HOFMANNUS auctor est in *physiologia*.

m Magis lac animalium carnivororum, sed & femininum. Recens autem emulsum neque acidum, neque alcalinum est, neque cum ullo sale effervescit ELEM. CHEM. *Proc.* LXXXIX.

Inodorum) Quando de lactis proprietatibus respondendum est, omnino semper odorem explore.

Chylus) Non tamen, qualis in ventriculo est, cinereus ⁿ, neque duodenalis chylus subflavescens, subamaricans ^o, neque ilei intestini, candidus & dulcis, neque mesenterici similis, cui lymphâ tenuis adfunditur, neque crudi, primumque in sanguinem admissi; verum chylus, qui per pulmones transit, & cui lymphâ tenuis intime conjuncta est. Neque enim alia via est, qua possit chylus ad vasa galactophora venire, nisi prius semel vel iterum per pulmones obierit circulum. Deinde ad chylum aliquid ^p de san-

ⁿ Idemque nimis acidus.

^o A bile admista.

^p Haec est pars mucilaginosâ lactis, & ab aqua, & ab oleo, & a sale, & a terra diversa GUTERMANN l. c. p. 14. quae, separato oleo & caseo, cum sero lactis conjuncta manet, & repetitis demum filtrationibus ita separatur, ut liberati sales secedere possint not. *b* Haec eadem & major ab adritu partium adtenuatio facit, ut lac retentum putrescat, maxime in genere carnivoro, caseus vero omnis sponte faeteat, verminetque, & acris, alcalinus fiat EL. CHEM. p. 301. DCXC. not. *aa*. Hac re a vegetabilium emulsione differt: Et inde forte natura lactis ab acido coagulabilis, lymphæ alias seroque sanguinis propria, qua destituuntur emulsa vegetabilia ELEM. CHEM. ll. p. 198. & Proc. 89.

sanguine materno accedit, multo chylo crassius:

DCXC.

Graviditatis) Feminae plerumque post finem mensium inpraegnantur ^a: id confirmant numerosa experimenta in Galliis capta: ex centum enim partibus omnino nonaginta & novem fiunt nono mense post menstrua ultima, numerando unam septimanam post menses ultimos, & ab ea epocha repetendo novem gestationis menses. Tunc enim uterus repurgatus & vacuus est, & exhausta plethora, neque metus adest, conceptum adeo cito expulsum iri. Nunc concepit utero femina. Sed fetus primo mense parvus & constrictus est, hinc plethorae materia, post tres septimanas reparata ^b in uterum deponi nequit, adeoque sanguis regurgitans abit in vasa, quae cum utero communicant, & distendit mammas, & eo ipso signo, etiam prius, quam menses emanferint, dignoscitur graviditas ^c. 1732. quando primum tempus mensium emanfit, tunc mammae intumescunt,

Par-

^a DCLXXVI. not. *m*.

^b Cum menses viginti unciae sint DCLXVII. not. *c*, fetus vero uno mense a conceptu tantum unius drachmae DCLXXVI. not. *c*.

^c Inpeditis quocunque modo vasis inferioribus, sanguis ad superiora regurgitat. Fetus non sanus est, si lac in gravida abundaverit HIPPOCR. *epid.* ll. f. 6. *Aphor.* V. n. 52.

CELSUS L. II. c. 7. nempe plethoram ad uterum vergere necesse est, ut fetus incrementa capiat. Praegnantibus menses pauci vel nulli, nam lac ad mammas fertur HIPPOCRATES *περί γυναικ. α.* MAURICEAU p. 137. Et primo quidem gravidis paulatim mammae turgescunt, atque plerumque dolent, quod saepe graviditatis signum est DIONISII ib. p. 153. & lac incipit apparere, quando fetus movetur MAURICEAU p. 92. serosumque stillat DIONISII *des accouch* p. 155. E. N. C. vol. 4. obs. 66. aliquando vero etiam in gravidis verum & copiosum adest E. N. C. Dec. II. ann. 2. obs. 99. (aliquando tamen nullum SCHURIG. *syllaps.* p. 416. 417.) Hinc mortuo fetu mammae gracilescent HIPPOCRATES *aphor.* VI. n. 39. LANG. *epist.* p. 670. MANNINGHAM p. 19. Simili modo a mensibus subito suppressis repentinus mammarum tumor successit Lanzonus obs. 190. & vetustus aphorismus est, si mulieri neque praegnant, neque puerperae, lac in mammis fuerit, ei menses desunt Hipp. *aphor.* V. n. 39. Et vicissim, a mensibus vel haemorrhagiis mammae gracilescent LOMM. obs. L. 2. E. N. C. Dec. II. ann. 4. obs. 154. Sed etiam in hydropse, qui pro graviditate inposuerat, mammae intumuerunt Schacher *de virg. ascit.* p. 23. & cum mola lac in mammis fuit Hipp. *περί γυναικ.* Mauriceau p. 114. Fick *Comm. nor.* 1732. h. 20. Invenio equidem Littrianam feminam Mem. de l'Acad. 1702. & quam descripsit Cyprianus, & ea, de qua Calvi agit hist. de l'Acad. 1714. cum fetubus tubariis nullum in mamma lac habuisse, sed hoc ad

Partu) Tunc plethora, solita ferri ad uterum, eo nunc contracto, ad mammas refluit: &, quamprimum lochiorum copia imminuta est, mammae turgescunt ^d.

Largiora) Pleraeque feminae nobiles sperant se formae elegantiam conservaturas esse, si infantem non lactaverint. Verum nos quidem homines natura non sumus sapientiores. Sed NATURA nullas reginas creavit, neque dignitas civilis aliquid in corporis fabrica mutat: feminas ergo fecit DEUS, quas homines vocant reginas. Hae adeo reginae perinde tertio gestationis mense, & iterum a partu inflatas mammas habent, sed repellunt medicamentis id lac, quod debent puero. Hoc consilium, si feliciter evenierit ^e, lochiis abundantibus reddit obnoxias, atque menstruis omni mense recurrentibus. Quae vero infantes lactant, eae lochia ^f minus copiosa patiuntur, & omnia puer-

ad miserum statum refero, in quo hae feminae fetum extra uterum habentes, vicitaverunt. Deinde cum mola lac adesse negant *Dionis des accouch.* p. 184. *Fasch de mola* n. 22. Verum obposui experimenta, & iste fatetur, uti nec ipsi vicissim negaverim, hoc lac aquosum esse.

d DCLXXXVII.

e Nam inter causas est inflammationis uteri & funestiarum febrium puerperalium. Confer de noxis lactis repulsi *Bellingerum in append*

f DCLXXXVII.

g Nutrices vix menses patiuntur, *Arist. hist. anim.* L. X. fin. certe vix, nisi post octo-

puerperii symptomata mitiora, mensesque & omnino nullos, quamdiu lactant.

Lactis) Corpora feminina arterias & venas omnes, & imprimis uterinas & mammarias adeo laxas nata sunt, ut omnis pars sanguinis, quaecunque ad obeundam per corpus circulationem minus apta fuerit, continuo, vel ad uterum deponatur, vel ad mammas, magis vero ad mammas, a quibus resistentiam suctio aufert: idem enim fere suctionis, qui *Boyleanae* anthiae effectus est ^b. Tanti certe suctio est, ut mammae siccae maneant, nisi exsugantur. Haec causa est, quare chylus, nondum i aduetus permeandis vasis humanis, adeo facile in mammas illabatur.

Sponte vix) Raro id contingit, ob rationem jam propositam, & collapsam substantiam cavernosam papillae, quae ductus lacteos comprimit. Quando vero puer fugit, removet a papilla pressionem externi aeris, expanditur substantia cavernosa papillae, & sanguis eo ruens inplet cellulas, aperit-

decim a partu menses *L. Bourgeois* I. p. 165. Vicissim lac, si quando in menstruatibus fuerit, malum est la *Motte obs.* 87. Aliquando tamen cum lacte etiam menses fluunt, forte in valde plethoricis *Lamy in diss. anat. Ortlob oecon. part.* p. 107. *Harder prodr. phys.* c. 10. Conf. DCLXV. not. b.

h DCLXXXIIX.

i Cujus globuli, & majores & laxiores sunt, quam sanguinis globuli, ex utraque causa inpermeabilis.

aperitque ductus galaetophoros, in quos nunc lac facile subit, adtractum sugendo.

Saltu) Aliquando ad unum, & duos & tres nonnunquam pedes ^k. Ratio haec est. Papilla sibi relicta vix dimittit lac, & conivente spongiosa fabrica sua constringit oscula vasorum galaetophororum. Quando vero papilla, per suctionem titillata, arrigit, percita quadam tentigine, tunc recedit fabrica spongiosa a ductubus lacteis, & per istos, nunc liberatos, lac exsilit.

Acescat) Quia chylus est, crudusve humor, chylo proximus ^l.

Viris) Exempla habent SCHENKIUS, DONATUS in historia medica mirabili, & alii, qui de mulieribus scripserunt. Neque hoc nobis debet mirum videri, nam viri chylum conficiunt, qui pene lac est, & solo

^k Ex plenis vasis utique humor cum saltu exsilit, etiam ex salivalibus, ut vulgo notum est.

^l Panis & pleraque vegetabilia acescunt. Hinc chylus acidus est, & in ipso sanguine vestigia hujus acidae indolis supersunt. Pus ipsum acidum olet *Quesnai de la Saignée* p. 169. 195. Formicarum succus cichorium rubefacit *Rai Phil. trans.* 68. In carnivoris autem animalibus, canibus, felibus, leonibus, lac acre & urinosum est *Boerh. Elem. Chem.* ll. p. 297.

solo lacte nutrimur omnes ^m, quocunque prius usi fuerimus cibo, prius enim quam nutriat, chylus in lac abit. Deinde viri habent mammas, papillas ⁿ, areolas, eodem loco, & eadem fabrica factas, quae in feminis est, unice minus laxas mammas, & minus turgentes humoribus. Ergo, si vasa mammarum, quae in utroque sexu eadem adlunt, in viris dilatata fuerint, lac in mammis certe nascetur. Vir fuit, pauperculus ^o, cui carissima conjux mortem obierat, reliquerat infantem, qui mamma sua privatus noctes diesque ejulabat. Miseratur puelli pater, adplicuit propriae mammae, fuxit infans avi-

^m Chylo nempe, qui aliquamdiu lactis habitu per sanguinem circumfertur, donec in serum fiat cxxxviii &c.

ⁿ DCLXXXVIII. Aegyptiae omnes mammosiores P. ALPINUS *hist. nat. aeg.* I. p. 14. b.

^o Simile exemplum reperi apud S. Boccone *offerw.* p. 194. & aliud ex Santorello apud Diemerbroeck p. 249. Sed in universum lac ex virorum mammis stillasse plerumque aquosum, serosum, auctor est *Aristoteles hist. anim.* L. III. c. 20. Virorum papillis adtrectatis ros aliquis effluit *Iason a Pratis de uteris* p. 142. Lac de mammis virorum stillare viderunt *Lacuna* apud *Rod. a Castro de nat. mul. praef.* *Carpus* (ad uncias quatuor una vice emollas) p. CCII. b. *Cardanus de subtil.* L. XII. *Vesalius* p. 673. *Cyprianus* p. 19. *Helwig.* *Franciscus Maria Florentinus* libello proprio,

avide , atque adeo vir in nutricem evasit.

Virginibusque) *p* Ratio eadem est. Hic Leidae exemplum contigit. Ancilla honestissi-

prio, E. N. C. Dec. I. ann. 8. obs. 86. & iterum ann. II. obs. 135. Cent. I. obs. 86. Vol. 4. obs. 68. copiosum, Keil p. 117. Morgagnus Adv. I. p. 11. V. p. 3. Ill. Teichmeyer med. for. p. 38. Venette p. 51. in medico, Lanzinus animadv. 31. & de se ipso testis est Bianchi apud Manget. theatr. II. p. 174. apud Russos vero frequenter viros lac in mammis habentes reperiri Duvernoi Aët. Petr. Vol. III. & in Africa Charleton. Vide compilationem ex C. Gemma, aliisque apud Marcellum Donatum p. 610. 611. Cornelium Consentinum p. 204. & Francum Sat. XV. In capro lac Aristoteles l. c. cum mammae urtica confricarentur. In lepore mare lac E. N. C. Dec. III. ann. 5. 6. obs. 88. Canes & feles mares, qui catulos aluerint proprio lacte M. Donatus, Boccone l. c. p. 200. Tres hircos lac exhibentes mulgentibus, serio recenset P. A. Matthioli epist. p. 244. & alium hircum Lentilius E. N. C. Dec. II. ann. 8. obs. 230. & Schwenkfelt theriotr. files.

p Lac in virginibus nullum esse Aristoteles auctor est, qui negat lac nasci, nisi femina utero tulerit Hist. anim. L. III. c. 20. Sed aliqua tamen passim exempla in contrarium reperiuntur in feminis, neque gravidis, neque puerperis E. N. C. Dec. I. ann. III. obs. 136. Harder prodr. phys. & ca-

stiffima, quae neque conceperat unquam, neque pepererat, cubabat cum herilibus infantibus, lecti socia. Pertaesæ nocturnarum ejulationum, & somni expers, adplicuit tener-

caniculis *Vol. 2. obs. 121.* In virginibus exempla habent *Alex. Benedictus, a Vega, Forestus, Corn. Consentinus l. c. T. Barth. hist. 27. Cent. I. Salmuth obs. 92. Cent. I. Mangetus l. c. p. 172. Morg. Adv. V. p. 3. & collectionem habet Cl. SCHACHERUS Polycarpi f. in progr. & FRANCUS Sat. XV.* Virgo nigrita puerum lactavit *Venette p. m 51. 52.* Catellam, quae nunquam pepererat, felis ita emulfit lactendo, ut lac daret *Kerkring. obs. 21. & in capra virgine simile exemplum habet Craanen oecon. anim. p. 728. tum Boccone l. c. p. 201. Schurig sylleps. p. 412.* In vetulis vero *Aristoteles l. c.* exempla refert. In vidua quinquagenaria *L. Bourgeoise v. 9. & E. N. c. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 86. in femina 64 annorum Muralt coll. anat. p. 56. Quinquagenaria nutrix Henr. ab Heers obs. 14. Sexagenaria nutrix I. M. Hofmann E. N. c. Cent. X. app. obs. 44.* In femina 68. annorum lac ea copia natum, ut gemellos nutriverit *Phil. Trans. n. 453. & in octogenaria, ut puerum aleret Aët. Suec. 1733. p. 86.* Avia nepotem lactans *Diemerbroeck ex Santorello l. c.* Confer exempla apud *Meibium in physiol. p. 568. tum Bartholinum Cist. med. p. 250. & Francum l. c.* Non ignoro Cl. *Manninghamum* fluorem ferofum ex mammis feminarum a retentis menfibus stillantem non pro lacte habere

tenerrimum infantem uberibus virgineis. Suxit puer verum lac, atque repetito conatu nutricem fecit, quae expers fuerat conjugii. Re detecta, suspecta habita est temeratae pudicitiae, atque recentis puerperii: sed honorem adseruit accurata inquisitio, obfetrices enim utique vestigia partus facile reperissent.

Foetui)

p. 45. quale serum acre ex mammis virginis describitur in E. N. C. Dec. III. ann. IV. obs. 83. Sed verum lac est, quod pueros nutrit.

q Res ipsa undique confirmatur. Serum tenue in turgidis mammis puerorum esse, & posse exprimi *Spigelius* l. c. c. 16. primus inter eos vidit, quos legi, deinde *Riolanus* p. 409. *Bartholinus* epist. ad *Horst.* p. 86. *Harvei* exerc. 55. *Bohn.* p. 29. *T. Cornelius* Conf. progr. VI. E. N. C. Dec. I. ann. 8. obs. 86. Vol. 5. obs. 131. *Bresl.* 1724. p. 216. pro re nova, *Morg. adv.* V. p. 3. *Franc. Mar. Florentinus* l. c. *Gutermann* Comm. Lit. 1734. hebdom. 16. *Hebenstreit* progr. ad anat. mul. *Lanzon* obs. 65. conf. *Francum* l. c. p. 249. Neque subito haec proprietas evanescit, nam in triduoano puero *Buchner* misc. 1729. p. 189. *Spigelius* l. c. in trimestri filia lac vidit *Craanen* p. 127. in puella octodecim septimanarum copiosum lac fuisse legitur in E. N. C. Dec. II. ann. 9. obs. 139. in bimulo fratre lac in mammis vidit *Winslow* Expos. IV. n. 24. in novenni puero E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 86. In minorenni puero *Bartholinus* anat. renov. p. 333.

Fœtui) Omnis recens natus infans, quot-quot vidi ^a, five mas, five puella fuerit, mammas lacte turgidas habet, & papillas erectas, durissimas, quas emulgendero, & exprimendo, vel exsugendo, nutrices evacuant, ne stagnans liquor noceat. Tunc perfecte humor exsilit, qualis in mammis matris est, primo a partu die. Bos enim, postquam vitulum enixa est, altera die lac dat emulsa, vocant *bieß*, insigniter diversum a lacte, secundum naturam habente. Hujusmodi lac etiam in mammis fetus est, & etiam extuctum aliquoties redit, donec post aliquot dies exsiccet, uti in feminis, post ablactionem, lac evanescit. Unde hoc fit, & cui bono? Causa manifesta est, licet a nemine explicata fuerit. Fetus mammae semper lacte pellucet, quando recens in lucem editus est, & miri morbi fiunt, nisi expressum fuerit. Videtur hoc modo responderi posse. Quidquid glandularum est, id in fetu majorem longe molem ^s, quam in adulto, obtinet. Thymus ^t in fetu pulmonis lobo non multo minor est, & habet ingentem aperturam, qua in oesophagum aperitur, eoque lac deponit, certe ita se reperisse scripsit ad me magnus inter nunc super-

^r Et apostemata faciat *Spigelius* l. c. *Gutermann* l. c. Receptum esse, ut exprimat^rur serum de infantum mammis *Mauric* obs. 189.

^s DCLXXXII. not. i. k.

^t DCLXXXII. not. l. De ductu vero, quo in oesophagum pateat, nihil inaudiui, neque probabile videtur.

superfluites Anatomicus. Senfim autem minuitur, ut in adulto nullus v. superhit, & perit absque vestigio glandula, adeo ampla, quae in fetu requirebatur, in adulto homine inutilis est. Ita etiam mammae in recens nato magnae sunt, in utroque vero sexu dispereunt, ad pubertatis annos usque, nam eo toto tempore puellae mammae nihilo pueri mammis ampliores sunt. Utilitas autem hujus lactis in fetu secreti obscura est. An infans se ipsum in utero fugit *? flexilissimo enim, dum in utero habitat, corpore est, & sedet capite prono, & incurvato. Consului de hac re RUYSCHIIUM, rescripsit, se lac perinde in mammis fetus reperire, inquisitionum autem esse, an omnino fugat, si fortuna fetum vivum in matre mortua spectandum offerret. Sed ab eo tempore nulla oportunitas oblata est, & illum nunc fata abstulerunt. 1732. An discernitur ex mammis liquor, qui in cavitationem amnii effunditur y? Videtur hic aliquid subesse incogniti.

Solum) Qua lac chylo proximum, neque haecenus in alcaliscentem naturam, humoribus nostris propriam, degeneravit.

Cremorem) Adparet ex chemica emulsione. Quando amygdalae, hordeum, oryza; cerca-

v Exiguus, mistus, & obrutus pinguedine.

x Ita fere *Bialoo Exerc. V. Dec. II.* Verum mihi hae ambages valde inutiles, & absque exemplo videntur, receptum nempe semel succum, iterum ex corpore excerni, ut denuo ore receptus in alimentum cedat.

y BOHN p. 29.

cerealialia reliqua, vel semina cucurbitacea, frigida vulgo, majora, & minora, teruntur cum aqua, oleum miscetur aquae, & fit perfectus chylus. Quando lac istud sibi relinquitur, fursum intra quindecim horae minuta secedit cremor, serum ima petit, eadem fere ratione, in homine, oleosa ingesta cum tenui lymphâ trita, in chylum abeunt. Caseus vero in emulsione nullus est, neque enim hic ex chylo generari, sed a lacte materno secedere videtur ^z. Hinc ex lacte crudissimo caseus minus bonus paratur, & ex eo demum lacte optimus ille caseus, quem Wallones vocant *Remouden*, parari potest, quod diu in materno sanguine manserit. Hic caseus destillatus eadem principia edit, quae ex cornu cervino, vel ex humano sanguine per ignem obtinentur: & in solo aere caseus per temporis moram ita putrescit ^{aa}, ut prae acrimonia causticus fiat, cutemque inpositus, erodat. Illiusmodi etiam casei parantur in Hollandia boreali.

Tempore) Vulgus persuadetur, multique cum vulgo medici, lac unum, definitum suis proprietatibus, liquorem esse. Verum, uti urina, ita lac, omni fere hora aliud fit. Experimenta feci, maximo cum successu. Si mulier, quae tota nocte siticulosum infantem

^z Non repugno, terram, quae cum cibis accipitur, uti salivae, & urinae, & bilis, perpetua comes est, ita lac comitari
DCLXXXIX. not. *h*.

^{aa} Etiam lac putrescit & verminat BOYLE
exp. phys. mech. cont. p. 133.

fantem lactavit, eo toto tempore nihil biberit, mammas habebit flaccidas, sitim vero patietur maximam, & solent dicere nutrices, nulla majori voluptate se adfici, quam a potu, sub ea tempora hausto. Si vero nihil biberit, & tamen puerum matutinis horis mammae adplicuerit, renuet ille lac ingratum. Bibat tunc, continuo flaccidae mammae turgebunt, & infans avidus lac hauriet, quod non fuit in sanguine cum iis qualitatibus, cum quibus ab infante fugitur, adparuisset enim, si tale adfuisset, sed a potu, post unam alteramve circulationem dilutum & mutatum, in ubera venit, neque ideo totum crudum est, cum pars circulando praeparata admista sit.

Communicet) Quod nutrix peccat, infantem necesse est luere, purgari, si purgans medicamentum adsumserit, laborare, si spiritum vini ingesserit. Id vero tunc fit, quando ubera inania fuerunt, non perinde, quando edit vel bibit mammis jam parato lacte turgentibus: si enim mammae plenae fuerint, infans, etiam si nutrix vinum biberit, continuo mammae potest adplicari, neque enim novum chylum, sed lac extrahet, pridem paratum. Quando vero fugit ex inanibus mammis, recentissime repletis meraco potu, sitibundus & avidus, venenum adtrahet. Vidi nobilem puerum, cui sanissima nutrix erat, horrendas pati convulsiones, nullam causam tanti mali reperiēbam in tenello corpore. Sed adstare vidi aegro hilarem & quasi temulentam nutricem, & rogavi, num biberit? adfirmavit. Porro interrogavi, quo tempore po-

T.V. P. II. *F f* *stre.*

stremum mammam puero exhibuerit? reposuit, id a prandio factum esse. Iterum quaelivi, an prius puer bene valuerit? adfirmatum est. Ergo contuli ructus & convulsiones pueri, cum confessionibus nutricis, & accurate vidi, puerum ebrium esse, ea vero aetate ebrietas pene lethalis est, & difficillimum expertus fui laborem, ut omnibus ex arte factis puerum servarem. Persuadeor omnino, in aulis & apud ditiores, ab his meracis nutricum potitationibus longe frequentiores, quam creditur, puerorum mortes accidere, atque adhuc frequentiores primariorum puerorum morbidas debilesque constitutiones. Casus funestus in aula accidit; Medicus nutrici principis medicamentum purgans exhibuerat, & negligentior, oblitus fuerat monere, ne continuo, neve ante octavam a sumto pharmaco horam principem puellum uberibus admoveret. Inscia adeo misera lac praebuit principi: is suxit avidè totam ex nutrice vim pharmaci ^{bb}, inciditque in hypercatharsin, qua
ex-

^{bb} Exempla passim exstant. Infans purgantis, quod mater adsumerat, effectus passus T. BARTHOL. *Cent. II. hist. 93.* MARTIANUS apud LANZONUM *Vol. III. p. 484.* Ex esu gratiolae lac vaccarum purgans, & ob eam causam aliqua Ebroduni, (ubi omnino plurimam crescere vidi) prata neglecta VIRIDET *de prim. coct. L. I. c. 15.* Lac amarum ab absinthio A. *Hafn. Ann. II. obs. 62.* Lac ovium Provinciae thymum redolet *Zod. Gall. ann. IV. M. Mart. Croci in lacte color*

extinctus est. Si monuisset medicus, quod hic moneo, extra omnem fuisset culpam. Contrario vero errore medici, saepe lactuca, vino, cerevisia, & reliquis acidis nutritrici interdiciunt, quae tamen nutritricibus saluberrima sunt, cum unice oportuisset monere, ne continuo a pastu, huiusmodi crudis cibis adsumtis, nutrix, cui mammae inanes sunt, infantem mammis adplicaret: ea enim omnia lac octava postea hora adsumtum minime corrumpent. Quando vero mulier tota exhausta, cerevisiam meracissi-

color *Lanzon. anim. 31.* Lac vaccarum inpraegnatum alii viribus *Lobb de calcul. p. 267.* & vulgo notum est, cepae alpinae tenuifoliae sapore quorundam montium butyrum, & ipsos infici caseos. Haec demonstrant, lac de chyli natura multa retinere. Sed morbi a matre in infantem transeuntes vicissim demonstrant, multum etiam de materno sanguine in eo esse. Febricitanti lac corrumpitur, & flavum fit *Elem. Chem. II. p. 302.* Lac in lue boum tenue, flavum *ib. p. 303.* Icterus cum lacte in puerum transit *E. N. C. Cent. I. obs. 90.* & de lue passim experimenta leguntur. Aliquando tamen video dirissimos morbos maternos, lactenti puero nihil nocere. Vidi in febre miliari, in lue venerea matres pessime adfectas, innoxium lac praebuisse parvulis. Vaccae rabidae lac minime malum *E. N. C. Vol. VI. p. 321.* & a matris peste decumbentis lacte nihil in infante mali *Stalpart van der Wiel Cent. I. obs. 99.*

cissimam bibit, ex eo genere, cujus cadus octo, & decem florenis venditur, mammas utique lacte plenas habebit, & sentiet pressionem novi chyli, ad mammas vergentis ^{cc}. Si vero tunc puellum uberi adplicuerit imprudens, convelletur infans, miris modis, & verissime ebrius erit ^{dd}. Ita saepe ex culpa bibacis mulierculae, miselli pereunt. Nam cerevisia & alii meraciores cibi, vix mutati ad mammas fluunt, omni nunc fere exhaustas liquore.

Optimum) Aliquot a pastu horis lac optimum est, neque crudum, cum duae sanguinis unciae intra viginti quatuor horas 14400ies circulationem obeant, atque adeo numerosissimis vicibus chylum per pulmones ivisse necesse sit, qui quarta hora ex mammis exsugitur. Hoc ipso tempore fetus, qui alimento eget, mammis optime adplicatur.

Abominabile] Si nutrix, viginti quatuor integris horis neque ederit, neque biberit quidquam, quale jejunium sectae aliquae, antiquissimos ritus secutae, inperant adscelis; & aliquando etiam nostris accidit, si febr

^{cc} Quasi ad modum laquei superne ab axillis adtraheretur STAHL. Dolores a dorso versus mammas, lactis iter demonstrantes DIEMERBROECK p. 242.

^{dd} Vinum nigrum sincerum ex mamma *Lanzoni obs.* 131. E. N. C. Dec. III. ann. 4. obs. 75. & cassia *Kohlhans* apud *Horst. Epist.* X. *Zod. Gall.* l. c. & cerevisia E. N. C. Dec. I. ann. IV. obs. 15 Ex cerevisia a nutrice sumpta puer hydropicus *Bartholinus* l. c.

febri aliqua adffictae ad cibos nauseaverint : tunc lac habebit nulli infanti potabile. Si octava matutina nutrix cibum sumnerit, infans ad decimam horam a meridie lac admittit ^{ee}, post eam horam, & nutricis jejunium quindecim horis longius, refugiet mammam, si mater voluerit admovere, & perget ejulare, frustra oblatis uberibus. Hoc, adeo vetustum lac, emulctum adparet dilutum, subflavum, falsum, Belgae nomine ab aqua marina desumpto vocant *braack*. Hae lactis mutationes explicatu minime difficiles sunt. Omnis fere chylus noster & potus acescit, & oleosam indolem habet, sed vis corporis humani destruit omne acidum, oleum vero omne adtenuat, & utrique inducit naturam nostram falsam, quae vergit in falsum urinae elementum. Ita homo, qui lac vegetabile bibit, non lac, sed urinam minget, flavam, falsam, ut omne illud blandum, dulce, album lactis penitus deletum sit prius, quam chylus per vasa renalia transeat. Eadem ratione chylus, quando viginti quatuor horis per mater-

^{ee} Lac intra duodecim horas perfecte paratum est, bis enim vaccae de die emulgentur *Elem. Chem.* II p. 300. Diutius retentum & in vaccis corrumpitur, & in feminis : atque facillime indurescit. Flavissimum in infanticidae mammis, & parum fluxile vidi. Inde etiam, quod febrientes & esurientes lac tamen habeant, demonstratur, lactis partem non minimam, ex humanis liquoribus esse. An soluta pinguedo? Ita *Hofman. Physiol.*

ternum corpus circulationem obiit, abit in ichorosum, falsum, urinosum lac, quod oblatum puer non solum respuit, sed fere in convulsiones incidit, adeo irascitur tam horribili alimento, quod ipse fieri vidi, cum nutrices nausea febrili laborarent. Si vero cum adeo malo lacte, nutrix ptisanam hordeatam biberet, aut cerevisiam, continuo bonum lac reddet.

Vitui) infantes raro alio, praeter lac, cibo utuntur, ergo quidcunque tenellis acciderit, causam suam in lacte oportet habuisse. Quando infans variolis, aut ardente febre laborat, tunc convenit lac acidulum, & huiusmodi etiam alimentum nutrici dare oportet. Abstineat ergo ab ovis, a piscibus, & carnibus, haec enim alcalescunt omnia, & putrescunt; deinde a salinis & biliosis. Nam etiam sponte febris nimis profunde haeret, & si eo tempore nutrix opipare viveret, affatis carnibus, atque meraco potu uteretur, flammae certe adfunderet oleum. Si vero tenui victu usa fuerit, lacte v. g. ebutyrato pro potu, & ptisana, pro cibo vero pane, milio, oryza, avena, tunc pulchre habebit infans. Porro in hoc casu, infantem continuo a pastu, vel non serius quam semihora, nutricis mammis oportet admoveere, ut quam crudissimum chylum sorbeat, ante, quam aescens adsumtorum indoles superata sit. In hoc enim malo, quando alioquin vis vitae super legitimos fines in infantibus valet, ea dare oportet, quae hunc adtritum doment. Si vero in infante pallor adfuerit, morbus frigidus, & acidus, & anima, sudorque, & alvi faeces
aco-

acorem spiraverint , & tormina infesta sint, nunquam malum ita sanabis , quin perpetuo recrudescat , nisi lactis materni acidam indolem mutaveris , neque obtinebis fidelem victoriam exhibitis cancerorum lapidibus , semper enim renascetur , atque ad mortem usque molestum erit acidum. Ergo pene integre pane abstineat nutrix , pisces edat , carnesque , & bibat rubra , meraca vina , neque mammam praebeat puero, nisi sexta a pastu hora , quo tempore adsumpta fere in naturam nostram abierunt.

Bonum infantis) Medici aulici , quibus infantum regionum nutrices eligendi munus incumbit , solent lactis guttulam in cochlear aureum , vel argenteum , destillare , tunc , si consistit gutta , lac pro bono , & cocto habetur. Porro colorem subcoeruleum esse ^{ff} oportet , album enim lac nimis crassum est. Sed odor omnis debet abesse & sapor salsus omnis , atque dulcedo apparere , qualis in saccharo est. Verum his omnibus optime constitutis , misere tamen falli potest medicus. Vidi optimas nutrices rejectas fuisse , & electas pessimas : nam , cum fortuna nutricum , & totius familiae ab ea electione pendeat , vix aut edere audent , aut bibere , ante explorationem , ne forte aliquid in cibo vel potu admittant , quod lacti noceat : Deinde anxiae accedunt. Sed cum his conditionibus lac feminae sanissimae

^{ff} Lac albissimum , mediocris consistentiae optimum est *Mauriceau* p. 528. & melius semper , quod tenuius la *Motte* l. c. 33. *Hofman.* in *phys.* F f 4

simae falsum erit, & aliquid habebit de urinae odore. Cum hujusmodi nutrix mihi exploranda permetteretur, jussi edere & bibere miseram, & post aliquot horas redire, rediit onusta lacte optimo.

DCLXXXI.

Dilatatur) Omni modo nititur infans, ut aerem capiat ^a DCLXXXV. & talpae modo movetur per omnes angustias, quod matres & obstetrices experiuntur, neque quiescit, nisi fatigatus. Nunc hunc fetum aer extus adluit, ergo, quamprimum pectus dilatavit, momento citius subibit pulmones ^b, & ita mutabit ^c, ut per totam vitam hujus mutationis effectus supersint. In hac prima respi-

^a Catellus caesarea sectione excisus continuo haviit & respiravit *Boyle exper. phys. mech. p. 41.* Cur vero fetus primum respicit? Varie responderunt varii. *Thruston* irritationem adducit faecum alvi, & partus vehementem motum, hinc natam in sanguine luctam p. 96. 97. *Swammerdamus* nescio quam irritationem diaphragmatis ab humoribus, nescio quibus, sanguini admistis supponit p. 73. *Pitcairius* ab aeris pondere & elatere deducit nitente in pulmonem fetus aere destitutum, sic restituyente aequilibrium cum aere externo, ut pectus nunc dilatari queat. Mihi evidens videtur esse, quod vagitum moliatur, in loco incommodo, ubi varias afflictiones patitur, adsuetus mollissimis aquis, a frigoris contactu &c.

^b DCVIII. not. c.

^c DCVII. not. c.

respiratione primo aqua & mucus ex naribus & ore fetus erumpit, in secunda vero inspiratione, jam aer pulmones subit.

Explicat) Egregia habemus de hac re ⁴ experimenta, cum inprimis inter duos celebres anatomicos Amstelaedamenses controversia exarsisset, & magistratus imperium accederet, tunc enim tota res ex imis excussa est. Femina extra conjugium puerum pepererat, is mortuus repertus est, & mater infanticidii accusata. Cum autem aliqua vacillatio esset, & rea scelus perfricte negaret, atque contenderet fetum suum in utero periisse, quaesivit ex medicis Magistratus, an possent hoc dubium ex arte sua expedire. Annuerunt medici, re perpensa, atque edixerunt, si fetus ante partum in utero mortuus fuisset, tunc pulmonem in aqua fundum petiturum, (haec autem reae defensio erat), atque adeo crimine matrem liberaturum fore. Si vero idem fetus vel semel respirasset, atque adeo vitalis editus fuisset, tunc, aiebat peritissimus medicus, fore ut pulmo in aqua nataret. Experimentum factum est, & pulmo innatavit. Contra conclusionem vero medicorum patroni causae magnam vim dubiorum moverunt. Verum recte omnino medici. Quamdiu fetus in utero vivit, aerem nullum haurit, hinc pulmo fundum petit; quando vero respiravit, tunc aquae innatat. In ipso fetu, si quidquam inanitatis esset, pulmo nataret, caro enim sanguinis pondus non superat, qui
tan-

tantum una duodecima parte pondus aquae excedit ^e. Verum totus pulmo fetus una, continua, compacta caro est, & frustra certe embryo elevaret pectus & septum deprimeret. Nullus enim adest aer, qui subeat, & ipse potius liquor amnii in os fetus influeret, &, si fieri posset, ut uterus dilataretur, ipsa ea aqua veliculas pulmonis repleret, uti aer solet. Quando vero aerem hausit infans, totus pulmo inflatur, & unica etiam inspiratione ita disponitur, ut nunquam hanc conditionem penitus amittat. Nam etiam ii pulmones, quos in vacuo Boyleano aere privasti, tamen supernatant aquae, neque unquam subsidunt. Ergo respiratio pulmonem specificè leviores reddit: nempe facit, ut distantia vasorum sanguineorum augeatur, & minimi extremi fines bronchiorum, atque Malpighianae veliculae a se invicem recedant, & omnes arteriae pulmonales in eadem ratione ampliores reddantur, in qua thorax dilatatus est, & liquida pro portione totius massae, minorem rationem habeant. [1732. evacuari arterias, & generari in ipsis vacuum Boyleanum, & una cum bronchiis ita

^e CCXXIV. not. a. Omnes partes corporis humani fundum petunt, totusque, ut saepe vidi, embryo. Vis putredinis vero facit, ut innatet, neque certius corruptionis signum est. Sed pulmo fetus nihil habet, quo differat ab alia quacunque parte corpusculi. Superest, ut mergatur. *Maximus* pulmonem 4. mense se ad aquam habere invenit :: 282. 274. & quinto mense :: 504. 494. l. c. diff. VI.

ita distendi, ut majorem angulum duo rami intercipient, medius vero ductus arteriosus distrahatur.] Nisi enim vasa sanguinea inter se magis, quam prius, distarent, nulla ratio esset, quare nunc pulmo non, ut prius, subsideat. Nunc, cum fistulae & vesiculae aerae magis expansae sint, etiam rubra pulmonis vasa ampliora ^f erunt, quam prius, & venae perinde, uti arteriae, amplae fient, & sanguinis auctarium, quod arteriis pulmonalibus receptum erit, premet in sanguinem venarum. Ergo sanguis cordis dextri, expulsus in arteriam pulmonalem, non eam, quam solebat in compacto pulmone, resistantiam nunc invenit. Non ergo tanta portio sanguinis per canalem arteriosum in aortam irruit: Nam ex pulmonali arteria in ductum arteriosum, ea tan-

^f Fetus pulmo brevissimus est, & septum altissime adscendit, *Pechlin de aer. & alim. def. c. 8.* magnam enim molem tunc hepar habet, & plena meconio intestina. Exigui thoracis non exiguam partem thymus replet. Pulmonis ergo vasa angusta, compressa esse, necesse est, magis, quam in ullo adulti etiam cadavere: quod comparando inveni. Merito adeo per hunc pulmonem parum sanguinis transit DCLXXXI. not. *d.* Nunc respiravit fetus, omnis ergo diameter pectoris augetur DCV. & cum pectore augetur pulmo, cum nunquam costas deserat DCVII. not. *a.* & vasorum adeo pulmonis increfcet area. Superest ut pulmo facilius sanguinem ex corde dextro admittat.

tantum sanguinis portio venerat, quae majorem in pulmone, quam in aorta resistantiam invenerat. Nunc subito pulmo insigniter expanditur, ergo plus recipiunt rami arteriosi pulmonis. Quo autem hi plus accipiunt, eo plus per venas pulmonales redit in cor finistrum. Nam expansio pulmonis aerei perinde sanguinem ad cor finistrum premit, uti arterias expandit. Ergo quanto major portio sanguinis per pulmones venit, eo plus transit ad cor finistrum, eo plus sanguinis arteria pulmonalis a dextro corde, ab ea vero arteria finistrum cor accipit, tanto nempe copiosiore, quanto arteriae pulmonales magis quam prius expanduntur. Nunc in secunda respiratione sanguis omnis per rarefactos pulmones, & arterias pulmonales, in vacuas venas, inde recta via ad cor finistrum venit, idemque cor tanto plus sanguinis accipit, quo vehementius nunc venae pulmonales a sanguine per arterias pulmonales celerius fluente comprimuntur, donec omnino nihil eum ductum iubeat, & omnis per pulmones, in finistrum finum veniat. Verum foramen ovale medium est inter pulmonalem finum, & cor

g De clausione peculiarium canalium fetus multum quaesitum est. Plerumque ea, quae Praeceptor habet, dici solent. Ita *Thruston* p. 90. *Pitcarne de motu per pulm.* p. 52. sqq. *Tauvry de la circul.* p. 196. 201. *Sylvestre* p. 46. *Verheyen lettre* p. 51. *Vaterus* ad mutationem anguli respicit, quem facit cum aorta ductus arteriosus &

cor dextrum, in eo valvula est, fixa versus dextrum cor, mobilis versus pulmones. Haec nunc perinde a par-

& qui a respiratione rectior fit, minusque adeo favet arteria pulmonali. Ad-diderunt alii varia. *Lancisius* multum tribuit, pro arterioso ductu, stapedibus aortae, sive circumflexo nervo vago & intercostali, *de corde* p. 70. tum zonae musculosae, quae in foramine ovali sub meatu protenditur ibi. Sed *Rouhault* novam opinionem protulit, nempe minime a respiratione hanc maximam mutationem pendere. Sensim enim fieri, & manifestam esse inter quinti septimi & noni mensis fetus diversitatem. In tenero fetu & foramen ovale grandius DCLXXX. not. f. & aortam valde parvam *reponse* p. 12, &c. & ductum arteriosum aortae aequalem esse *observ.* p. 71. &c. DCLXXXI. not. d. & cor sinumque sinistrum insigniter minora dextris istud dimidia in sexto mense *rep.* p. 9. hoc tertia parte minus eo tempore, in maturo vero vix quarta aut quinta *rep.* p. 4. sensim vero nixum cordis sinistri, adeo validi, dilatare aortam, magis, quam triplo debilius cor dextrum arteriam pulmonalem distendit. Ergo aortam sensim augeri *disc.* p. 14. & perinde minui ductum arteriosum, qui aegrius se depleat, hinc dilatari ramos pulmonales *reponse* p. 12 St. donec aequae ampla sit aorta super ductum arteriosum, ac intra eum est *reponse* p. 108 tunc nasci aequilibrium inter sanguinem aortae & pul-

inde a parte venae pulmonalis, uti a parte cavae premitur. Cum enim nunc sanguis cordis dextri omnis per arterias pulmonales in pulmones veniat, is certe sanguis omnis in venam pulmonalem veniet, & premet membranam foraminis ovalis mobilem, eo valentius, quo plus sanguinis per pulmones advenit. Sanguis adeo delinet fluere per foramen ovale, & omnis in cor dextrum veniet, qui per cavam advenit utramque, & foramen ovale clausum manebit, a perpetua pressione sanguinis venae pulmonalis. Quo saepius nunc iteratur respiratio, eo majori vi semper pulmones expandi necesse est, & foramen ovale conprimi.

Sed canalis arteriosus medius est inter aortam & arteriam pulmonalem, recipitque

pulmonalis arteriae, & iisdem causis semper agentibus, praevalere denique vires cordis sinistri, claudique ductum arteriosum *rep. p. 81. 125 discours p. 13. &c.* Sed in eadem ratione necessario minui ovale foramen, si quidem sinistri cor in latiore aortam se facilius evacuat, minus ergo contra finum dextrum nititur *rep. p. 137. & disc p. 18.* Et ea de causa denuo minui robur dextri ventriculi, cum minus sanguinis accipiat *rep. p. 33.* sinistri vero robur augeri, quia minus virium in transmittendo per foramen ovale sanguine impendit *rep. p. 80.*

Mihi minime dubium est, primam rationem sufficere, Facile enim credide.

que in fetu sanguinem, qui a corde dextro propulsus, majorem in pulmone, quam in aorta resistentiam invenit. Nunc, postquam fetus respiravit, cor sinistrum omnem sanguinem cordis dextri accepit, & nihil transiit in hunc canalem medium: ergo aorta dilatabitur plus, uti arteria pulmonalis magis dilatata est, adeoque hae arteriae ad se invicem accedent, & medium comprimunt canalem, & claudunt, tuncque sanguis in infante eodem, quo in adulto, modo circulationem perficit. Nempe sanguis

diderim, fetus thoracem, per respirationem, altero tanto majorem fieri, duplo ergo plus sanguinis transmittere in infante, nempe pene omnem, quem ductus arteriosus vehebat DCLXXXI. not. d. cum praeterea nunc cordis motus acceleretur. Nam in catulis sub aquis mersis cor vix vibrat, valide vero, quam primum respiraverunt BOHN. p. 36. Quamprimum autem magna pars sanguinis a ductu arterioso avertitur, necesse est claudī, uti recte PRAECEPTOR, quia arteria aorta, multo & pulmonali, & inprimis ductu crassior validissime renititur sanguini se dilataturo, hinc, ob pulmones pervios, tumentiores rami pulmonales, et maxime dexter idemque major, inde dilatata per eandem rationem aorta tenerum ductum & pene venosum, medium comprimunt.

De foramine ovali manifestum est, quamprimum omnis sanguis cordis dextri per pulmones transit, aequilibrium nasci inter

guis omnis ex vena cava fluit in cor dextrum, & omnis ex corde dextro in arteriam pulmonalem & omnis ab ea arteria in venam cognominem, & inde omnis in cor sinistrum porroque in aortam veniet.

Cum haec omnia adeo certo ita se habeant, certe pene intolerabile MIHI fuit, quod studio partium abducta ACADEMIA PARISINA non continuo MERYUM condemnaverit. Unicum argumen-
tum

inter sanguinem dextri, & sinistri sinus. Tunc membrana, alioquin foramine amplior, in perfectum septum abit ex HARVEII observatione & RIOLANI *contra Pecquet* p. 192. & ROUHAULT *response* p. 18. qui addit, in infante, qui respiraverit, hiatum valvula protegi. Eadem valvula crassior redditur, etiam CARCANO observante, & immobilis TREW *Comm.* 1737. p. 100. *de diff. fet.* p. 93. & supremo suo margine posteriori parti concavi isthmi adglutinatur MERY *de la circul.* f. 8. (utcunque). Semper tamen haec pars septi tenuior est, & pellucet KERKRING *obs.* 34. Dum autem arteriosum video contrahi & crassescere, donec membranae tumor canalem obturet TREW p. 96. ut arteriosa manifeste fibrosa carne fartus adpareat, neque male in ligamentum fieri doceat FABER apud HERNANDEZ p. 607. Brevior enim & una compressus est, adeoque membranarum explanatarum contactus, & ratio ad contentum liquidum augetur, Tartarea materie ob-
ple-

proferebat novator, & huic miror non respondisse DUVERNEYUM. Dicebat MERYUS,, sanguinem ab arteria pulmonali in aortam minime venire, quia ajebat, si id fieret, utique necessario aorta major foret arteria pulmonali, cum arteriarum amplitudines sint, uti vires distendentes: vires istae, uti quantitas sanguinis in arterias impulsae. Ergo ajebat MERYUS, impossibile est, majorem esse arteriam pulmonalem, si minus

pletum in sene vidit SALZMAN *de urinat.* p. 28. Vidi, in ejus sine aortico, foramina exigua anno septimo aperta, vidi protuberare carnem, similem coni, vidi tubercula adfuisse, uti in cicatrice. Porro facile est visu, priorem ductum occallescere, serius foramen ovale not. k. Nam foraminis ovalis occlusio a ductus arteriosi mutatione pendet, & illum duae arteriae medium elidunt, in quibus sanguis vehementius movetur, hunc duae molliores venae. Caeterum LANCISII nervo non plurimum tribuo, cum videam nervos, tamquam capitis propagines, in fetu, quam in adulto majores esse. Neque in tenerrima membrana sphincterem ullius roboris adgnosco. ROUHAULTUS vero multa ponit, non demonstrata, magnam nempe diversitatem in robore ventriculorum, & foraminis ovalis ductusque arteriosi in ipso fetu decremента; & considerasse debuit,, eas causas, quas adsumit, omni fetui proprias esse, & tamen nulli, vel certe ne millionesimo fetui

minus sanguinis recipit, & triumphabat, cum coram legatis **ACADEMIAE REGIAE** arteriam pulmonalem aortae aequalem ^h demonstraret. Sed haec tota argumentatio oritur ex ignoratione hydraulices ⁱ. Sint duo canales aequae resistentes *a. b.* conjuncti canale medio *c*. Nunc pone liquorem in tubo *a* urgere in canalem medium *c*; nihil certe poterit per eum canalem *c* transmitti in *b*, nisi in *b* minor resistentia fuerit, quam est impulsus in *a*. Si enim utrinque inpetus aequalis esset, pressiones contrariae se destruerent. Nunc pulmo in fetu ad extremum inferius canalis *a* facit majorem resistentiam, quam est resistentia in aorta, sive *b*. Ergo aliqua portio sanguinis $\tau\omicron\upsilon$ *a*, quae minorem in *b* resistentiam invenit, ibit per canalem medium, donec aequilibrium restitutum fuerit, neque quidquam ultra, tuncque resistentia eadem erit

fetui ductus suos coaluisse, denique manifestam esse operationem aeris, cum intra novem menses, quos fetus in utero vivit, ductus arteriosus aut nihil, aut parum in ullo fetu minuatur, a partu vero intra decem dies totus canalis saepe obturetur.

^h Et majorem: vide DCLXXX. not. *n*.)

ⁱ Responderet MERYVS, hoc de tubis infinite resistentibus verum esse, in hoc vero casu nullam rationem dari, quare pulmo vim suam qua superat aortae resistentiam, non potius impendat dilatando pulmoni ROUHAULT *reponse* p. 86. Sed vide l. c.

erit in *b*, quae est in arteria pulmonali. Manifestum adeo est, MERYVM falsa demonstratione usum fuisse. Sed certum est, pulmonem compacta sua mole aequae magnam resistantiam sanguini arteriae pulmonalis opponere, quam totum corpus aortae obponit.

Mutatur) Quando infans ante primas respirationes sub aquam mergitur, diu ^k potest

^k Verissime haec monet PRAECEPTOR.

Certum enim est, ductum quidem arteriosum coalescere ARANT. p. 40. citius ovali foramine, ut non male RIOLANVS foramen ovale saepe, ductum nunquam apertum reperiri dicat *de mot cord.* n. 91. Neque tamen subito clauditur. HARVEIUS vias fetus aliquot mensibus apertas manere scribit p. 64. De ductu vero arterioso, idem, ita tamen ut angustetur, CARCANVS docet. Altero mense apertum vidit VERHEYEN II. p. 347. SALZMANNUS in sene patulum vidit, sed tartum tartarea materie *de urin.* n. 20. & *de circ. sang. in fet* n. 26. Omnino apertum in adulto ARNISAEVVS apud HILD. Ep 45. & in juvene 22. annorum E. N. C. Cent. IV. obs. 166. quod mihi nunquam contigit. Ego enim aliquando post triduum clausum, alias decimo die perangustum, alias quadragesimo totum apertum reperi, post annum tamen nunquam, quantum in adversariis reperio, patulum. Foramen autem ovale tardius clauditur, nisi raro exemplo aliquando canalem arteriosum praeverterit, quale exemplum quarta septimana in titulo, septima

potest viciare, nam apertum habet artiosum canalem. Hic deceptus est HAR-

VEIUS

in puero SALZMANNUS recenset *obs.* p. 8. ubi canalis apertus. foramen clausum fuit. Plurimumque vero etiam aperto foramine, ductum clausum reperio. Ita in puero undecim septimanarum TREW *de differ.* p. 28. f. 42. 43. 44. & in vitulo quinta septimana f. 33. 35. & in puero 42. mensium MOEBIUS *diff.* n. 5. in juvene vero PH. TR. 439. Recte GALENUS, qui uno alterove die ait incipere coalitum, adulto caecum esse *de mil. part.* L. XV. c. 6. Cito etiam adglutinari ARANTIUS *de fet.* p. 38. Incerta quidem, fateor, in foramine lex est. Vidi jam altero a partu die pene clausum, ut hiatus in suprema parte unice superesset, & quarto die clausum lego fuisse in E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 6. *obs.* 202. & aliquot a partu diebus TREW f. 29. Secundo mense paulum apertum VERHEYEN *lettr.* p. 26. L. II. p. 374. Undecima septimana pene clausum TREW *de differ.* p. 28. f. 42. & septimo mense clausum ib. f. 25. 26. apertum vero sexto mense LIEUTAUD p. 375. Tribus quatuorve mensibus apertum manere recte RIOLANVS p. 392. Quarto anno apertum CONNOR *de off. coal.* p. 30. & ego reperio, pene perpetuo quinto, & septimo anno, hoc foramen apertum esse, ut vix unquam ceram injectam sustineat. Nono anno apertum PEYER *obs.* 8. In juvene ita reperit SALZMAN *de urin.* p. 28. Vigesimo anno patentissimum E. N. C. *Cent.* VI. *obs.* 91. *Vigec*

Vigefimo fecundo anno *Littre hift.* 1700. n. 13. & *E. N. C. Cent.* IV. *obf.* 166. Vigefimo quarto anno *Folius*, & vigefimo quinto *D. de March.* p. 79. qui pro raro habet. In 28rio *T. Bartholinus Cent.* II. *hift.* 46. *Vesling synt.* p. 89. In trigenario *Comper T.* 37. f. XI. In viro duobus annis adultiore *Amyand Phil. trans.* n. 439. In quadragenario *Schrader Dec.* I. *obs.* 4. Ter in adulto *Pinaeus in praef.* p. 21. Vidit etiam *Ridley* p. 217. *Arnisfacus* apud *Hildanum* l. c. & *Walaenus* ep. I. p. 389. fed is rarum vocat. Quinquagefimo anno apertum *D. Respinger spec. anat. bot. Comm. Paris.* 1735. *hif.* 5. *Barth.* *Epist.* III. n. 97. Quinquagefimo sexto *Comm.* l. c. In hydropico *Scheid* apud *Salzman.* Nonagefimo sexto *Cofchwiz de valv. uret.* p. 23. In adulto etiam cane apertum *Kempfer de valv.* p. 33. & cane vetulo *Peyer obf.* 29. & mure adulto *Harvei de corde* p. 64. Dudum *Harveius* „ vias fetui proprias, quandoque per totam vitam apertas manere *de corde* p. 64. & inter 19. adultos duodecies tantum foramen ovale claufum vidit *Morgagnus* L. XV. p. 28. & faepe apertum reperit *Riolanus* p. 392. & frequentius quam claufum efflet, fed unica hyeme 1732. *Nicolai Comm. lit.* 1732. p. 260. Demum quinquagefimo anno in feminis, quinquagefimo sexto in viris claudi, quod ex chirurgo Rothomagenfi (an le CATLO?) habetur in *Comm. Nor.* 1738. *hebd.* 35. Id vero nimium eft, non raro enim quinto anno perfecte claufum vidi, etfi minime infrequenter, etiam quadragefimo anno, & ferius, apertum viderim.

VEIVS ¹, &, qui ipsum explicavit, PIT-
CARNIVS ^m. Quærebat HARVEIVS, quare
fetus,

Nimius etiam *Botallus* est & *Folius*, qui pro perpetuo in homine canalem descripserunt, a paucis experimentis seducti. Solet autem vestigium durius superesse, frequenter reticulatum *Trew Comm. 1737. hebdom. 13. T. I. f. 4 5.* foveis in parte suprema *Couper l. c.* profundis inscriptum *Fol. f. 2. Morg. Adv. V. p. 23. 24.* quae eadem saepe oblique in sinistram sinum aperiuntur *Ridl. p. 217.* Hos ductus angustos obliquos etiam *Pinaeus* vidit *l. c.* In sinistro vero sinu inversus arcus est, cornubus sursum spectantibus, in quorum concavo arcu foramen hiat, superius vero reticulum est. Rarum est, foramen in inferiori parte dextra in adultis patuisse. Habet tamen *Morgagnus Epist. XV. n. 48* in fene, & in media parte *Trevv de differ. vas. f. 21.* ex adulto, & in trienni puella *Connor de coal. off. p. 30.* Denique inter venam Cavam superiorem & pulmonalem foramina communicantia in adulto vidit *Winslow. Comm 1739. p. 150.*

- 1 *Harveius de gener. anim. & de partu p. 263.* eruditius proposuit problema „ quare fetus septimestris in utero absque aere perdurare possit ad nonum mensem, extra uterum vel uno die nequeat? Quare animalia recens edita in integris membranis, & fetus, qui caesarea sectione eximitur, in utero plusculis horis supervivant, postquam vero semel respiraverunt, in simillimo loco solo aere excluso continuo pereant? Priori seculo fere

fetus, dum illaesa amnio & chorio continetur, etiam ex matre exemptus, per tres horas vivere possit, & idem tamen, postquam semel membranis ruptis aerem haufit, continuo pereat, si sub aquis eum merferis. Exemplum Lipsiae exstitit; ibi femina clanculum peperit, & infantem, una cum placenta, ruptisque membranis sub terram defodit. Interim observata mutatione subita tumidi abdominis feminae, familiares suspicionem suam magistratui aperiunt, inquiritur, & demonstratur, feminam ante tres, quatuorve horas peperisse. Rea convicta locum indicat, eruitur fetus, & vivus superest ⁿ, mollior enim terra eum nondum eliserat. Manifestum est adeo, coalitum

fere omnes physiologi ad hoc *Harveianum* problema responderunt, alii aliter, & valde male *Borellus* II. *prop.* 118.

^m Perfecte respondet, uti *Praeceptor*, de *causis div. molis* &c. p. 53.

ⁿ Nempe ante omnia debet de experimento constare. Id quidem verum est, integris membranis animal recens natum aliquamdiu vivere posse. Brutorum fetus a matre separati aliquamdiu hiant & varie moventur *Hipp. epid.* VI. n. 5. *Vesal.* p. 824. *Plater Quaest. phys.* p. 259. *Blegny Zod. Gall. ann.* I. M. *Ian. Moebius obs.* 13. In partu, qui membranis integris fit, omnino pueri vitales eduntur DCLXXXV. not. 2. Vivo fetui cor intra amnion omnino pulsare *Nymann de vit. fet.* p. 31. Fetum denum sub antlia pneumatica non extinguui per *Boylei* experimenta constat,

tum foraminis ovalis & arteriosi ductus non adeo subitum esse. Si vero eundem infantem repetito sub aquis merferis o, efficere pote-

& de felis fetu experimentum habet *Mery de la circul.* p. 57. diu in vacuo vixisse. Sed recte *Boerhaavius*, non videri, adeo continuo mori, qui semel respiraverit, cum ductus arteriosus non subito, sed intra dies aliquot obturetur: adeoque possit aliquamdiu sanguis a corde dextro; etiam neglecto pulmone, circumduci in sinistrum. Exempla duo, quae ex *Bohmo* citat, exstant p. 38. *de infantie*

- Videtur *Praeceptor*, uti plures physiologi, & *Dionis* p. 473 credere, eos, quibus foramen ovale apertum fuerit, posse sub aquis perdurare. Ita credebat *Harveius de corde* p. 64. & *Walaenus ep.* ll. p. 416. & *Swammerdam de respir* p. 83. & *Regis in spongia* p. 160. & *Cartesius de form. fet.* p. 202. in avibus aquaticis foramen ovale apertum manere, quod in ave Regia video confirmari a *Parisinis mem. pour l'hist. des anim.* l. p. 430. Verum experimenta inter se dissentiunt, neque satis respondent. Nam aliquando foramen ovale apertum, neque tamen ideo respirationis minor necessitas fuit. Suspensi illi, quos olim *Riolannus* p. 392. & in *E. N. C. Cent.* Vll. obs. 62. & *Cheseldenius* secuerunt p. 288. foramen ovale apertum habuerunt, & polyposus *Veslingii*, & submersus denique *Littrii hist. de l'acad.* 1700. obs. 13. Alia vero animalia diu tolerant sub aquis, quibus foramen ovale non hiat, uti dudum de amphibiiis observat

poteris, ut respiret, ad testudinis modum, impediens enim concretionem valvulae foraminis ovalis & ductus arteriosi. Ita ranae & testudines p, quando extra aquam vivunt, per pulmonem respirant, quando vero sub aquis degunt, sanguis transit per foramen ovale

vat *Needham* c. V. Ita certe nullum foramen ovale apertum habet *Delphinus* f. *Porpeff* *Grew catal. mus* p. 93. *Cheselden* p. 288. In *Phoca* & *castore* dubium est. In isto enim nullum *Muraltus* p. 474. & *Parisini* reppererunt, *Kulmianus* autem *castor* hiatum lentis aequalem habuit *Bresl. suppl.* I. p. 107. Sed id ne in homine quidem rarum est. In *phoca* adfirmant *Parisini* & *Raius syn. quadr.* p. 189. & *Kulmus E. N. C. vol. I. obs. 5.* negat *Schelhammer in anat. phocae.* In lutra clausum est *Parisin* & *Koenig E. N. C. Dec II. ann. 10. obs. 112.* Denique adulti homines, quibus hiat foramen ovale, aut omnes, aut certe plerique tantum exiguo tubulo pervium habent, exiguo futurum praesidio: ductus autem arteriosus vix unquam apertus reperitur, qui longe praecipuus canalis est, per quem fetus ab adulto differt.

p Sed his animalibus naturaliter minima pars sanguinis per pulmones transit, & arteria pulmonalis ex eodem cum aorta ventriculo provenit (ut in crocodilo *IESUIT. SIAM.* p. 30.) ut omnino sufficiat, si aorta paulo minus receperit *BAGLIV* p. 461. in testudine. Nam revera his animalibus cor unum trifidum ventriculum habet, uti in piscibus *DCXXV. not. l. conf. PARIS*

ovale & canalem arteriosum. Id unum nunc superest explicandum, quare cum aqua sola non perinde, uti cum aere, respirare & possimus? & quare non possimus sub aqua pectus dilatare, sic vitam trahere superstitem. Hoc nobis *κευπτον* est, quod fortan Vobis, vestroque aevo, aliquando patefcet.

DCLXXXII.

Hepar) Arteriae umbilicales in fetu sanguinem suum avehunt in placentam; inde vena

anc. memoir. T. III. P. III. p. 172. In phoca, sub aquis natante, credit *Schellhammerus*, sanguinem, uti in homine strangulato fit, in venis colligi, quas ideo pro ratione arteriarum amplissimas habeat hoc animal: & peramplas etiam venas in tursione memorat *Cheselden* l. c.

q Si recte intelligo PRAECEPTOREM, quaestio eadem est, quae CCXI. Nam id nemo quaerit, quare non ducamus aquam in pulmones loco aeris? Cum enim vasa sanguinea nostra ponantur inter medias vesiculas, & cum una inspiratione adducamus 40. pollices cubicos aeris DCVIII. not. e. haec certe moles aquae ita conprimeret vasa nostra pulmonis, ut robur cordis dextri, ad respirationem aeream & facilem circulationem a CREATORE computatum, sanguini per pulmones urgendo minime sufficeret: & quod etiam magis probabile videtur, rumperet telam cellulosa pulmonis molliissimam, ad solum aerem continendum robur nactam sufficiens.

vena umbilicalis revehit eandem sanguinis quantitatem, quam arteria adduxit, five ad hepar eum vexerit, five ad cavam venam, prouti resistentia aut in hoc, aut in illa major fuerit. Quamdiu nunc infans, etiam extra uterum, placentae cohaeret, quam ponimus in utero adhuc esse, & calere haecenus, & meabilem esse, tamdiu sanguis ejus circumit per placentam ^a, neque quidquam de quantitate amittit, mater autem utique suum sanguinem perdit ^{a*}. Manifestum ex eo fit, majorem vim esse arteriarum uteri in fetum, quam est vis arteriarum fetus in uterum. Abscindatur nunc umbilicalis funiculus, peribit infans, & sanguinem suum omnem amittet per umbilicales arterias. Si vero eae arteriae vinculo constrictae fuesint, quo arteriae arcentur, tunc praestringuntur ^b arteriae ^c, vena, urachus, & vena portarum nihil ultra a placenta accipit. Verum in arterias crurales ibat in fetu ea sanguinis portio, quae a corde sinistro per aortam expulsa fuerat, demta ea portione, quam arteriae umbilicales ad placentam ducebant.

Hae

^a Fetus ex funiculo pendens, placenta in utero relicta, facile aliquot horis vivit la MOTTE *obs.* 230. 232.

^{a*} DCLXXVIII. not. I. & exempla hujus infortunii habet la MOTTE *obs.* 211. 295. & PARISINI *Comm.* 1727. h. 1.

^c Umbilicum resectum biduo aut triduo a partu delabi, sanamque cutem relinquere notum est MONROO *Edimb. societ.* II. p. 164. ut vasa nigra ambugta quasi, & acuminata adpareant SCHULZE *de vas. umbil.* p. 11. an delig. umbil. p. 9.

Hae arteriae nunc clausae ^d sunt. Ergo sanguis arteriae aortae descendens nunc venit

d Arterias venasque umbilicales citissime coalescere vulgo creditur. Vidi secundo die excisum quidem umbilicum fuisse, facile tamen potuisse aperiri & repleri. Post aliquot dies utrumque vas adhuc apertum vidit TREW *de differ.* p. 25. Quinto vel sexto die arterias clausas, fuscas in vitulo SCHULZIUS vidit *de vas. umbil.* p. 12. & fere simile in puello triduo experimentum est TREWII *Comm. Nor.* 1734. p. 219. T. V. f. 3. ubi arterias valde contractas invenit, ceram tamquam per cribrum transmisisse. Die sexto septimo a partu a fotu calido funesta haemorrhagia CRAMER *Comm. Nor.* 1735. *hebd.* 43. Porro vidi arterias die decimo exiguo foramine apertas fuisse, & die 40. cum venae coalitae essent, cera injecta & sanguine plenas. Sed nuper bis, quadragesimo pariter die, arterias umbilicales pervias reperi, & sanguine plenas, supra vesicae apicem, ut minima esset particula, quae inter umbilicum & vesicam inanis supererat. Mense nondum tertio magnam partem arteriarum clausam TREW *de differ.* f. 39. Intra annum clausas TREW *Comm.* 1733. p. 387. Venam vero vidi die decimo apertam, die quadragesimo clausam, & denuo cum ductu venoso bis apertam; Ita tamen, ut observem, ductum arteriosum a parte arteriae pulmonalis, arterias umbilicales ab umbilico, venam umbilicalem pariter ab umbilico, venosum ductum a sede portarum

nit omnis in pedes, redit in venas crurales, in cavam denique. Sed nihil nunc per umbilicalem venam in hepar advenit. Ergo reli-

rum imminui, & incipere occaecari. Una decima septimana ductus venotus pene clausus TREW *de differ.* f. 39. vena umbilicalis etiam modice aperta. Duobus a partu mensibus sanguis ex rupto umbilico BARTHOL. *Cent.* IV. *hist.* 97. Sexto mense denuo apertam vidi. Nono mense TREWIUS in vena tantillum foramen, in arteria solam partem, quae vesicae fere altitudine terminatur perviam invenit *Comm. Nor.* 1737. h. 13. T. I. f. 2. In adulto nunquam vidi venam umbilicalem apertam. In puella tamen duodecim annorum umbilicus aliquem sanguinem sudabat SCHURIG ex HOECHSTETERO. In viro trigenario E. N. C. *Cent.* X. *app. obs.* 2, & in virgine 35 annorum sanguine plenam & varicosam COITER p. 117. Enormem & diuturnam ex umbilico in juvene haemorrhagiam HILDANUS habet *Cent.* III. *obs.* 37. & similia LANZONI E. N. C. *Dec.* III. *ann.* 9, *obs.* 143. PROSKY *Comm. Lit.* 1737. *lebd.* 6. & *Acad. Scient.* 1737. *hist.* 7. In adulto ex resecta vena umbilici funestam haemorrhagiam vidit HILB. *Cent.* I. *obs.* 53. (sed minus certo). In femina decimum 96 annorum venam apertam D. COSCHWIZ *de valv. uret.* p. 23. Confer compilationem apud TILINGIUM *de plac.* p. 216. 217. Ita nec arterias aliter apertas vidi, quam dictum est ad DCLVI. not. e, stylum admittentes vero I. M.

I. M. HOFMAN in E. N. C. l. c. Ductum venosum omnino semel in adulta femina liberum vidi. Id etiam in puero

$3\frac{1}{2}$ annorum vidit *Moebius* diff. c. n. 5.

Ergo solita lege naturae, ad maiorem aut minorem a partu distantiam temporis, adparet vena umbilicalis clausa, in duplici ligamento terete latens, & plerumque pinguedine obnupta,, Ductus venosus tenuis, membranae similis,, Arteriae vero umbilicales secundum vesicam quidem ligamentorum similes, semiteretes, fartae arteria vesicali DCLVI. quam multa series fibrarum rectarum ambit, similis incrassatae arteriae, supra duas tertias vesicae fere caecae, ligamenti teretibus figura, & utcunque fibris longitudinalibus adfines VESAL. *de chin.* p. 117. TREWIUS eleganter, sed prius, quam ego video, caecas pinxit, ut omnino omittat arterias vesicales *Comm. Nor.* 1733. T. 3. f. 3. 4. Hanc occlusionem ita intelligit fieri doctissimus SCHULZE *de vas. umb.* p. 11. 15. *an delig.* p. 15 &c. & WELTBRECHT *syndesm.* p. 227. 228. & TREW *Comm. Lit.* 1737. *hebd.* 13, ut vasa ab umbilico abrupta se retrahant, aboleantur & vaginas inanes relinquant, & adducit SCHULZIUS experimenta,, arterias umbilicales in vitulo in pelvem usque die sexto retractas, *de vas. umb.* n. 5. TREWIUS vero diserte,, arterias abruptas, retractas, ad summae fere vesicae altitudinem, vaginas solas fecisse reliquas testatur. Fere similia vidit *de differ. fet.* f. 39. Repugnant quidem exempla haemorrhagiarum in adultis non penitus infrequentium, pulvis

resistentia • sanguinis fluentis per venam cavam augetur contra inpetum sanguinis per ductum venosum venientis ex sinu hepatico, & pressio venae cavae superabit pres-

vis niger, sanguinis ficcati similis in vasis umbilicalibus pueri repertus a VERHEYENO L. II. p. 376. longitudo nimia arteriae umbilicalis, quis enim credat semipedalem canalem ad finem usque se retrahere posse; defectus vaginae ullius in ductu venoso, cujus tamen luculentum vestigium superesse solet; ductus arteriosi in adultis certa existentia, maxime vero manifestus in adultis tubulus arteriosus in media ligamentosa substantia arteriarum. Sed nuper etiam venam umbilicalem caecam mense sexto vidi, fili similem, minime tamen abruptam, & arterias umbilicales supra vesicam pariter graciles, continuas tamen neque avulsas. Inadulto denique ad summam vesicam plenas facit LIEUTAUD p. 313. Atque adeo nondum audeo in praestantissimorum virorum sententiam transire.

e Quare vasa umbilicalia coalescant, non adeo facile est respondere. Venam quidem umbilicalem coalescere, cum a partu nullum sanguinem recipiat, facile sequitur. In ductu venoso laboratur. Nam ea, quam adducit *Praeceptor*, resistentia, rem non expedit. Cur enim aliae venae Portarum cum cava anastomotes liberae manent, haec autem sola, facile maxima, comprimatur? Sed videtur in universum quidem a partu multo minus sanguinis per hepar ire, cum vena umbilicalis, toto por-

pressionem sinus portarum, iste enim a solis visceribus chylopoieticis, illa a toto corpore inferiori sanguinem accipit, & venarum hepaticarum sanguini plurimum deductum est, magna vero portio venae caevae accessit. Ergo nascitur in vena cava tanta contra sanguinem ductus venosi resistentia, ut comprimatur, & circulatio porro per hepar perinde sit, ut in adulto.

DCLXXXIII.

portarum trunco major, nunc desinat sanguinem advehere. Id confirmat moles decrefcens hepatis DCCXXIX. Omnes adeo anastomoses portarum cum cava minuuntur, & facilius comprimuntur. Venosum vero ductum videtur elidi inter lobulum Spigelii & incumbentem lobum sinistrum. Nam fossa ductus venosi in adulto nullam latitudinem habet, nisi, quam omenti tenerima lamina requirit. Elidi autem a partu intelligitur, cum perinde diminuatur cavitas abdominis, uti pectoris cavea dilatatur, atque adeo omnes eminentiae in vicinas cavitates inprimantur.

In arteria umbilicali etiam magis haesitatur. Va-

stissimi canales sunt, diametro $\frac{20}{100}$ pollicis

cis, qui ab aorta directa via maximam partem sanguinis recipiunt. Cur non manent aperti a vesica ad umbilicum? cur non crepant nitente in vinculum sanguine? Reperio 1. compressionem omnium vasorum abdominalium, & insignem determinationem sanguinis ad vasa pulmonis nuper dilatata, hinc mutata in

in abdomine solidorum ad fluida, auctamque rationem. 2. Flexionem, quam hae arteriae cum trunco magnam faciunt, ut viderim injectam per alteram arteriam ceram in crus utrumque venisse, per alteram umbilici arteriam non rediisse. Porro hanc plicam, in homine certe, a partu augeri adparet, cum haecenus conglobatus, nunc extendatur, & arterias umbilicales magis retrogradas habeat, ELLERO etiam perspicaciter monente *Comm. Nor.* 1733. p. 379. Hinc levissima compressione haemorrhagia vasorum umbilicalium coercetur CHAPMAN p. 66. 67. 3. Etiam in adulto in aneurysmate ligatae quaecunque, aut praeseclae & cicatrice clausae arteriae paulatim occalescunt, & diminuuntur, praevalente vi solida, quamprimum inpetus liquidus ex aequilibrio diminutus est, & sanguis non videtur contra vinculum niti, quod vicini rami abunde adsint, in quos inpendatur is sanguis, quem ligata arteria nunc refutat. Vidi, & vulgo notum est, resecta arteria radialis, ita dilatata fuisse sensim ulnarem, ut rami omnes, quibus prospicit radialis, inde sanguinem acciperent. Inde a partu vasa genitalia, cum in reliquo corpore omnia vasa in ratione ad musculos minuantur, sola increscunt pedesque, qui fetui valde imperfecti sunt, nunc insigniter augentur, & ad sustinendum corpus aptiores redduntur. Plura non video. Geniculum Cl. SCHULZIIUS ponit, quo in umbilico arteriae fetus cum arteriis placentae connectantur, eoque rupto credit huc & illuc arteriae ruptae

fines

DCLXXXIII.

Meconium) Hujus excrementi stimulus fuit una ex praecipuis causis ^a, quae partum irritando acceleraverunt; nunc adductus est aer in thoracem fetus, superatur adeo sphincter ani, & faeces egeruntur. Prius, dum fetus in amnio vivit undique tectus, nunquam faeces egerit, neque stercus in amnio reperitur, quando vero aqua faecibus turbata effluit, norunt gnarae oblectrices fetum jam respirasse.

Vesica) Idem de urina verum est. Urachus ^b, in homine quidem vinculo constringitur, dum umbilici funis ligatur. Homines enim perirent omnino, nisi vinculum injiceretur, diversi in ea re ab animalibus, quibus omnino nulla noxa accedit a resecto mordicus funiculo umbilicali, & natura favens vasa omnia sponte claudit. Homini vero, uti plus rationis DEUS dedit, ita eum magis arti reddidit obnoxium ^c.

Si

finis se retrahere, finibusque imminutis exarescere *an delig. umb. necess. p. 7* Sed hoc geniculum neque ipse SCHULZIUS vidit, neque favens SCHULZIO TREWIUS *Comm. 1733. p. 394.* facile enim est, ex funiculo in abdomen fetus continuare repletas arterias, cylindricas ubique, & absque nodo continuas.

^a DCLXXXV.

^b Parum mutatur in adulto, nisi quod a vesica recipiente se in pelvem, & ab umbilico refugiente, extensus gracilior fiat.

^c Haec nunc difficilis quaestio est. Quare
bruta

Si enim vel resectus fuerit absque vinculo

bruta animalia omnia fetibus recens editis umbilicum praemordent, & nullus unquam catulus ex haemorrhagia perit, nisi CARPI experimenta velis, qui vidit., equinos & asininos pullos praesepto umbilico periisse p. CCLXI Quare vero homo, nisi caute ligatus fuerit umbilicus, cito sanguinem omnem amittit: cum tamen homini longior, & magis intortus umbilicus, (vitulo certe rectior HOSKEN. *de secund. vitul.* p. 93. f. 23.) potius periculum haemorrhagiae minuire videantur. Varii responderunt varia: Luxum hominis & sanguinem tenuiorem accusat TAUVRY p. 139. Alii ad morsum & lentam masticationem confugiunt. conf. CHIRAC. *hist. acad. scient.* 1716. *hist.* I. qua bruta funiculum abrumpant. Sed etiam Tapuyae funiculum mordicus auferunt LERY p. 296. & tamen ligant. Alii magnitudinem vasorum, quae multo quam brutis animalibus ampliora esse dicunt. FANTONUS autem pridem ligaturam umbilici non necessariam esse, ex conjectura proposuit. Cl. SCHULZIVS vero, nodum Gordium ense resolvit, negat nempe fetum humanum sanguinem suum amittere, etiam si nulla ligatura injecta fuerit. Ita reperio, a funiculo non ligato exiguum haemorrhagiam successisse apud la MOTTE *obs.* 441. 442. 443. & TREWII similem observationem adlegat SCHULZE *an delig.* p. 21. 23. tum adsunt ELLERI *Comm. Nor.* 1733. p. 379. & TREWII *Comm. Nor.* 1734. p. 219. 1735. *hebd.* 51. & in

culo^d, vel nimis tenui^{d*} sericeo filo funi-
culus constrictus fuerit, & arteriae umbilici
quasi dissectae, fetus certo ex haemorrhagia
perit. Prudentior obstetrix utitur vinculo
fatis lato, ne fecet, fatis tenui, ut stringat,
quantum necesse est; deinde ad aliquot
digitos^{d**} supra hoc vinculum secundum
injicit,

E. N. C. vol. 11, obs. 50. consentientia
experimenta. Sed contrario modo non
ligato funiculo corpus infantis exsangue
fuit *Comm. Nor.* 1735. hebdomada 32. Ex
rupto aut non bene ligato funiculo per-
fecta inanitio & mors SELECT. FRANCOF.
I. p. 327. & aliquot exempla existant
apud HILDANUM *Cent. I. obs.* 52.
MAURICEAU p. 465. obs. 256. post.
142. E. N. C. Dec. II. ann 7. obs. 193.
Vol. II. obs. 50. BURGMANNUM in
Comm. Nor. 1734. hebdomada 34. ex Beroli-
nensibus, BRESL. 1724. p. 421.
QUELLMALZ *Comm. lit.* 1737 p. 196.
et sexto demum septimove die post
calidum fotum CRAMERUS funestam
ex umbilico pueri haemorrhagiam vidit
l. c. Ex umbilico ter ligato magna hae-
morrhagia MAUR. obs. post. 44. Ex vinculo
per exsiccationem laxato die septimo
haemorrhagia funesta ID. p. 464. Post
aliquot dies sanguis ex umbilico infantis
haeso E. N. C. vol. 1, obs. 169

d Perfecte eadem cautela est IUSTINAE
SIGMUNDIN p. 114.

d* MAURICEAU p. 465.

d** CROESER *diff. cit.* p. 11. I. von
HOORNE p. 61. Tribus vero nodis
ligare jubet DIONIS *des accouch.* p.
371.

injicit, ut tutamen aliquod supersit, si casu prius vinculum viam sanguini dederit; tunc refecat funicul, vulnerique inponit chartam cum melle & oleo rosaceo, ita putrescit umbilicus & decidit, & manet superstes per totam vitam cicatrix. Ergo ligatura injecta est uracho, quae opponit urinae ex vesica exiturae resistantiam majorem, quam est sphincteris resistantia. Fluet adeo per superatum spincterem, & per urethram urina, neque nunc urachum permeabit, neque porro pristinam viam requireret unquam, nisi potentissima aliqua & morbosa causa accesserit.

DCXCIV.

1. *Pater*) Embryonem dat, & prima vitae stamina, corpusculi fabricam vere jam factam & determinatam, vermem ^a nempe in omni animalium genere, qui deinde pro varietate specierum in alias, & alias animalium formas ^b mutatur. Dat etiam primum alimen-

a DCLI. Germen etiam a mare advenire DRELINCOURTIUS contendit ubique.

b Objectionem contra systema vermiculorum huc reservavi. Nempe, si animal totum & perfectum a patre venit, quomodo matris, quae nonnisi hospitium praebet nidumque, similitudinem aut omnem aut aliquam fetus recipit, uti ex clauda matre claudum puerum habet VENETTE p. 307. & membranas inter pedum digitos quasi anatinas STAHL. p. 497. Et, quod majus est, inter animalia hybrida, cur mulus matris equae potius, quam patris

alimentum, nempe proflatarum succum: haec omnia ad ovum usque maternum advehit.

Mater)

asini similis est? Cur porro eadem femella inter multiparas, vel in eodem initu filios alios sui similes. alios patris, ut de catella in E. N. C. *Dec. II. ann. 10. obs. 180.* lego, aut eadem mulier modo sui, modo parentis similes filios edat diversis partibus.

De primo experimento omnino constat, & mihi videor inter homines me observare, similitudines matrum frequentiores esse. Ovis ab hirco inita, durior lana edit fetum. & capra ab ariete teta molliorem ATHENAEUS apud GALENUM *de semine L. II. c. I.* In mulo & lycisca, & pullis, quorum mater gallina est, phasianus pater, utriusque parentis natura adparet HARVEI p. 142. phasiani nempe forma sed gallinae color FABER p. 772. Animal ex glire & cato natum, utriusque particeps naturae LOCKIUS vidit *de Pentend. L. III. c. 6.* Ex alba femina & aethiope, uti notum est, mulatri nascuntur, quibus non color solus, sed proportionem corporis ex utroque parente miscentur. Ex aethiope & ancilla Europaea puer albus pene nigro, si fides E. N. C. *Dec. II. ann. 5. obs. 190.* Sed neque tertium dubium est. Mulus enim multo plura de equa habet, de asino aures fere caudamque BOURGVE T L. IV. p. 16. FLOYER *abridgm. II. p. 212.* & addit HELMONTIUS, ita mutari equae genitalia organa ab asini initu, ut etiam

Mater) Recipit a patre vitalia stamina, retinet, & nutrit, domicilium ergo praestat fœtui, liquorem amnii, in quo natat, & nutrimentum per chorion ad amnion fluens.

etiam altera vice pariens, a patre equo, edat pullum aliquid habentem asininum *alphab. natur. p. 40.* in ore & coxis *STAHL. p. 496.* Lycisca ex matre lupa nata, patre cane, lupa est *FABER* apud *HERNANDEZ p. 491.* Animal illud compositum ex tauro & equa, *Joumar* dictum, vidit in Asia *SHERARDVS* apud *BLAIR bot.ess. p. 310.* & in Arvernia ex equo & vacca excitat *VENETTE p. 324.* & in Pedemontio vulgare esse *BOURGVETUS* testis est, duorumque generum, *Bif.* ex asina & tauro, *Baf* ex equa & tauro, utrumque autem verum asinum esse aut equum, modicis quibusdam notis tauri insignem, fronte tuberosa, capite brevi *Lettre IV. p. 161.* Hinnus ex asina, matri similior est *COLUMELLA L. IV. c. 37.* tum in universum hybrides matrum similiores *PARISINI* in *anat. Catopardi.* Denique si fides potest adhiberi, *P. ZUCHEL-LUS* in *relat. congana* feminas a similiis compressas veros homines edere refert *p. 148.*

Haec omnia eo validiora videntur, quod in arboribus ramus insititius a radice alieni generis alimentum quidem accipiat, speciem tamen suam conservet, neque unquam in naturam transeat arboris, in quam inseritur. Ergo ab
omni

fluens. Si mater vivipara fuerit, ovum ponit & incubat intra uterum, & fovet, in

omni tempore haec experimenta adhibita sunt, ut mistio seminum demonstraretur, a GALENO de *semine* L. II. & nuper a VOGLIO, a MAZINO *instit.* p. 218. ab anonymo *Eff. on fecund.* p. 12. & ab aliis.

Ad hanc gravissimam objectionem aegre respondit LEEUWEN-HOECKIUS. Experimenta equidem opposuit experimentis, plurima nempe animalia patrem sequi colore pilorum COLUMELLA L. VI. c. 37. plumarum &c. ut in griseis cuniculis, (qui ex quacunque matre griseos educant pullos) *Anat. & contempl.* p. 54. 55. in genere gallinaceo & columbino ILL. de SUPERVILLE *Phil. trans* n. 456. Phasiani erant. quos gallina pariebat ex phasiano FABER l. c. p. 772. Ex patre latissimas habente scapulas puer simili modo insignis VENETTE p. 308. Deinde passim historias legi morborum valde singularium, qui a parente in filios, totamque gentem descenderent. Ita vitium hominis, qui quatuor pollices habebat, in pueros descendit MONCONIS *Iter I.* p. 13. & ex patre omnes filii contortis pedibus, ex alio nati omnes filii vesiculis pulmonis & hepatis extincti sunt *Marcell. Donat.* L. IV. c. 18. Ex caeco quinque caeci nati *Lanzoni obs.* 125. & E. N. c. *Dec. III. ann. 4. obs.* 67. (sed ex auditu.) Ex gibboso meri gibbosi *Mauriceau* p. 44. Confer fusam rhapsodiam apud *Schurigium* in *spermatol.* c. 9 &

& olim de caecitate , & verrucis , naevisque a patre vel avo in nepotem descendantibus *Aristotelem hist. anim. L. VII. c. 6.* Nota aspera , & sub pluvium tempus aucta , in tota gente Bentivoglia hereditaria fuit , & per mares adeo propagata *Carpus p. CCLXXII* aliosque naevos in tota gente hereditarios legimus in *E. N. C. vol. I. obs. 189.* Ita suum familiam integris ungulis vidit *BRADLEY philos. account p. 91.* Porro in ipso hybride animale *Kumrah* ex asino & vacca genito plura ex asino esse , cornua nempe abesse , & fissam ungulam habere , auctor est *Shaw travels p. 239.* quod non videtur convenire cum iis , quae de *Joumaris* dicta sunt.

Deinde omnino observandum est , non alia fere animalia diversorum generum commissa vitales edere fetus hybrides , nisi proxima , & de eadem classe , quae *varietatum* inter plantas pene similia , paucis , & non profunde in fabricam descendantibus notis differunt. Ita equus ab asino vix magis differt , quam *Europaeus* a *Nigrita* , aut *Patagonicus* *gigas* a *pygmaeo* *Troglodyta* , *lupus* a *cane* non magis , quam ab *anglico* *pugnace* *molosso* *catella* *melitaea* &c. Non ignoro exemplum *Iumarrorum* excipi , sed fateor , zegerime apud me fidem invenire , donec anatomen hujusmodi animalis habeamus , ex qua constet quatuor , an unus ventriculus in eo reperiatur ? an vesicula fellis aliqua ? an nulla ? &c. Sed animalium similis generis partus manifesto a causis etiam *accidentalibus* aliquas , neque fere minores , quam per venerem cum alio genere , differentias tra-

in homine quidem novem c mensibus , in
elephante duobus annis. In avibus autem
incu-

hunt, in coloribus fere , aut in quarum-
dam partium majori torositate , aut strig-
ositate positas , non in numero , situve,
aut fabrica interiori ossium , viscerum,
musculorum. In coloribus res notissima
est, etiam ex *Jacobi stratagemate* & ex
equisonum experimentis. Albi pavones
nascuntur a parietibus albis , inter quos
parentes ambulant E. N. c. *Dec. II.*
ann. 10. obs. 4. Lacerti pullos variis
pictos coloribus genuerunt , cum consue-
vissent coire in lecto pretiosis & diversi-
coloribus aulaeis strato ROCHEFORT
hist. des iles antill. p. 149. Ex terrore
alter gemellorum aethiops E. N. c. *Vol. I.*
obs. 77. confer Bourguet Lettre III. p. 94.
&c. Manifestum ergo est, levi quadam
commotione , qualis ab imaginatione
fieri potest , a matre in filios eas-
dem mutationes descendere posse, quae
a venere aliena sequi observantur: recte
adeo hoc phaenomenon a motu hoc vel
illo validiori interpretari *Valisnerium l. c.*
c. 21. n. 13. & alimento forte ad unam
partem , analogam matris , facilius, ad
alteram heterogeneam aegrius adplicato,
ut *Leeuwenhoek anat. & contempl. II.*
p. 73.

c Ordine vero quodam haec tractatio institu-
enda est. Fetus utique semper vivit,
recte hoc STAHLIVS, crescit enim.
Verum in primordiis suis ita tener est, ut
vitalis edi, aut supervivere conatibus ad
abortum necessariis nequeat: neque
possit

possit calcitrando aliquem sui sensum in matre excitare, hae vero causae sunt, quare eo tempore nondum vitalis haberi soleat. Multo tamen citius, quam vulgo creditur, movet artus: Die trigesimo secundo VENETTE p. 264. Sexta septimana BIANCHI *de gener.* p. 126. Mas die trigesimo, femina quadragesimo secundo HIPPOCRATES *de nat. pueri.* Mas die quadragesimo, femina nonagesimo ARISTOTELIS *hist. anim.* L. VII, c. 3. RIOLAN. p. 401. Mense secundo MAURICEAU p. 92. Septimana 14. SCHURIG. *Embryol.* p. 449. Mense quarto HARVEI p. 290. Eo ergo tempore fetus manifesto vivunt. Citius pariter, quam credunt, vivus fetus abortu editur: Trimestris L. LEMNIUS, la MOTTE *obs.* 203. 204. VALENT. *Pandect. cas.* 23. Quadrimestris, etiam vocalis L. BOURGEOIS L. 2. p. 72. & alius apud RELES: & puer dupla mole scarabaei non major la MOTTE *obs.* 172. Inter quartum & quintum mensem ID. *obs.* 170.

Verum id quaeritur, an ante nonum mensem fetus ita perfectus edatur, ut supervivere queat, & more humano ali & educari. In hoc termino laboratur. Tempus certe maturitatis in omni plantarum & animalium genere definitum est, & sequitur fere animalium longaevitatem, ita tamen, ut varietatem aliquam, sed non maximam, admittat. Quare Quinquemestres quidem fetus vitales, dictos Valesio & Spigelio c. 20. & Everardo l. c. & in *opusc. scient.* Vol. 13. p. 450. 451. aegre admitto. Vide ex Montano, Cardano, Avicenna, Schenkium compilantem p. 578. & ex Welschbio, Schurigium. Sex-

Sexmestres autem quos negat vivere *Aristoteles hist.* VII. c. 4. incipiunt vitales esse, ut tamen rariora exempla sint, & non male parum iis tribuat *P. Zacchias L. X. c. 13.* *Diemberbroeckius* historiam habet p. 229. & alium fetum pumilionem, debilem, qui tamen adoleverit *Everardus* p. 216, aliumque nondum ad sextum mensem gestatum nempe 173. dierum proprio libello defendit *Möllerus*. Pro fetu vitali 175. & 183. dierum *Lipsienses* (*Amm.* p. 347.) & pro alio 177. dierum responderunt *Rostochienses* apud *P. Amman in medic. crit.* p. 9. *Moller* p. 84. Vide collectionem partuum praecocium apud *Schurig. Embryol.* S. VI. c. 7. *Schenck* l. c. Septimo vero mense homines non rarissime vitaliter pariuntur *Hippocrates* περὶ ἑπταμηνου, *Aristoteles de Gener.* IV. c. 6. *Faber* apud *Hern.* p. 477. *F. Sylvius*, de quibusdam familiis, in quibus ait, omnes septimestres nasci, la *Motte obs.* 68. 69. 77. 78. *Breslau.* 1727. p. 727. debiliores tamen, *Aristotele* jam teste L. VII. c. 4. & meatu aurium nariumque minus perfecto *Aristoteles* ib. & de gener. anim. L. IV. c. 6. oreque valde hiante, plerumque denique cito pereunt *Hipp.* *Zacchias* L. X. c. 37. Sed octavo mense veteres quidem partus non credebant vitales esse, ut *Hippoc.* l. c. & περὶ οκταμηνου, & de aetate, etsi excuset, & detorqueat lenis verba *Drelincourtius de fetu octimestri vivaci*; tum, in *Graccia Aristoteles*, & *Varro* apud *Gellium* L. III. c. 16. Recentiores omnes cum *Diocle*, & *Avicenna*, & ipso *Aristotele* de gener. L. IV. c. 4. *hist.*

hifl. VII. c. 4. (ubi in Aegypto vitales edi-
fatetur consentiunt, & vitales esse octime-
stres defendunt *Cardanus*, *Drelincourt* toto
tr. p. 194. &c. *Dolaus*, *Mauriceau* p. 205.
multis exemplis, & *obf.* 225. *la Motte*
obf. 70 71. 72. 73. 189. E. N. C. Vol. IV.
obs. 51. *Berger* p. 487. etiam tergeminos
Mauric. *obf.* 146. & magis vitales esse sep-
timestribus *Bohn.* *de offic. med.* p. 630.
Manningham l. c. *Mauriceau* p. 205.
ut tamen merito credamus, omnes,
nono mense praecocios, minus in uni-
versum vitales esse *Venette* p. 75. Termi-
nus autem naturalis novem perfectis
mensibus quidem continetur *Hoboken de*
sec. hum. p. 87. *Dionis des accouch.* p. 197.
Venette p. 75. *Diemberbroeck* p. 292. ut
sint mulieres, quae partum ad diem
praedicant *Schelhammer de part. gener.* n.
17. Paucis vero ante, vel post hunc
terminum, septimanis natura ludit. Ita
Aristoteles tempus pariendi inter septi-
mum & undecim mensem includit *hifl.*
anim. L. VII. c. 4. Saepius vero aliquan-
to post novem menses parere ait c. 3. Sed
& brutorum tempus aliqua libertate eva-
gatur *Mauriceau* p. 202. Romani novi-
mestres & decimestres unice pro legitimis
habuerunt *Gellius* l. c. *Ulpianus* post men-
sem decimum natos habet pro illegitimis.
Justinianus die 282. natos inter legitimos
admittit. Senatus Parisinus filiolarum 304
die pro legitima admisit, pro illegitima
alteram 312 die editam *Venette* p. 77. &
respondum contra fetum 309 dierum ad-
ducit *P. Amman* p. 176. Hujusmodi fe-
tus post novum mensem editos grandiores
nasci *Manninghamus* expertus est p. 51.

& la Motte obs. 298. & clausa fontanella annum receperunt Liphenses *Amman.* p. 234. Undecimestres perfectos autem, duodecimestres, aut seriores, rarissimos ego puto, neque unquam admittendos, nisi manifestissima ratio adsit retardationis in aliqua chronica matris aegritudine. Quales satis probabiles historias de decimestri perfecto habet *Mauriceau obs.* 120. & denuo 298. & la Motte obs. 74. 75. de duodecimestri *Burggraw* apud *Buchnerum* in *misc.* 1727. p. 171. & in *Comm. Nor.* 1741. *bebd.* 40. de sedecimestri *Harveius.* Ita matris peculiaris morbus aliquid ad *Peirescianorum* partuum tarditatem conferre potuit, omnes enim unius matris sunt. Nobiscum *Manninghamus* post undecimum mensem natos vix admittit p. 51. & ne decimestribus quidem multum tribuit *Hobokenus* l. c. & quam facile fallantur feminae, notum est, cum menses aliquando ante conceptum emanent, alias post conceptum pergant fluere *Siegmundin* p. 192. Undecimestrem equidem *Peirescius* dixit apud *Deusin.* *Mussip.* p. 40. & talem se ipsum facit *P. Aponensis* dictus *Conciliator* apud *Marc. Donatum* p. 373. *Hadrianus* apud *Gellium* pro undecimestri rescripsit l. c. cui etiam *Varro* favet ib. & *Gieffenses* apud *Valentinum Pandect.* p. 146. & *Parisinus Senatus* in principis *Condei* causa. Annuos la Motte proposuit obs. 76. & admiserunt *Ingolstadienses Valentin.* novell. cas. 3. Porro tredecimestrem tuitus est apud *Plinium Mafurius*, & patrem suum eo mense natum esse *Cardanus* auctor est. Quatuordecim mensium fetum refert *Peirescius* & *Alex. Benedictus.* Alium, sedecim mensium

Bar.

incubatio uno & viginti ^d diebus absolvitur.

Faciat) Primum hoc stamen, quod pater in generando suppeditat, non ideo omnia viscera habet, verum ea sensim admirabili arte subnascuntur. (Ita in codice)
Cum MELIHISEDECH THEVENOT anno 1661. Parisiis quavis septimana conventum virorum doctorum in aedibus suis instituisset, quos humanissime invitabat, ut ex eorum
 dispu-

Bartholinus habet *Cent. III. hist. 51. & Harveius de partu* p. 260. & ex rumore *Spigelius* l. c. Octodecim mensium partum, dentatum refert *Bianchi* p. 145. ex *Panzoto*, & alium apud *Peirescium* lego l. c. alium *Sennertus*, sed de auditu, *prax.* L. IV. P. II. p. 168. & octodecimestres, atque vigintimestres *Monspelienses* pro legitimis admittunt *Moebio* teste p. 570. *Novemdecim mensium dentatum Marc. Donatus* p. 374. *Vigesimo mense natus Sennertus* habet, viginti duorum mensium *Bianchi* p. 144. *Opusc. scientif. XIII. p. 443.* Viginti trium, ex *Peirescii* observatione *Deusing. fet. Mussipont.* p. 40 & collectionem partuum ferotinorum vide apud *Schurig Embryol. S. IV. c. 2.* Sed his omnibus, quantum video, fides integranequit adhiberi.

d Etiam in fornacibus Aegyptiis hic terminus servatur *Muller it. palaeft.* p. 580. *Thevenot. L. II. c. XI. Lucas It. ult.* p. 280. Sed & araneoli intra eosdem 21 dies excluduntur ex ovulo p. 5. In Antillis tamen insulis pullorum exclusio aliquot diebus velocius procedit du *Tertre hist. des Iles ant. II, p. 266,*

disputatione erudiretur, etiam SWAMMERDAMIUS rogatus adfuit. Sermo erat de generatione animalium, & singuli propriam proponebant sententiam de viscerum appositione. NOSTER civis, ad inquirendum aptissimus, sed tardus loqui, ultimus fatus est, non ratiociniis, sed experiendo rem esse aggrediendam, atque se in proximo conventu aliqua propositurum, quae huc facerent. Ergo adtulit bombycem ^e jussit quaerere futuri papilionis alas. Frustra conabantur omnes, cum ille, summa, quae valebat, manus dexteritate, explicavit latentes alas, futurique papilionis proboscidem, ut appareret, jam dudum in longum diem naturam partes formasse, postea extricandas. Sed idem in homine obtinere embryo docet, cui nulla videntur crura

- ^e In cruca latet formatus papilio *Swammerdam. Bibl. nat. p. 579. T. XXXVII. & potest demta cute extrahi l. c. tum in chrysalide: & chrysalis est fasciatus atque larvatus papilio IDEM hist. insect. p. 7. Reaumur Mem. pour servir a l'hist. Tom. I. p. 353. Mem. IX. Malpigh. de bomb. p. 26. Idem etiam in muscis aliisque insectis verum est Swammerdam hist. gener. anim. p. 35. Mutationem vero chrysalidis in papilionem Swammerdamius exhibet hist. gen. inf. T. XIII. C F. bibl. nat. p. 389. & coram Thevenotio se praestitisse testatur hist. gen. inf. p. 21. 22. In Ephemero haec mutatio etiam magis subitanea est REAUMUR T. VI.*

crura ^f esse, manus nullae, cum tamen habeat utraque, & incubando demum extricet ^z. Hoc nunc dat pater, sed unde habet?

f In porco, qui videbatur apes, pedes contracti latebant VALISNERI C. 17. c. 6.

g Gravissima haec questio est, physica & anatomica, Quomodo struatur corpus hominum & animalium? An ab anima, aut plastica aliqua potentia? An per epigenesin, particulis alimenti secundum aliquas mechanicas leges se conjungentibus in praescriptam suae speciei fabricam? An omnia viscera, & muscoli, & solidae reliquae partes pridem in primis initiis invisibilis embryonis humani adfuerint, atque successive demum adpareant, ubi ab influente humore paulatim dilatata, molem nacta fuerint visibilem? An demum semen, ex omni parte maris aut feminae, aut utriusque defluens, iconem quasi harum partium modulo expressam induat, atque adeo similitudinem parentum internam in fabrica, tum externam in facie exprimat, ut auctor sentit libri *περί της γενέσεως του ανθρωπου & περί του ζωου* J. & alii, quos citat ARISTOTELES de gener. anim. L. I. c. 17. & ipse fere STAGIRITA L. IV. c. 1. & SPHAERUS apud LAERTIUM L. VII. c. I. & passim inter recentiores aliqui ARCHANGELUS p. 156. COLLINS p. 539. 540. & Itali, quos BOURGUETUS refutat & ipse pene BOURGUETUS, ubi similitudinem parentum explicat per semen paternum quod sit *extractum spirituosum*

habet? Ex teste certe suo, nullibi enim praeter testem, viamque a teste in urethram, animal adparet.

2. *Mare*

tuosum totius corporis paterni L. IV. p. 154. Sed evolutionum theoria fere ubique obtinet a *Swammerdamio* *prodr.* p. 22. *hist. gener. inf.* p. 42. 43. & *Malpighio* *proposita posth.* p. 82. Eadem *Malebranchius*, *Peyerus* in *merycol.* p. 51. *Brendel* in *obs. anat.* *Berger* p. 462. *Valisneri* *della gener.* C. XIII. n. 7. c. XIV. XV. *Bourguet.* *Lettr.* IV. *sur la generat.* & alii defendunt, iique plerique in ovo quidem germen, sive machinulam humanam perfectam docent includi *Swammerdam* *prodr.* p. 21. *hist. gener. inf.* p. 46. *Berger* p. 463. nempe cicatriculam *Malpighius* *posth.* p. 81. *Harveii* p. 174. Neque pauci eorum in ovario Evae omnia hominum corpora formata & complicata creata esse ajunt, quae sensim ab alimentario humore distendantur, donec in animalium formam molemque incrementum *Swammerdam* l. c. *Valisneri* c. XVI. & c. *Peyer* l. c.

Alii paulum diversi, una quidem creata esse corpora animalia, sub initio mundi, sensim vero demum evolvi, quando in proprium & faventem locum incidunt, in quo ali possint, neque in ovario primae matris, sed ubique in orbe terrarum dispersa latere *PERRAULT* *mecan. des anim.* p. 482. & in *Anc. Mem. de l'Acad.* I. p. 279. donec longa dies laborque mutabilis aevi explicet complicata organa. Eadem sententia est H. FABRI
de

*de plant. prop. 98. de gener. hom. Prop. 763
&c. & Sturmii in Phys. ecclē. T. II. &
Lentilii E. N. C. Dec. III. ann. 2. obs. 117.
schol.*

Alii denique unice in vermiculo hominem
praeexistere volunt, inter quos *Praeceptor*
est, qui omnes in eo conveniunt, ut fa-
bricam totius corporis in embryone pri-
migenio delineatam statuunt, quam de-
mum calor, & resorbtus humor, expan-
dat Addunt, eas ipsas partes, quae in
quibusdam animalibus regenerari videntur,
fere paratas adfuisse, atque unice dilata-
tas fuisse, ut de lacertarum cauda *PER-
RAULT de la gener. p. 511. cancrorum-
que chelis BOURGUET L. 3. p. 126.*
Pro hac sententia maxime adduci solent
plantarum delineationes in semine, v.g. fa-
bae, aut radice, ut in Tulipa, Colchico,
bulbo narcissi, tritici tubulo du *HAMEL*
p. 167.; tum dentes secundo subnaturi *Anc.*
Mem. de l'Acad. II. p. 8. & velut in the-
sauro ad futuros usus repositi; deinde in-
sectorum illae metamorphoses, per quas
manifestum est, animal integrum sub alie-
nissima forma, & diutissime quidem
REAUMUR II. p. 30. latere posse, donec
suo tempore, accedente velociori cordis
motu dilatatisque vasculis, occulti & invi-
sibilis animalis latens fabrica in apri-
cum prodeat. In ovo testudinis animal
delineatum ostendit *DUVERNEY Anciens*
Memoires I. p. 345. Culicis evolutionem
HOOKE microgr. p. 187.

Verum, etsi cum hac theoria educatus
fuerim, cogor tamen eam deserere, neque
enim video cum phaenomenis posse conci-
liari. Non quidem argumenta *HART-*

SOEKERI placent, sumpta ab inimaginabili parvitate primorum in Eva staminum, satis gnarus & falsum eum calculum posuisse, cum male eandem in singulis generationibus rationem ovi prioris ad stamen posuerit contentum, quae hominis adulti est ad ovulum, & denique imaginationem proportionibus definiendis ineptissimam esse. Neque moveor ratione a nupero egregio scriptore prolata *von der Natur* n. 580., non alia praeter densissima corpora esse, quae in magna ratione dilatentur, & dilatata adtenuari atque debilitari, cum in animalibus perfectum, nempe summe dilatatum, stamen primordiali illo pene infinite durius sit. Ad hanc enim objectionem respondetur ex theoria BOERHAAVIANA incrementi CCCCLXXVI. not. a. Neque moveor mollitiei staminum, apud TAUVRYUM opposita, quae non possint immutabilia poni in tanta mollitiei p. 6. ipsa enim parvitas ad perpetuitatem facere potest.

Verum ecce rationes meas. In plantis, sed perinde in animalibus manifestum est, fibras (sed animalis solida nulla sunt praeter fibras) ex liquido generari. In arboribus succus humectus abit in cellulosam lanuginem, haec exsiccata in fila, Pulpa pomorum, farina triticorum &c. merus effusus & coactus succus est. In animalibus manifestum est, per morbos, infinitis locis ex glutinoso liquido cellulosam perfectam generari, in adhaesionibus viscerum, & fibras validissimas in ossium articulationibus secundis sive analogis. Porro non cerebrum solum MAITREIEAN p. 168. sed dentes ex fluido perfecto mucoso nasci notum

notum est, absque fibris primigeniis, cum tamen inter partes corporis humani durissimae sint. Denique cellulosa fabrica, quae corporis partem majorem constituit CCCI. manifesto ex solo liquore conpingitur CCCCXXVI. c. Deinde certum est, partes nonnullas, quae fuerunt in fetu, perire & destrui, ut in papilione asperae arteriae erucae REAUMUR I. p. 613. & novas succedere abjectis prioribus; ita ventriculus & intestina in chrysalide novis subnatis intestinis a ventriculo reparantur ib. p. 370. caudaeque & branchiae pereunt ranis nostris sub solstitium HARVEI p. 118. BRADLEY *Philos. account* p. 105. (surinamensibus subnascuntur SEBA I. T. 78. E. N. C. *Cent.* IV. *obs.* 171. &c.) pulmones vero prodeunt SEBA T. CX. f. 4. 5. argumento, non talem, quales sumus, hominem, neque easdem, quae nobis, in primordiis partes fuisse, & maximi momenti mutationes in animalibus super illa primordialia flamina accidere. Hujusmodi objectiones contra PEYERUM etiam BRUNNERUS proposuit. Sed etiam regenerationes chelarum, caudarumque lacertorum plus in recessu habent, Illae quidem rudem molem, sed tamen fatente Cl. PERRAULT p. 508. *Thevenot anc. mem.* II. p. 6. cartilagines habent testas cute. Hae organicae, musculis, vasis, nervis instructae, certissime tamen simillimae reparantur, accurate observante Cl. Reaumur *Mem. de l'Acad.* 1712. p. 297. lente quidem & post solidum mensem & ultra p. 306. sed ubicunque fregeris, & in qualibet articulatione p. 301. facillime tamen in quarta articulatione p. 300. 302.

ubi maximum fractionis periculum est; Ubique vero nihilo neque minor, neque major, quam prius fuerat, ex carne tenacissimè educta, & organicam induente figuram chela redit f. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ita & pedes cancrorum p. 306 & sola forcipis altera medietas ib. & cornu, & brachia quibus cibum sibi cancer ministrat p. 307. pariter & perfecte reparantur.

Porro ipsae nobilissimae partes corporis non tales, quales nobis sunt, in primis staminibus esse, manifestum reddit cor fetus, quod ab initio curvus simplex canalis est *Malp. de ov. incub. f. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25.* Is hora vigesima octava varicosus apparet *Lancisus de corde p. 40.* contorquetur in unum f. 26. sed spiralem ductum, porroque in quatuor bullas hora quinquagesima, ut *Maitreiean p. 51.* tunc in duas vesiculas *Malp. de ov. incub. f. 29. 30. de form. fet. t. 15. 16. 17.* *Lancis p. 42.* denique die quinto vesicula dextra ad sinistram accedere incipit, & utraque ad basin cordis *Maitreiean p. 125.* die vero septimo conjungitur utraque *Lancisus p. 43.* & nascitur cor biventre *Malp. de form. f. 20.* cui vesiculae die sexto, in ovo incubato, fibrae rubrae adnascuntur *Harvei p. 61. Back alloq. p. 45.* *Malpighius* autem post triduum carnem cordis vidit *de incub. p. 7.* Haeceque mutatio etiam majoris momenti videtur,, cum per omnium scriptorum consentientes figuras & descriptiones, in his pulli primordiis, sanguis, per continuum canalem a dextra aure & cordis dextro thalamo in sinistrum cor veniat, nullo haecenus pulmonum vestigio, quos tardi-

tardius oportet subnasci : vid *Malpigh. de form. fet. de incub. p. 6. Maitrei p. 122.* Porro adeo non nostri similis est embryo, ut viscera omnia extra corpus gerat nuda tegumentis, nullis tunc costis, nullo cranio, neque abdominis musculis velata *Malpigh. de ov. incub. f. 36. 38. de form. fet. f. 17. 18.* Ita in tertio *Harveii* stadio se habent p. 182. die texto p. 62. deinde primo cor *Harveii* p. 183. ante diem decimum *Langley* p. 147. post diem septimum *HARV ex 21. Malpigh. de inc. p. 8. Lancisius p. 44.* tunc jecur *Harveii* l. c. & cerebrum *ID. ex. 21.* (cui caro die sexto supertenditur *Malpigh. de form. fet. p. 8.*) in corpus recipitur, ut 14. die adhuc intestina de pulli corpore propendeant *Harveii* p. 67. *Schrader* p. 179. sensim dein in ventrem retrahantur *Lancis p. 44. Harveii p. 234. Malpigh. de incub. f. 52. &c.* (qui tamen etiam decimo die ventriculum & intestina in ventrem recepta vidit *de form. p. 10.*) non in pullo solum, qui a partu viteillum cum abdomine circumfert *Harveii* p. 69. sed in vitulo *Deswig l. c. in dama Harv. p. 234. ex. 69. & ipso homine;* Unde retenta ex vitio aliquo fabrica pristina, non rari fetus sunt, in quibus viscera nuda adparent deficientibus abdominis involucris, ut ipse vidi, & *Horst.* post *Donatum L. VII. c. 3. Panarolus Pentec. II. obs. 1. Elsholz in progr. Zod. Gall. III. p. 28. Hildanus obs. 65. Cent. VI. A. HAFN. I. n. 110. & in E. N. c. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 232. Dec. II. ann. IX. obs. 98. Vol. 1. obs. 236. Cowper T. 61. Stalpart van der Wiel Cent. II. obs. 33.*

Bresl. 1721. M. Jul. 1724. M. Apr. Mekren obs. c. 6 Comm. Nor. 1737. hebdom. 10. 41. 42. T. 1. f. 1. E. N. C. vol. VI. obs. 10. Buchner 1739. p. 515. Ill. Teichmeyer med. for. p. 87. Giorn. de Lettere d'Italia Vol. XXXVI Non ignoro Cl. Maitreiean negare hanc cordis nuditatem p. 110. 116. 117. 185. ad diem usque decimum octavum, quo in pectus recipiuntur p. 253 suffecerit autem, etiam ipso fatente, intestina extra abdomen esse.

Ultimo omne fere effugium auferunt experimenta in plantis & animalibus facta. Arborum quidem quaecunque particula plantata totam cum infinitis floribus, fructibus, foliisque arborem repraesentat, & tamen in eo ramo nihil fuit, praeter fistulas, & cellulosam fabricam, qua fistulae farciuntur, idemque ramus, qui nunc floret, si inverso loco plantatus fuisset, pari facilitate, abiisset in radices, a foliis floribusve diversissimas. Haec notissima sunt. Sed id novum est, polypum aquaticum, ignobile animal, aut sponte deponere brachia juvenescencia, quod viderat anonymus Anglus in *Phil. trans.* n. 288 *abrigd.* vol. V. P. 11. p. 288. seqq. aut discissum & discissorum particulas, & demum animalis medietates secundum longitudinem separatas *Reaumur* p. LV. restituere perfectum animal, quorum singulum post paucas, 7. 8.ve horas, aut certe viginti quatuor *Reaumur* p. LV. venabitur, & sumet cibum: deinde discissas particulas sibi adplicatas iterum solidescere in integrum animal, etiam inverso modo coaptatas *D. Trembley* inven-

tor

tor est miri phaenomeni, quod casu potius quam de industria reperit *Reaumur* p. L. III. & in *Phil. trans* n. 466. & apud *Baker of microsc.* Deinde *Jussieu* ib in alia specie polypi & *Reaumur* in *Praef. ad VI. tomum hist. inf.* & in tribus polyporum speciebus i. d. p. LVII. & in aliis animalibus p. LIV. tum *Lyonnet* ap. *Reaumur* p. LVI. *Mortimer* in *add. ad Phil. Tr. Vol. XLIII* eadem viderunt. Eandem nunc constat proprietatem esse magnae illius classis stellarum & urticarum, neque paucorum inter animalia aquatica *Reaumur* l. c. p. LXIII ex piscatorum & accuratori *D. Guettard* & *Gerard de Villars* observatione p. LX. LXI. LXIII. & *Jussieu* *Baker* p. 99. & eam in vermibus aquaticis a *P. Maioleni* repertis *Reaumur* p. LVII & *Bonneto* teste ib. p. I. VI. & *Reaumurio* ipso p. LVIII. & terrestribus demum lumbricis I. D. p. LXIV atque scolopendris p. LIX. & quibusdam hirusinibus p. LVIII. dominari. In his omnibus, quod crus fuit, id nunc in caput, os, ventriculum, totumque corpus insecti fingitur, uti ramus arboris plantam totam reparat. In scolopendris vero organica pariter fabrica, & aculeus renascitur, quo praedam confodiunt *Reaumur* p. LIX. & in lumbricis caput in parte posteriori generatur, partesque generationis, capiti in hoc animale proximae p. LXIV. Difficillimum nunc mihi videtur dictu, quod tamen necesse est dici ab evolutionis fautoribus, quomodo in systemate primordialium & constantium fabricarum, pater polypus fuerit series connexa diversorum animalium, quae omnia conjuncta quasi articulati, in unum animal

confluant, una moveantur, una ventriculo alantur, una voluntate gubernentur, & eadem tamen animalia aut sponte aut per vulnus, secedant separata in suae spontis animalia, absque excussis involucris, absque deposita parte, quae primordiali polypo cohaerent, & uno verbo quomodo, quae mane taleolae spinae, ventriculi, capitis fuerunt, ea a meridie in vera capita & integros ventriculos abeant. Admiratio vero major est, si etiam secundum longitudinem dissectos polpos consolidari, atque in animalis integri fabricam redire observes apud MORTIMERUM p. IX. REAUMUR. Denuo augetur miraculum in REAUMURII experimentis, in vermibus terrestribus captis, quorum pars posterior non ventriculum solum & caput, sed partes genitales reproduxit, ut supra dictum est. Nulla hic spes explicationis, nisi concedas fibras polypi infinite constantes, quocunque modo dissectas, iterum se adtrahere, inque animal configurare posse, cujus nulla in his fibris similitudo fuerat. Taeniae humanae huc pertinere videntur.

Quare mihi quidem videtur haecenus probabile, animalium partes successive, ex fluido, secundum certas leges generari, ut *Aristoteles* docuit *de gener. anim.* L. II. c. 4. *Harwei* *de gener.* p. 122. *Hartman* E. N. c. Dec. III. ann. 9. 10. & nuper auctor scripti *von der natur* n. 885. & Cl. *Noortwyck*, & Cl. *Ludwig* in propriis thesibus. Leges autem istas minime definimus: a fermentatione tamen omni longissime credimus abesse, quae

quae & nimis subita, & nimis, in tanta teneritate violenta, nihilque organici paritura sit VALISNERI c. XV.

Ergo, si quidem vermiculum pro primordio hominis admittere videtur, vasa forte aliqua suis percurfa liquidis in vermiculo fuerunt, quae sensim complicata, subnascente ex densato effuso liquido spatiorum cellulorum cellulosa tela, in cor, arterias, viscera, musculos contrahuntur. Venae & arteriae sunt fundamenta corporis HARVEI p. 64.

Plasticarum idearum etiam non pauci, neque exigui patroni sunt. In animalibus quidem animam corpus suum sibi struere GALENUS disertissime docuit de *form. fetu*, & Themistius, & J. C. Scaliger, & Bobnius de *offic. med.* p. 622. & nuper pro re certissima tota *Stablii Secta* docuit. Modificationem etiam partium regeneratarum quodam omnino modo animae tribuebat Perrault de la *gener.* p. 512. Verum, cum alii viderent vegetabilia multis, & valde essentialibus notis cum animalibus convenire, non animas, in plantis vix credibiles, sed entia peculiaria fabricandis corporibus organicis praefecerunt. Ita Harvei (si recte intelligo) p. 45. Cudworthus, & Grew in *sacra cosmol.* & Rai *synops. quadrup.* p. 34. Haec etiam sententia placuit Collinsio p. 620. Wepfero E. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 129. Drakio L. I. c. 24. Venette, & Nigrisolo qui hanc animam *lucem seminalem ideatam* vocat p. 337. 338. [quae in ovo fetum deli-

delineat. Ipse denique *Redus* insecta gallarum ab anima arborum vegetabili strui credidit *de gli insetti* p. 88.

Adducunt fere priores, *Stahliani* maxime, naevos ab imaginatione materna STAHL p. 492. similitudinem parentum, errores, monstra, manifesta, ut credunt, argumenta & strui fetus, & ab ente finito strui, & in struendo mutari posse. Verum ante me *Valisnerius* ornate demonstravit, nimis artificiosam esse fabricam animalium, quam quae possit ab anima imperfecta, saepe stulta, semper ignara & inscia strui c. XV. n. 9. atque NIGRI-SOLIO reponi potest, quando praedelineata stamina dicit esse, & animam tantum secundum divinam delineationem struere p. 342 id omne quod contra evolutiones dictum est Sed etiam Lockiana demonstratio huic theoriae repugnat, ex qua constat omnes ideas, adeoque omnem peritiam nobis per sensus advenire, nullam adeo animae pulli gallinacei sui corporis struendi, nullam animae fetus humani fabricandi corporis humani facultatem esse posse. Non ignoro λογον & λογισμον, voces, quae intellectum absque perceptione rei intellectae, voluntatem absque notitia ponunt ejus, quod volumus. Deinde plurimum contra animae vim structricem faciunt exempla plantarum, quarum singulae partes singularem arborem reparant, adeoque in una arbore infinitas animas poni necesse foret, quod validum argumentum, acutissime, ut solet, urfit Ill. *Werlhofius* noster *cautel. de febrib.* p. 78. De naevis vide not.

2. *Mare*) Exstinctio g* vividi genitalis humoris. Singularia experimenta in hanc rem capta sunt. Testium ablatio hoc demonstrat. Crudelitas hominum ingeniosa est: docuit spadones facere, quibus soli testes contunduntur, ut secernere desinant. Penem habent, & proltatas, & unice desunt animalcula, sed steriles sunt g**.

Fe2

not. cc. & interim accipe, nihilo rariores in plantis naevos esse, & monstra, & bicipitia stamina, & petala ex staminibus, ex nectariis multiplicata, ubi manifestissimae degenerationes, similes illis, quae nostris fetibus accidunt, absque suspicione, nisi fallor, aberrantis animae, per sola hortulanorum mangonia procurantur.

Modulorum denique theoria inexplicabilis est. Nam modulorum icones recipit cera, sed congruens & aequalis modulo: quid autem ad corpus virile guttula feminis? & quatenam liquidi confusi inorganici cum perfectissima fabrica corporis similitudo? Tum recte *Aristoteles*, etiam a mancis integros generari *hist. anim.* L. VII. c. 6.

g* Inde sterilitas a gonorrhoeis DCLI. neque tamen perpetua, nam etiam a lue cum reliqua valetudine sana animalia reparantur. Huc forte pertinent frigiditates hominum optimi habitus, passim observatae E. N. C. Dec. III. ann. IV, obs. 32.

g** DCLI. Verum in viris multae aliae causae huc pertinent, omnia nempe vitia, quae feminis boni validam ejectionem ex urethra impediunt: ut scirrhi prostatae, ca-

run-

Femina) Quando vel ova bona defunt, vel ovaria scirrho vitiantur, vulgatissimo malo; nihil enim frequentius est in steriliū feminarum cadaveribus, quam scirrhomam in ovario duritiem, aut hydatides reperire. Possunt etiam ovaria ablata esse, quod fit in porcibus; his enim exsectis ovarii nullus unquam partus sequitur, licet venerem passae fuerunt. Porro inter causas obstructionis est tubarum ^k Fallopiarum obstructio. Iterum uterus potest nimis siccus esse, aut nimis fervido perfundi sanguine, aut potest mala in fundo uteri dispositio adesse ^l, quae intercedit, ne placenta ibi adfigi, aut uterus expandi possit, frequens etiam malum, centies visum HARVEIO.

runculae five cicatrices circa verumontanum DCLIV. defectus aliquis in erectione &c.

h Ut ex *Morgagno* citavi, & ipse reperio, nihil steatomatibus, & hydatibus ovarii frequentius esse.

i DCLXVIII.

k DCLXVIII. *Ruyseh obs.* 83.

l Qualis frequentissime post abortus superest, novorum causa abortuum. Sed & scirrhi in utero steriliū vulgo reperiuntur *Roussel de partu caes.* c. 3. *Hildanus Cent.* I. *obs.* 65. 66. *Hipp. περὶ γυναικ. β.* Et sola obesitas sterilitatem facit apud *Hippocratem*, *Panarolum*, *Schurig. syllepsiol.* p. 173. & *Gehema*, & alios. Sterilitas plerumque est a feminarum vitio *Manningham* p. 47. *Auctor tr. de l'impuissance Paris.* 1611. II. p. 46.

VEIO. Praeclare HIPPOCRATES ^m, mulierem non concipere, vel quia uteri rheumatismo laborat, *μυκτηρισμῶ* aut mucoso fluxu, qui per purgantia medicamenta fortissima sanari potest: Eundem eventum post diuturnum fluorem album saepe vidi, & sanitatem diaeta exsiccante, myrrha, rheo, aut tamarindis restitui, uti egregie CHARLETONVS monet. Ita enim siccatae cotyledones melius comprehendunt, quam prius, in nimis lubrico utero. Si a scirrho uteri malum fuerit, laxantia adjuvant, & balneorum usus.

Utrisque) In Gallia illustris casus ^a contigit. Princeps (I. G. nobilis) erat, qui diu cum optima uxore in sterili conjugio vixerat. Ultimo ex iudicio supremæ curiæ conjugium solutum est. Eodem consilio capto maritus in viduum thorum aliam uxorem ducit: & vidua nupsit alteri: & ille filios, hæc prolem pariter ex secundo conjugio tulit. Adparet fecunditatem etiam a mutua quadam relatione pendere posse, absque ullo absoluto vitio, aut viri, aut feminae. In brutis animalibus observatio frequentior est, & saepe accidit, ut generosissimi caballi equas minime inpraegnent, quae ab aliis admissariis facile concipiunt.

3. Ma-

^m περὶ γυναικῶν α. de mensibus pituitosis.

ⁿ Exempla passim reperio, sed, fateor, fere ad defectum veri amoris refero. Habet *Aristoteles* L. VII. c. 6. la *Motte* L. III. c. 4. *Manningham* p. 48. E. N. C. Cent. 10. obs. 67.

3. *Masculino*) Ita ineptissimus homo PARACELSUS o adfirmavit, puerum nasci posse, cumque a peccato originali liberum, tenero quidem corpore, sed excelsa mente, omnium scientiarum peritum, & arcanorum, atque ali posse quintessentia panis. Somnia mera sunt, neque enim ullum adeo abjectum animal est, quod a solo mare generari queat, aut planta ulla.

4. *Femina*) Confirmant quidem publicis iudicum p testimoniis, id fieri posse & accidisse, ut feminae vel absente marito, vel eo mortuo conceperint, absque adulterio, ex luxuriosis insomniis & vivida imaginatione. Verum tunc credam, quando unicuique exemplum in rerum natura mihi demonstrabitur feminae, quae absque mare, ex ovo fetum genuerit. Video mulieres fuisse, satis astutas, ut persuaderent credulis, a Marte se inpraegnatas fuisse: alias, quae cum veretro ex foco prominente consuevissent, atque peperissent, ut de Theseo narrat PLUTARCHVS. Verum in rerum

o Conf. Marc. Don. p. 466. Franci satyr. p. 354. ex semine nempe virili, in phiala, calore fimi equini cohobato, posse educari homuncionem.

p Praeceptor tangit responsum Senatus Gratianopolitani, quo partus, ex absente patre per imaginationem conceptus, legitimus pronunciatus est Sed historia tota suspecta est Barthol. hist. Cent. VI. p. 298. & falsa Act. Hafn. Vol. V. obs. 84. p. 202. Gui Patin in epist. Vide huiusmodi fabellas apud Schurig spermatol. p. 223.

rum natura nihil simile contingit p*. De potentia vero creatoris hic nullus sermo est. Imo adparet, conjunctionem marium cum simili-

p* Hic paucissima dicenda sunt de æquivoca generatione, quam omnis antiquitas admittit. Omnia animalia, inquit *Aristoteles*, generantur aut sponte; aut ex ovo, aut ex parentibus *hist. anim.* L. V. c. 1. Recentiores, & strenue inprimis *Redus* & *Valisnerius*, inceperunt se huic opinioni opponere, quam etiam *Leewvenhoeckius* refutat *exper. & cont. ep.* 75. & inprimis demonstravit *Redus*, omnes vermes ex parentibus generari *Esper.* p. 9. &c. neque unquam carnes bene clausas verminare, experimento in Anglia a Societate Regia facto jam a. 1663. *Monconis Itin.* V. ll. P. ll. p. 47. tum a *Redo degli insetti* p. 16. 17. 20. *Lancisio de palud. nox.* L. I. P. I. c. 16. *Valisnerio in dialogis* p. 166, *Leewvenhoeckio* &c. nasci vero a muscis, quae magno conatu carnes putrescentes circumvolitent, & ova eo contentur deponere *Redi* ib. p. 15. & ne in caseo quidem vermes absque muscis nasci *Idem* p. 64. Nunc error iste exolevit. Frustra *Bonannus* numerosas objectiones protulit, & *Triumphettus*, & *Hon. Fabri* p. 186. & inter recentiores aliqui, ut *Breslav*, 1722. *M. Nov.* & experimenta proferunt aliqua, alii quidem de vermibus in clausis locis nascentibus, a *Redo* refutati *degli anim. viventi* p. 40. 41. alii (ut in *E. N. C.* Dec. III. ann. 9. 10. obs. XI.) ova producunt ex papillione virgine, ab ipsa nativitate sua custodita, posita, nemo fere
supers

similibus feminis adeo necessariam p** esse, ut ex parentibus non ejusdem generis monstra

supereſt, qui credat, ſoli calori, aut putredini, tantum ſapientiae eſſe, ut pulcherrimam fabricam, quae eitam in minimis infectis elucet, poſſint ordinare: cum praeterea, ſolis exceptis Polypis & congeneribus, omnium animalium ova nunc nota ſint, & etiam polypi non ſponte, ſed ex parente, aut trunco certe generentur, aut ex ovo *Reaumur* l. c. p. LXXVI.

p** Nempe in noſtro, & ad finibus generibus animalium. Piſces demum ova ponunt, poſt breviffimam, ſed aliquam ſexuum conjunctionem *Duverney* *anciens mem.* ll. p. 112. Nam in genere limacum immobilium, omnino notiffimum eſt, utrumque ſexum ineſſe ſingulo animali *Borell. hiſt.* 84. *Cent.* ll. *Leeuwenhoeck phil. trans.* n. 336. *Swammerdam de reſpir.* p. 114. *Hiſt de l'Acad* 1708. p. 58. *Redi degli anim. viv.* p. 22. T. XI f. 1. *Liſter de hum.* p. 129 *Bradley Phil. account* T. XXIII. f. 3. Sed & terreſtres lumbrici androgyni ſunt *Reaumur* l. c. Aliquando vero & piſces du *Hamel* p. 254, & cancri androgyni reperiuntur. Porro claſſes dantur animalium in quibus aliquae feminae, mares plures; plu-rima individua absque ſexu ſunt. Huc apes pertinent, ex *Swammerdamii* obſervationibus, & fuci *Reaumur* T. VI & formicae *Lindervall de formic.* gregaria fere animalia. Deinde in immobilibus, teſtaceis animalibus, ova vera concipi in omnibus indiv-
duis absque ullo ſexuſ discrimine, certum eſt. Denique
in

stra nascantur unice, destituta genitali potentia 9. Quando gallus phasianus vulgarem

in stellis, echinis, urticis, penna marina, balano, taenia, polypo, nullae unquam genitales partes alterutrius sexus haecenus innotuerunt *Bourguet* p. 78. *Mortimer* p. VI. VII, atque soli polypi propagant speciem ab omni commercio remoti *Trembley* ib. Sed & pediculi, tenerum, & molestum genus animalculorum, pariunt absque vere viva animalia, experimentis exquisitis captis BONNETO teste apud REAUMUR Tom. cit. r. 530. 550. &c. & BAZINO & *Tremblay* ibid. p. 538. & *Reaumurio* ipso: quibus *Leeuwenhoeckius* & *Cestonius* praei-
verant. Augetque miraculum, quod idem pediculorum genus *Lyonneto* auctore p. 553. etiam coeat, uti ipse muscas, mares pediculorum, nimis frequentes video in hybernaculis. Adparet ex istis, non adeo, quam putabatur, uniformem in generando naturae methodum esse.

q ARISTOTELES *gener. anim.* L. II. c. 7. magna sapientia Creatoris, qua cautum est, ne repetitis disparibus conjugiiis, novae infinitum species nascerentur VALISNERI c. 20. n. 17. *Pluche hist. du Ciel* II. p. 262. 263. In catopardo, hybride ut creditur animale, nulla vasa spermatica & organa generationis valde imperfecta *Parisini*. Ita muli, omni satellitio generationis instructi, PEYER *exerc.* p. 156. & mulae, ovariis & ovis praeditae, vix unquam pariunt, ut inter monstra soleat referri. Exempla tamen habet de mula *Aristoteles hist. anim.* L. VI. c. 22. sed rarissima

rem gallinam comprimit, hybris nascitur, pulcherrima in mensis, sed inepta speciei propagandae *.

5. *Menstruus*) Haec tota theoria ex Asia & ad nos adlata est. Ibi homines in otio vivunt, molles prae calore & sedentarii. Feminae plerumque largissimos menses patiuntur. De hoc sanguine aliquando non-nihil in vagina manet, & intra sex vel decem horas in foetidissimam putrilaginem abit. Sed etiam columbae sanguis, vertici hominis apoplectici inpositus, post paucas horas immane foetet. Hinc illa mensium detestatio, & omnium gentium consensu in fervidis Asiae, Africae, Americae, regionibus

L. XI. sub finem, & *Carpus* p. CCLXX. & *Opusc. Scient.* XIII. p. 149. & in Africa frequens esse *Columella* refert L. VI. c. 37. Neque credo mulas illas Syriacas, quas *Aristoteles* dicit ordinario parere *hist. anim.* L. I. c. 6. L. VI. c. 24. aut indigenas deserti Tartarici du *Halde descr. de la Chine* V. IV. veras, nostratibus similes mulas esse. Fatetur ARISTOTELES, Syriacas illas non ex equi & asini mixtione nasci *hist. anim.* L. VI. c. 36. Mulas autem paulo frequentius generat ARISTOTELES *hist. anim.* L. II. sub fin.

r Inter aviculas etiam, quae ex eadem passerum specie sunt, ex disparibus conjugiiis infecundi prodeunt fetus, ut ex Canariensi canoro passere, et nostrate cardueta etc. *Willughbey ornithol.* p. 10. et de phasianis ex gallina natis FABER apud

HERN. p. 772.

s DCLXVII. not. n.

bus balnea feminis inperantur. In nostra etiam patria similia vidi in feminis immundis, aestivo tempore menses passis. Si nunc vir hujusmodi feminam iniverit, in cujus vagina putridus sanguis stagnat, & ad fervidum aerem veneris aestus accesserit, incidet utique in pessimos morbos partium genitalium, etsi diversi fuerint a vera lue celtica. Haec infamiae causa fuit menstruo sanguini: & eadem ratio est, quare MOSES saluberrimo, neque alia dedit unquam, praecepto edixerit, ne vir menstrua patientem feminam conprimeret; si contra legem faceret, ut id capitale esset; diesque certos & a partu, & a fine menstrui fluxus definivit, post quos, balneis primo ablutae, feminae liceret virum admittere. Sacerdotes Judaeorum, qui dudum in literis haerent superstitioni, hanc vetustam observationem ita auxerunt, ut etiam auram mensium venenatam esse dicerent, & erodente vi adeo pollere, ut radix *Baaras*, quae circa Hierichuntem proveniat, neque ulla herculea vi evelli possit, huic uni arti cedat, si femina menstrua patiens circulum circa radicem ambulando descripserit. Ita porro receptum est, maculis faedari specula, si menstruata mulier inspexerit, & deleri, etiam retro vitrum, vivum argentum. Quanto sapientius HIPPOCRATES: Sanguis sanae feminae profluit ad heminam, talis, qualem ex mactata victima defluere videmus, recens nempe & purissimus, nisi enim victimae sanissimae essent, non poterat litari. Tum demum putrescit effusus cruor, quando inter plicas sinus pudoris stagnat. Non aliter, ac ipsi mares,

in regionibus fervidissimis Colchidis, Asiae, Africae & Americae praeputium refecare coguntur, nisi gravissimis circa eas partes morbis maluerint laborare. Non ideo venenum in praeputio gerunt, si aliquando morbifica corruptio ibi nata est.

Miscela) Vulgo recepta opinio est, semen unius sexus seorsim infecundum esse, conjunctum utriusque sexus † semen & mixtum,

† DCLXXI. sententiam istam ornate proposuit *Empedocles*, partim in masculo semine, partim in muliebri, fetus partes existere, sed discerptas, & divisas, eas deinde uniri in fetum *Galenus de semine* c. 2. ut pars gibba cavae, & vicissim respondeat *Aristoteles de generat. animal.* L. IV. c. 1. L. II. c. 8. L. I. c. 18. quam sententiam perfecte renovavit Anonymus Anglus auctor libelli *essay on fecundation* p. 24. 25. Et *Hippocrates περὶ γυναικῶν* n. 7. etc. pene similia docuit, ut tunc crederet filias generari, quando semen muliebre praevaleret, musculos autem fetus a vincente maris semine. Id repetit *Aristoteles*, ut tamen sexum imprimis ab eo semine praevalente pendere ajat, quod de genitalibus decidit *de gener.* L. IV. c. 1. nuperque Cl. *Hofmannus Physiol. reform.* p. 341. *Voglius* eadem renovavit ll. p. 200. et Anglus ille semen maris per poros ovi subire, hoc dissolvere, partes similes seminis maris ad similes seminis femini partes accedere, sic viscera nasci *on fecundation* p. 18. sexumque a praedominio animalculi, vel seminis muliebris pendere p. 45.

stum, in rudimentum fetus abire. Haec sententia, ridicula certe, licet a CARTE-SIO^u & THEODORO CRAANEN proposita sit, videtur niti in experimentis: cum mulier in venerea tentigine, luxuriosum omnino succum emittat, perinde uti vir semen effundit. Verum, post LEEUWENHOECKII & MALPIGHII conjunctas observationes, evictum esse videtur, patrem prolem dare, matrem excipere, neque muliebri semen ad generationem aliquid sui corporis missione conferre; sed eam legem esse, ut absque materno utero, nullum semen frugiferum possit fieri. Nam anatomici observarunt, ea vasa, ex quibus humor libidinosus feminarum in congressu erumpit, omnia omnino exitui vaginae respondere *, & nihil ad cavitatem uteri dimittere, atque muliebrem lascivum humorem perinde, ut virile semen, extra corpus effundi.

Fermentatione] CL. DRELINCOURTIUS, quo nemo partes genitales mulierum curiosus

^u *De formato fetu.* Sed iste Galenum fere secutus, *de semine* L. I. historiam narravit, quomodo secundum aliquas, & satis simplices motus regulas, ex semine effervescente, animal generari queat. Et nihilo sapientior *Maximus* formationem tetus explicat, a particulis seminis utriusque sexus secundum leges specifici ponderis se ordinantibus *Inst med. mech* p 212.

* *Harvei* p. 95. & addit, feminas perinde concipere, etiamsi nullum humorem excreverint.

fius descripsit, docuit in eximio libello, quem *de coceptu* edidit, masculinum semen scate-
re tale volatili oleoso ^y, qui inertem feminis
feminini massam vivificet, & ad frugem
perducatur. Sed semen masculinum a natura
volatili tota indole abhorret, cum vix aliud
inter humanos liquor lentior sit, & semen
retinetur perfecte secundum in hominibus
caste viventibus per menses & annos, neque
virtus exhalat.

7. *Actio*) Non alia videtur, nisi feminis
vitalis masculi cum feminino ovo adunatio.
Hinc adparet, optimum esse *conceptus* ^z vo-
cabulum, & eleganter dici in textu hebrai-
co, posteros ex lumbis Adami prodiisse,
Evam vero, cum ipsam ADAMVS cognovisset,
concepisse & peperisse.

8. *Certus*) In brutis animalibus multipa-
ris, utero praeditis bicorni, quorum cornua
uterina ex ipso fine suo tubam educunt, in
his inquam brutis, conceptio in ovario per-
ficitur. De causa vero conceptionis duplex
opinio est: HARVEII prima, qui, cum se-
men in uteris brutorum animalium, post
venerem apertorum nullum ^{aa} reperiret,
docuit, vim masculini seminis fecundantem
resorberi in sanguinem, & circulatione obita
deponi

y *De Conceptu per.* 31. expulsae ex vi fermentante,
radiculae &c. Sed gerimen tamen a mare admittit *de sem. mul.* n. 18. Ita
vim plasticam in parte seminis spirituosam
residere ait *Collins* p. 620. & spiritum se-
minis masculini generatorem vocat *Craanen* p. 710.

z Conf. DCLXXXIII. not. l.

aa l. c. not. f.

deponi ad ovarium, & ovum fecundare, ut in hac sententia ovum, jam a motum, ex ovario, non possit fecundari unquam. Altera sententia est eorum, qui statuunt, uterum feminae, quae concepit, claudi, & semen masculinum retinere, ejus seminis partem nobiliorem, per anfractus tubarum, ad ovarium venire, atque ibi, in ovario, conceptum fieri. Si vero ovum jam de ovario solutum secesserit, video posse etiam in tubis, & in cavea uteri concipi, neque, quid obstet, reperio. Ego certe credo, nullum certum locum esse conceptui, atque semen masculinum etiam alibi, sed imprimis in Fallopii tuba, ovo occurrere, & id ovum inpraegnare. Nam in ovario, in tuba. Fallopiana, & ad initia hujus tubae, ubi ex utero prodit, & in vagina denique fetus repertus est.

9. *Formam*) Historia naturalis multa confirmat, quae huc pertinent, & perinde incredibilia & fabulosa videntur, ac LUCIANI historiae, & aequae tamen certo contingunt, ac id, quod est evidentissimum. Objicies, si mater nihil ad rudimenta fetus confert qui potest mutare fetus? Verum est omnino, non habere sub arbitrio potestatem mutandi fetus. Nihil hic voluntas potest, si posset aliquid, quot matres puellas, quas gerunt utero, in filios mutarent! Sed neque imaginatio, etiam validissima, hic vires habet, vidi enim feminas, quae per continuos menses aiebant, se parituras esse fetum deformem ^{aa*}, oberrare enim suo ani-

aa* Cum a malacia maculatus puer expectare.

animo figuram turpissimam fetus , quem essent editurae , neque unquam ex memoria decedere : & tamen post tot querelas , vidi peperisse sanos & pulchros pueros. Verum tunc aliquid in fetu mutando imaginatio potest , quando subito , absque ratio-
cinio , cum horrore aliquo oritur , quocunque demum mense hoc malum acciderit. Hic horror comes individuus est peregrini , recens adlati. Nam a vi , febrem factura , primum accedente , horror nascitur ; A spectaculo misero viso horremus , & in universum id nobis accidit , quoties humores nostri vel in copia , vel in motu , insolito modo se habent. Ab hac nunc horrida imaginatione , fetus idem patitur , quod contingit fieri in eo corpore , a quo horror in matre excitatur. Vidi IPSE experimenta , meis oculis. Sapientissima , & primaria femina fuit , cui in nasi apicem , cum sub moro ambularet , fructus hujus arboris illapsus erat : continuo , dum illabitur miserissima bacca , pictum est in apice nasi embryonis morum , perfecte expressum , magnitudine , colore , subrotundis acinis , scabritie , minimisque pilis ; & recruduit ea nota , quoties ea arbor similia matura mora ferebat. Hic nihil factum est , quam levis adtactus nasi materni , & tanta tamen in fetu sequuta mutatio. Si objiceret , idem forte signum fuisse in naso fetus apparituum

Etaretur , sanus prodiit *Panarolus Pentec.*
II. *obs.* 50.

bb Et a novo chylo sanguini admisso &c.

rum, etiam si mater minime sub moro ambulasset, nihil videberis probabile dixisse aut dignum Philosopho. Novi, quid Anglus ^{cc} scriptor ediderit, sarcastico stylo in hanc

cc Haec naevorum historia mihi difficillima videtur. BLONDELLUS equidem, contra totum genus humanum, tuetur, nullos omnino naevos dari, neque in fetus corpore quidquam vitari ex matris quacunque adfectione: Et satis, ni fallor, demonstrat, neminem explicasse hactenus, quomodo vis ista a matre in fetum operetur. Structrix illa anima STAHLII non explicat modum agendi, neque potentiam maternae animae, diversae a structrice fetus anima. Spiritus, & nervorum communio, a VIEUSSENIO & in E. N. C. Dec. II, ann. 8. obs. 132. & a Bradleyo phil. acc. of the works of natur p. 168. proposita, debilissimo nituntur fundamento, nervorum nempe, quos nemo vidit, ab utero ad placentam commutatione. Deinde facile visu est, sanguinem ex utero materno in placentam per minuta fere vasa resorberi, neque ullo inpetu ad fetum venire, qui possit partes solidas, & perfecta ossa, destruere, ut in *Helmontianis* historiis.

Interim obruimur historiis innumerabilibus vitiorum omnis generis, quae fetum adfecerint ex matris culpa, in muliere quidem frequentius, sed non nunquam in brutis animalibus. Ex viso camelo equa peperit pullum ungula fissâ genu calloso, ut in camelo solet DIEMERBROECK p. 171. Feli naevus ex terrore matris

hanc vim formatricem invecus. Nihil inde sequitur; quod phaenomeni causam non intelligamus. Vellem respondere rogatus,

matris *Bresl.* 1723. p. 672. & in *fat. Siles.* n. 1. obs. 10. Porcellus cum elephanti proboscide *Schurig. sylleps.* p. 628. In hin- nulo dentium caninorum imago, quum gravidam matrem canes adsiluissent *Comm. Lit.* 1735. b. 10. Capella urfinis pedibus, cum mater ursum saltantem vidisset *BRESL.* 1719. p. 325. An neganda omnia? durum videtur. Ego, si iudicium licet interponere, non alios unquam naevos vidi, praeter maculas omnis generis, & cutaneas quasdam excrescentias, quas imaginatio in mora, mures, passeris, flammis, transformaverat: poterat autem quaecunque alia causa produxisse, quae vel cutem alicubi eroserit, vel adliserit in validissimis calcitationibus. Huc pertinent ricinus *Phil. Trans. abr.* IV. P. 2. p. 124. caput felis sp. I. n. 10. *Aët. Siles.* vaccinium rubrum *Hagendorn* malum punicum *P. Servius* apud *Schook* p. 10. uva 10. ib. cerasum *Schook* p. 65. bacca nigra p. 16. fragum p. 52. rubique bacca in seipso p. 5. morum *Praeceptoris & Hartsoekeri suite des conj.* p. 141. *Schook de sign. fet.* p. 64. ex aliis & p. 14. *Schurig syllepsiol.* p. 544. *Sennert de consensu Chym.* ostreum *Schook* petasunculus *Schrader obs.* 9. Dec. IV. mus *Weinreich Schook* p. 14. *Plot nat. hist. of Staffordshire* p. 269. maris caput *Schook* p. 15. ficus *Stalpart Cent.* II. obs. 36. tumor carnosus ad anum fetus *E. N. C. Dec.* II. *ana.*

gatus, cur a conflictu globorum eburneorum quiescat, qui motus fuerat, alter autem motu a priori sublato propellatur. Alia femina

ann. 8. obs. 187. in aures carneaE BRESL. 26. vers. p. 590. caput vitulinum filiae adnatum, ut tamen resecari potuerit Valisneri: Maculae ab incendio viso Horst. post Don. p. 671. Leigh nat. hist. of Lancashire L. II. p. 4. & a circumcissione spectata Schurig syllepsiol. p. 554. color ruber E. N. C. Dec. 1. ann. 2. obs. 83. & niger E. N. C. Vol. 4. obs. 98. & maculae a vitis lapillis Boyle de color. p. 164. aliaeque Schurig embryol. p. 210. stigmata in dorso Salmuth. Cent. II. obs. 15. & barba cana Schook p. 56. & quot non alia. Sed etiam dirissima illa vitia, quae fere naevis tribui solent, defectus artuum, apertum abdomen, Hoechstetter, Bresl. 1721. M. Jul. E. N. C. Dec. II. ann. 9. obs. 98. Gockel tumor medullae spinalis E. N. C. Dec. I. ann. IV. obs. 22. &c. Dec. II. ann. 8. obs. 187. spina bifida TULP. observ. L. III. c. 30. & hydrocephales HILD. obs. 3. Cent. V. MARC. DONATUS L. II. c. 9. & amissum labium alterum BUCHNER misc. 1729. p. 592. BRESL. 1726. p. 238 & labia leporina SENNERT de consens. Chym. P. SERVIUS apud SCHOOK. p. 9. E. N. C. Vol. VI. obs. 10. BOHN. de offic. med. p. 660. MARINI operaz. p. 235. WALTHER de cur. par. p. 22. & resectum palatum E. N. C. Cent. IV. obs. 134. & cerebri galeaeque defectus E. N. C. Dec. I. ann. 9. 10. obs. 23. ann. IV. V. obs. 27. L. BOUR.

femina ducebat fila , aut aliud quid agebat muliebris negotii , cum subito respiciens aditantem videt mendicum , stantem ante fene-

BOURGEOIS II. p. 71. HARDER *exerc.* 23. aut ossis occipitis , ut KER-KRING *obs.* 64. ea omnia longe frequentius & certius , & ipse vidi , & alii , absque ulla suspitione originis imaginariae orta , eaeque omnes vitiosae fabricae pendent a primordiali fabrica fetus , non vitiosa , sed retenta. Fetui enim abdomen apertum est not. c. & cerebrum nudum *ib.* & os enormiter fissum , atque labium superius , inferiusque nullum. Durum autem videtur , simillima mala frequenter quidem ex vicio aliquo mechanico , in fetu ipso & solo radicato , alias ab imaginatione materna oriri. Et , si millies fetui abdomen apertum , aut labii superioris pars deficiens reperitur absque imaginationis vicio , cur in uno infrequentissimo casu hanc advocaremus ? Ita fere veteres docebant , ex parentibus mures plerumque quidem nasci , aliquando tamen ex nubi-
bus aut putri limo. Porro certum est , monstra plurima bicorporea nasci , absque ulla imaginationis culpa NIGRISOLI p. 5. DUVERNOL *act. Petrop.* V. p. 255. in homine , quadrupedibus , avibus : nihil enim frequentius pullis , quibus pedes duo superflui inter veros pedes exeunt , ranis denique , quarum imaginatio non magni hactenus facta est. Ut rarissimum sit , etiam ex conjectura hos casus ad imaginationem referri , quod fieri video de gemellis connatis a PAULINO & ZOD. GALL.

feneſtram, labio turpem leporino, & ipſo palato fiſſo. Concutitur horrore miſera, & poſt feliciffime editos pueros pulcherrimos, infantem enititur, cui labium, & palatum ita recenter fiſſum eſſet, ut etiam ſtillaret ſan-

GALL. 1683. p. 249. Adparet adeo, multo majora vitia in tetubus oriri absque terrore, aut animae maternae vitio, nihil adeo eſſe; quare pro exhibitis illis morbulis invocemus inconprehenſibilem aliquam harmoniam fetus cum matre. Iterum certum eſt viſo vitio cari pueri matres in memoria ſua ſollicite quærere, donec aliquem animi adfectum inveniant, in quo conquieſcant inventa mali ratione. Sed video etiam homines, qui plurimum circa partus hominum verſati fuerunt, parum his naevis tribuere MANNINGHAM p. 51 MAURICEAU p. 66. tum Cl. DUVERNOI l. c. MARCOT *Mem. de l'Acad.* 1716. ſub fin. Valde adeo accedo ad BLONDELLI opinionem, non tamen recuſaturus vera & certa experimenta, ubi & ante partum de imaginatione conſliterit, & naevus ejusmodi fuerit, ut non ſit ex claſſe morborum, qui naturaliter & absque vitio imaginationis fetui accidunt. Nam haecenus plurima reperio ex aliorum relatione, ut HILDANIANAS historias p. 900. & aethiopem illum SWAMMERDAMIANUM *prodr.* p. 30 reliquarum hiftoriarum pleraſque: Aliquas autem manifeſte falſas eſſe patet, ut hiftoriam illam *Malebranchianam* (vide *Marcotum in Acad. reg. ſcient.* l. c.) & conceptum illum humani fetus in collo, ex imaginatione

sanguis ^{dd}. Alium novi hominem, cujus matri mendicus, ut extorqueret stipem, ostenderat manum sex instructam digitis: retulit certe ab hoc casu manum sedigitam^{ee}. Ergo adparet, matrem posse addere, demere, mutare aliquid in fetu. Non id fit, quod scit mater, quod vult mater, neque id quod non vult. An nunc docet haec
expe-

tionem matris subnati E. N. C. Dec. II. ann. 10. obs. 56. & leonem illum Lipsiensem, verum puerum, leporino labio, quem Linckius refutavit: conf. Breslarv. 1723. Maj. E. N. C. vol. 1. obs. 74. alterumque leonem a Misticchellio recensitum Desnoves lettres p. 173. & sapienter explicatum; naturali laborantem exemplalo, sed verissimum puerum; aliudque falso monstrum creditum E. N. C. Dec. II. 5. obs. 7. & simias demum illas, qualem Salmuth. Cent. II. obs. 16. & Bayle recenset diff. 3. & Hartmannus in propria diss. Haec enim monstra verissimi unice paulum compressa facie homines sunt. Fetus male pro monstris habitos vide apud E. N. C. Dec. I. ann. 9. 10. obs. 161. & Cl. civem meum Maserum de obstetr. error. p. 30. qualis forte ille abbas fuit, qui cum partu editus deformissimus videretur, parum abfuit, quin pro monstro deportaretur Locke L. III. c. 24.

dd Valde certe incredibile, & quod fidem praesentis medici requirat.

ee Sed unde mendicus sedigitus? an creat imaginatio ossa, tendines, musculos, cartilagine? Similis historia est pueri decem
in

experimento confirmata matris potentia, matrem fetum fingere, uti figulus de massa argillae vasa sua format ^{cc*}. Res ipsa certa est, neque potest negari, nisi sensibus fides negetur. Non tamen videtur inde sequi, mulierem aliquid ad formandum fetum facere. Vis enim incognita est, quae a voluntate nequit produci, aut prohiberi, etiam si vehementer mater conetur. Delapsa est in cellam femina gravida, infantem peperit, cui ingente vulnere vertex confRACTUS ^{ff} fuerat, eodem modo uti maternum verti-

in manu & in pede digitis instructi, quem naevo visoque supplicio tribuit *Saviard obs.* 117.

^{cc*} Ut lecta *Stahlia*na: vide *Buchnerum miscell.* 1729. p. 516.

^{ff} Dudum *Hippocrates* fetum mutilari posse a plaga intra uterum accepta *œgei yovns* n. 9. Caput fetus ex naevo fractum *Mekern* p. 348. Cranium comminutum *Buchner miscell.* 1728. p. 1026. & destructum ex lapsu cum terrore viso *Mauriceau* p. 116. Ab alapa gravidæ inflicta fractum fetui cranium *Horstius obs.* 2. Ex terrore matris fetus absque cranio & cerebro, solo osse occipitis superstite *L. Bourgeois L. II.* p. 71. Ex terrore vulnus *C. Gemma* p. 77. in inguine fetus *Hild. Cent. V. obs.* 3. inque dorso *Id obs.* 65. *Cent. VI.* & pene similis casus *E. N. C. Dec. III. ann. 2 obs.* 117. sed ex relatione. Ex terrore foramen quasi sclopeto inflictum circa anum *E. N. C. Dec. I. ann. IV. obs.* 21, *Hel-*

verticem casus violaverat. Neque fabellae sunt. Bruxellis res mira accidit, cum procures Belgici, EGMONDAE Comes, & HORNAE, jussu Ducis Albani capite plecterentur. Gravida inter spectatores mulier fuit,

Helmontius de injectis materialibus n. 9. qui addit, ex haemorrhagia fetum interiisse, et alterum exemplum addit. Cutis dorsii lacera E. N. C. Dec. I. ann. 9. 10. obs. 23. Ex terrore brachii fracti cicatrix in fetu reperta Schook p. 62. Vulnus in fetu ex visa crucifixione E. N. C. Dec. II. ann. 6. obs. 150. Ex viso mutilo fetus quatuor digitis mutilatus E. N. C. Dec. II. ann. 6. obs. 30. Manus fetus ex naevo mutila E. N. C. Vol. 5. obs. 48. Manus dextra divisa: & separatus pollex Schook p. 62. Brachium manu truncatum Deusing de fetu mussip. p. 23. Horst l. c. ex aliis, A. Hafn. ann. II. n. 1. E. N. C. vol. VI. obs. 66. Plot Staffordshire p. 270 Superville Phil. tr. n. 456, & Cyprian Phil. trans. n. 221. & integra collectio apud Schurig. syllepsil. p. 609. Fetus ex naevo mutilus A. Hafn. II. n. 82. digitique mutilati E. N. C. Dec. II. ann. 6. obs. 30. Infans apud quasi in caudam terminatus ex naevo E. N. C. Dec. II. ann. 9. obs. 10. Haec majora videntur. Sed nimis frequens est ossa cranii male ordinata, absque ullo vitio matris galeam imperfectam & pene contractam efficere, ut coram video: neque absurde ad hydrocephalum retulit Marcotus. Deinde mutilos canes passim visos lego E. N. C. Dec. II. ann. 3. obs. 164. Aldrov p. 128. Bresl. 1723. M. Aug. & teles Licetus de monstr.

fuit, quae non absque terrore celebrem bellica virtute Egmondanum comitem perire vidit: ea infantem peperit, absque capite &c, collo adhuc cruento, quae mira historia a magistratu publice confirmata ad HELMONTIUM venit, Bruxellensem hominem, & cujus pater inter spectatores sup-

monstr. I. p. 17. et caprum *Val.* et pueros brachiis destitutos *n. n. c. Dec. III. ann. 5. 6. obs. 12. Bresl 1722. M Mart. Columbus p. 264. Duvernoi act. Petr. V. p. 260. Licetus p. 59. Superville Phil. trans. n 456. cont Sennert. Prax. L IV. p. 303. saepe pedibus artificiosos Worm mus. p. 387. Faber apud Hernandez p. 487. Scaliger de subtilit. exerc 334 Bresl. 1725. m. Maj. 1726. m. Oct. Aldrovand de monstr. p. 482. vel alterutro brachio mancos Büchner misc. 1727. p. 72. aut pedibus Hofman de usu part. p. 339. femoribusve Act. Hafn IV. obs. 88. Barthol. hist. 44. Cent. II. Columbus l. c. Bresl. 1720. M. Febr. absque vitio etiam supposito, imaginationis Ita flores, aliqua parte mutilata, petalis carentes, aut fructus feminibus cassos vulgatissimum est videre. Plura forte benigna miraculorum mater imaginatio addidit.*

gg HELMONTIUS l. c. & addit, caput non inventum esse, collum vero cruentum prodiisse; & vide not. ff. Sed nota est HELMONTII fides, & haec utique historia eam, quam haberet, deleret. Amputati etiam capitis historia exstat apud *Horstium*, post *Donatum* p. 748. & in *Act. Hafn. vol. II. n. 1. & aliud apud*
L l 2 Bob.

supplicii adfuerat. Parisiis gravida fuit, quae vidit homini malefico ossa rota ^{hh} frangi, & peperit eadem fetum, cui ossa simillimo modo fracta fuerant. Ergo subest hic aliquid, quod cum naturae legibus nobis notis minime convenit, neque tamen negari potest, nisi ab eo, qui has leges omnes perfecte cognoverit.

10. *Fecundatio*) Staminis masculini ingressus in ovum femininum ⁱⁱ.

11. *Tres membranae*) Philosophi fuerunt, qui docerent, spumantem bullam libidinofam

Bobnium p. 659. & F. M. ab *Helmont* & *Digbyum* apud *Craanen* p. 751.

^{hh} *Historiam Hartsoekerus* habet *suite des conj.* p. 140. & *Muys praef. ad l. de fibra musc.* & *ZOD. GALL. I.* p. 62. Ita fetum decussatis brachiis sancti similem *Hartsoekerus* l. c. adducit, & angelo volanti similem *Bresl. 1723. M. Nov.* & *Plutoni, Proserpinam amplexo Blancaard.* Ex viso praestigiatore crura contorta *ACT. HAFN. 1675. obs. 59.* confracta, & pes distortus *HILDANUS Cent. III. obs. 56.* Brachii ossa mobilia *MEKERN* p. 347. & *E.N.C. Dec. I. ann. 8. obs. 55.* (id autem, credo, vitium ad rota fractos relatum est). Distortae pedis articulationes *HILDANUS Cent. III. obs. 56.* & crura *E.N.C. Dec. I. ann. 2. obs. 61.* Spina dorsi quasi luxata *HILD. l. c.* Verum haec omnia ad alicujus musculi praevalens robur pertinent, & laxiora ligamenta, & nimis frequentia sunt, absque ulla de naevo conjectura.

ⁱⁱ *DCLXXIII. not. 7.*

nosam ^{kk} utriusque aquulae feminalis ejectam, densatam, cuticulam contrahere, nempe tres membranas, & faecem deponere, quae fiat in placentam. Verum DRELINCOURTIUS docuit ^{ll}, ovum jam in ovario amnion & chorion, & corpus luteum habere, sive placentae rudimentum, atque adeo haec omnia a matre esse.

12. *Placenta*) Cupula ovi in ovario nata ^{mm}, pars elementaris ovarii, in ovario aequae, ac membranae jam structa.

Funis) Quid sit, EGO quidem ignoro. Intra ovum nullum rudimentum funiculi reperitur: nihil etiam in LEFVWENHOECKIANO animalculo; & nihil hic docent fidelissimae icones MALPIGHII. Ovum quidem novimus ad matrem pertinere, embryonem a patre esse pene scimus. Verum id obscurum superest, num funiculus ⁿⁿ embryoni adnexus de ejusdem abdomine prodierit? quod de arteriis umbilicalibus & uracho dici potest, de vena dici non

^{kk} HIPPOCRATES mechanicam generationem pellicularum fetus fere hoc modo proposuit περιπαλιδίου φυσίος n. 2. *Cartesius* membranas ex parte seminis uterum contingente docuit generari, & allantoidem ex lotio *Borrichius A. Hafn. Vol. V. obs. 45.*

^{ll} DCLXIX. not. *q*.

^{mm} DCLXIX. not. *m*

ⁿⁿ DCLXXVII. not. *a*.

non potest, qui enim possit vena extrinsecus advenisse & se interuisse in corpus? Si dixeris, funiculum a placenta esse; respondendum est, unde ergo arteriae advenerint. Undique insuperabiles difficultates rem obfident.

Verum omnino novi, leges latas esse rebus creatis, ut nunquam semina inmittant radices, nisi in propriam & faventem sibi terram. Lichenes, & aliae plantae radicantur in muros: aliae plantae radículas in aquam demittunt, nunquam ullas dimissuræ, nisi aquam nactæ fuerint. Aliae in durissimos lapides descendunt radiculis. Aliae non nisi in alias arbores. Quis explicaverit, quare Viscum non inveniatur in rerum natura, nisi in aliena arbore, neque unquam maturum visci semen radículas emittat, nisi in fissuram madidi corticis: si vero id fecerit, in veram, solidam, excrescat arborem, suis floribus, fructibus & foliis onustam. Hæc naturæ leges sunt, quas non concipimus, sed videmus. In thesauro RUYSCHII, quem Russiæ Imperatrix coemtum possidet, integra anthropogenia habetur, sive historia naturalis hominis, a primo conceptus momento, ad noni mensis finem. Vidi hæc omnia, & per multos dies continuos oculis perlustravi, reperi funiculum umbilicalem tanto majorem esse, quanto propior origini suæ fetus est, & vicissim. Et in fetu formica minima nihilo majori, vidi, homuncionem sedere in acuto apice coni, quem funiculus

culus umbilicalis efficit. Ergo videtur flamen masculinum per placentam se infinuare, hinc in funiculum umbilicalem venire, ibi adnecti, tunc funiculum una cum fetu ad ovum adhaerere. I. G. (puto melius), ex fetu prodire partem funis, & a placenta aliam partem, nempe venam, ad fetum pergere, tunc connasci utramque portionem funis. Oportet autem hic dicere, quae HELMONTIUS „Seminavi semen pini, in testa, radícula exiit, & pertudit testam, ut descenderet, deinde sursum fregit, ut in caulem enasceretur. Haec non possumus explicare, experiri possumus.

13. Os) Fetus alitur per os (& totam suam cutim ^{pp}, adeo teneram in fetu, ut nemo negare possit, & exhalare per arterias cutis liquorem, & resorberi per venas. 1732. Ita etiam plantae per totam superficiem suam aluntur, nam planta, quae interdum languit, mane turgescit resorbitis per noctem liquoribus.) Capit adeo cibum potumque, atque in ventriculo subigit, ope salivae, succi ventriculi, intestinorum, pancreatis. Chylus inde paratus per vasa lactea infunditur in massam sanguinis venosam: Id vidi in Leidensi puero, cui abdomen fissum erat ex matris imaginatione, & per vulnus intestina conspici poterant, atque vasa lactea, chylo non minus, quam in adulto, plena. Hac via vere nutritur. Per placentam autem

^{pp} DCLXXXII. nisi impediverint sordes mucosae, quae cutem obliniunt.

autem remittit ^{qq} ad matrem sanguinem, qui in corpore infantili nullam pulmonis actionem patitur, in venas matris, quae vicissim fœtui reddit sanguinem in pulmone suo elaboratum. Haec sententia facile cum Hippocratis ^{rr} doctrina conciliatur, qui et ipse dixit fœtum duplici modo ali.

Vario) Si animalcula LEEUWENHOECKII nasciturorum hominum embryones sunt, tunc utique nutriuntur primo in patris teste, epididymide, ductu deferente, vesiculis seminalibus & urethra, proprio succo seminis masculi. Deinde in materno utero primis temporibus aluntur ^{prostatarum} ^{ss} succo, qui videtur tamdiu fœtum alere, quamdiu propria quadra victitat, & necdum epulatur de p^{ra}estita mensa, quam mater suppeditat. Quando porro ovum quidem fecundatum est, sed in ovario haecenus haeret, tunc unice nutritur succo priori, & proprio ovi. Quando vero, solum de petiolo, retinetur in utero, & nondum undique uteri superficiei applicatum est, tamdiu fœtus nutritur liquido per membranas chorion & amnion epoto ^{tt}, qui in utero generatur & fœtui infunditur.

Viscera) Admiranda vis haec omnia dirigit. Quando EPICURVS apud LUCRETIVM docet, omnia ex eadem materia

270

qq DCLXXIX. not. dd.

rr DCLXXVIII. not. b.

ss DCLIII. p. 380.

tt DCLXXV. not. m.

ατομῶν nata esse, ex una communi propri-
 etate materiae s. gravitate, quae fecit, ut
 volantes in indefinito inani spatio atomi se
 comprehendant, tunc velim explicent illi cauti
 philosophi, quomodo fiat, ut idem ani-
 mal successive varias induat formas, per-
 fecte ad id alimentum aptatas, quo debet
 vivere. Toties vidi in semine animalium
 varii generis anguillas plicatiles, veros
 serpentulos. In ranarum genere certum
 est, nihil matri a patre dari posse, praeter
 anguillulam, quae tubercula paulatim exi-
 git, unde artus emergent, ut in IACO-
 BAEI de ranis observationibus adparet.
 Perge tunc reliqua contemplari animalia,
 reperies nullum omnino esse, quod in pri-
 mordis vermibus non fuerit. Quis crederet
 papilionem, quatuor alis, sex pedibus,
 oculis innumerabilibus praeditum animal,
 vermem aliquando fuisse? Omne pulicum
 & muscarum genus aliquando vermis fuit:
 SWAMMERDAMIUS in confessu virorum
 eruditorum, qui in THEVENOTI aedibus
 conveniebant, incomparabili arte bomby-
 cem ex chrysalide exemit, & nascituros
 olim artus alasque caesarea arte expedit.
 Sed & homo aliquando vermis fuerit, uti
 Prophetae loquuntur, quando superbiam
 humanam contundere volunt, Vermis
 sum, non homo. Sed ex verme, depo-
 sitis exuviis, novum animal fit, & ex
 chrysalide prodit vegetus, & volitans papi-
 lio. Nisi hae mutationes sensuum testi-
 monio demonstrarentur, homines certe in-
 sanum vocarent, qui huiusmodi paradoxa
 doceret. Vidi, & bona fide narro, cur

enim fallerem discipulos? hominem, cui neque brachia erant, neque pedes ^{uu}, & tamen a mare generatus, a femina conceptus, per abortum vero ejectus fuerat, formica majuscula nihilo major. In alio abortu, qui paulo diutius vixerat, vidi caput, cum exigua cauda, & coccyge
ter-

^{uu} In fetibus grano hordei non majoribus nulli adhuc artus adparent RUYSCH. *Adv. Dec.* ll. n. 10. qui idem in fetibus api, & pene nuci avellanae aequalibus, nulla adhuc rudimenta artuum describit aut pingit *Thef.* VI. T. 2. 5. Trigesimo die fetus formari incipit informis haecenus RIOL. p. 381. Ante quadragesimum diem fetus formicae mole est, sed femora nondum discreta habet ARISTOTELES *hist. anim.* L. VIII. c. 3. oculos vero praegrandes. In cuniculo die undecimo nulli adhuc artus *Cosmop.* p. 50. Die vigesimo artus nondum conspicui *Varol.* p. 102. *Besler* p. 8. in fetu hordei grano non majori, neque quinta septimana, in fetu apis mole, in quo caput apparebat la MOTTE ll. c. 24. In abortu unius mensis nihil adhuc distinctum GALEN. *de form. fet.* Pueri ante trigesimum, puellae ante quadragesimum diem nihil distincti habent HIPPOCRATES *περί ανθρωπου συ- στος* n. 12. Etiam plus quam tertio mense, cum fetus articulo digiti minimi aequalis esset, nulla adhuc crura L. BOURGEOIS L. I. p. 27. Sed sequentes observationes demonstrant, artuum proventum saepe praecociorem esse, aliquando tamen tardius apparere.

terminatum hominem , cui tubercula **
in ea sede prodibant , unde manus & pedes
essent nascituri. MALPIGHIUS demonstra-
vit,

xx In embryone ape non majore aliqua *Ruyfch Thes.* VI. n. 46. T. 2. f. 4. Die tertio cum dimidio nonnihil simile brachiorum pingit *Mauriceau* ad p. 85. Duodecimo die aliqua tubercula artuum *Bianchi* p. 57. 425. f. 7. & decimo quinto *Kerkring* c. 3. In fetu formica non majori rudimenta artuum *Berger* p. 468. 469. *Stahl*. p. 505. & in informibus embryonibus *Backii* p. 42. Informes artus & minimi in fetu aequali femini cucurbitae *Ruyfch. Thes.* IV. n. 40. & in altero apis mole *Malp. possib.* p. 86. & *Comm. Nor.* 1739. T. 3. f. 4. In ovo juglande non majori E. N. C. *Dec.* II. ann. I. obs. 119. Die decimo sexto *Bianchi* T. I. f. 8. Die 21. verrucae pro artubus *Dodart.* l. c. Quarta septimana rudimenta artuum *Phil. Trans.* n. 236. In menstruo fetu manus jam perfecta *Riolan.* p. 411. In ea aetate artus incipiunt adparere *Stahl.* p. 505. In fetu phaseoli aequali brachiorum initia *Hist. de l'Acad.* 1714. obs. 3. Sed, ut adpareat certam legem nullam esse, etiam in embryone digiti articulo aequali artus obscuri *Ruyfch Thes.* IV. n. 54. In fetu nucis mole artuum rudimenta *Trew* 1735. hebdom. 39. T. 4. f. 12. In fetu pollice paulum breviori evidentia *Ruyfch. Thes.* VI. T. 3. f. 2. Sub finem primi mensis , cum fetus digito transverso aequalis esset, rudimenta artuum *Vater mol. praegn.* n. 6. Trigesimo secundo die fetus fere perfecte formatus
Bian-

vit, omnem pullum gallinaceum, in ipsis primordiis, totum cerebro, cerebello & spinali medulla, atque oculis constare *yy*.
Cernite figuras MALPIGHIANAS, videbitis
 pri-

Bianchi T. I. f. 11. Die trigesimo quinto fetus ungue non major artus jam formatos habet *Mauriceau obs.* 246. Die quadragésimo artus demum pullulantes *Riolan.* p. 412. *Varol* p. 103. *Besler* p. 8. & secundo mense demum rudimenta artuum in homine *Everard* p. 91. Sexta septimana fetus uncialis, & artus jam adparent *Vater de mol. praegn.* n. 6. & formati sunt E. N. C. *Vol. III. obs.* 145. Brachia autem semper prima formantur & majora cruribus sunt *Besler* l. c. *Ruyseh Thes.* VI. n. 48. etiam in ranis *Id. ib.* In gyrino brachia & pedes prae deunt, quando caudam sub solstitium amittit *Harvei* p. 118. Conf. *Ruyseh Thes.* VI. n. 48 In pullo vero post 24 horas absolutas alas vidit *Malpigh. de form. fet.* f. 8. & in fetu uncia paulo longiori perfectos artus *RUYSCH Thes.* X. T. 3. f. 3.

yy Caput adparet in pullo hora duodecima *Lancis* p. 40. in *Malpighianis* autem etiam sexta de incub. p. 2. In primordiis pulli caput apparet, in eo caput corpore major *Harvei* p. 56. In fetu ovillo die septimo corpus informe, sed cerebrum & oculi adparebant *Leeuwenhoeck anat & cont* II. p. 165. In embryone hordei grano non crassiore caput & oculorum rudimenta *Ruyseh Thes.* VI. n. 46. T. 2. f. 4. In altero semine cucurbitae minori caput aequale corpori *Ruyseh Thes.* IV. n. 40. In fetu milii
 grani

primordia pulli carinam ^{zz} esse, five vermem, tunc caput natci, & vesiculas, five tuber-

grani mole magnum, oculis necdum distinctis *Santorin Ister. n. 5.* Etiam in trimestri fetu caput majus thorace & ventre *Faber ap. Hernandez p. 651.* In alio septem lineas longo, caput uni tertiae parti corporis aequale *Dodart.* Pulli Gallinacei oculi cerebro & reliquo capiti aequales, majores corpore &c. *Harvei p. 56.* Caput & oculi pullo maxima *Arist. hist. anim. L. VI. c. 4. de gener. II c. 6.* In fetu apis mole oculi conspicui *Mauriceau obs. 108.* & in pullo hora quinquagesima *Maitrejean p. 14. 77.* minus tamen, quam oviparis, magni sunt *Harvei p. 232.* Tres vero illae bullae supra ex *Platero* citatae p. 238. non ignoratae *Carpo, Pareo, Archangelo, Riolo* p. 384. *Malpighio* etiam dictae p. 86. & *L. Bourgeois* p. 26. & *Drelin-courtio adv. dogm. 5.* & in dama *Harveio* visae p. 56. p. 232. fusius a *Malpighio* declarantur in utroque opere. Tres ab initio sunt, etiam in homine *Malpigh. posth. p. 86.* cerebri nempe duo lobi & cerebellum *Drelin-court.* vel oculi potius, eo tempore maximi, & cerebrum *Malpigh. de form. fet. p. 4.* Die vero quinto in pullo quatuor vidit bullas *Harvei p. 57.* quinque autem *Malpighius,* duas cerebri, duas oculorum, cerebelli unam *de format. fet.*

^{zz} Conf. DCLI. Adparet hora sexta *Lancis* p. 41. & in catella die tertio *Brendel de embr. praeexis.* p. 38. denique etiam ante incubationem, si fides *Malpighio de incub.*

tubercula adstructa carinae. Ex eo deinde fetu nascitur cavum rostrum, & cor ^{aaa}, & reliqua ex ordine viscera; & primum omnes tres ventres aperti sunt, ipsumque cor ad spinam dorsi firmatum nudum absque costis haeret. Id ipsum cor in his primis initiis est canalis in arcum flexus, qui in quatuor sinus intumescit, nempe aures, & ventriculos, qui in longa serie ordinantur distincti. Haec deinde fistula quotidie magis intorquetur, donec duae cavitates cordis, & duae aures, in unum cor conserveant. Tunc costae accedunt ^{bbb}, & thorax clauditur & pulmo ^{ccc}, atque jecur ^{ddd} adparere incipiunt, quae haecenus nulla apparuerant. Apparet adeo, haec viscera in primordiali fetu quidem non adesse,

ma-
incub. p. 9. Recte olim *Columbus* spinam primam generari, id se in embryone vidisse p. 247. Adhuc 21. die embryo similis vermis *Dodart. hist. de l'Acad.* 1701. p. 26. 27.

^{aaa} Hora vigesima octava in pullo *Lancis.* p. 40. ante 30. *Malpighius de incub.* p. 4. Die vigesimo primo in fetu humano cor apparuit *Dodart. l. c.*

^{bbb} Tertia septimana crater costarum adparet *Kerkring. anthrop. c. 4.*

^{ccc} Die sexto apparent in pullo *Harvei* p. 61. & quarto absoluto *Maitrejean* p. 115. 121. Die quadragesimo in homine *Varol.*

^{ddd} In cuniculo die decimo quarto *Graaf* p. 312. In fetu humano quadraginta dierum *Varol. l. c.* In pullo demum die sexto *Malpigh.* p. 9. *Maitrejean* p. 141. magno, post cor, intervallo *Harvei* p. 63. Etiam genitalia ante hepar distincta sunt *Harvei*

materiam tamen adesse, ex qua generentur ^{eee}. Hoc ipsum cor unicum quali ventriculum habet, quamdiu pullus non respirat, nam communicationes cavæ venæ cum pulmonali, & arteriæ pulmonalis cum aorta faciunt, ut cor quasi univentre sit, uti est in amphibiiis, & etiam bombyci unicum cor est, sed in particulas divisum, quod contra MALPIGHIVM SWAMMERDAMIVS demonstravit ^{fff}. Et tamen inutilis & superfluous in pullo pulmo increscit, & vasis suis omnibus ornatur ^{zzz}. Hactenus enim homo,

p. 143. quæ in homine die vigesimo apparent *Pinaeus* p. 137. Male adeo jecur ante cor generari, & in ovo incubato se expertum esse *Sanctorius* in *fen. I. Avic.* p. 756, Seduxerat optimum virum *Galen*i auctoritas, qui hepar ante cor, die trigesimo secundo, hoc ante cerebrum generari dixerat *de form. fetu*, & *Aristotelem* *de gener.* ll. c. 6. atque *Chrysippum*, qui cor primo loco generari dixerant, refutat *de form. fet.* *

eee Conf. not. c. Non bene adeo *Hippocrates*, partes omnes simul formari *æpt. Stat. Tns* &.

fff CCLXI. not. c*.

ggg Hoc imprimis argumentum ad demonstrandum praevisos fines elegans est. Alae & proboscis in eruca reperiuntur, interviturae papilioni, erucæ inutiles. In homine pulmo, cerebrum, fetui inutilia, necessaria adulto; contra foramen ovale, ductus arteriosus, venosus, utilia fetui pereunt cum ætate. Sic branchiæ ranarum decidunt, quando desinunt pisces esse &c.

homo, qui vermiculus fuerat, amphibion animal est, quod in mediis aquis, absque pulmonis usu vivere potest. Donec ultimo in animal respirans abeat, cui duo corda sunt, & nulla vita est, si ab aere per septem vel octo horae minuta arceatur. In utero vero nondum respirat, apparet ex VESALII ^{hhh} experimentis,, Sumatur ex mortua praegnanate vacca totum ovum, reponatur in mensa, adparet vitulum intus miris modis moveri, & niti, ut prodeat (uti etiam pulli pipiunt, ovumque rodunt, ut exeant). Quam primum chorion & amnion discidisti, continuo fetus respirat, & tunc quietem agit. Qui in utero vagiunt infantes, plerumque moriuntur: nisi enim continuo in aerem excludantur, facile fieri poterit, ut aliqua pars membranarum ori adplicetur, fetumque suffocet.

15. *Et cur non*) A mundo condito nunquam, nam evolvi observationes, in clauso utero, intra caveam amnii faeces ⁱⁱⁱ repperitae sunt, cum tamen in recto intestino abunde sit reconi. Ratio est, quod absque aeris ope, sphincter ani nequit superari.

Mortem) Quando fetus in lucem editur, purissima prodit aqua, in partu nempe naturali, neque infans, in validis, quos edit, nixibus, alvum deponit, nisi aer appulsus uterum subeat, infantem feriat, & respiret idem, tunc enim continuo, in tantis angustiis, alvum deponit. Ex hoc effluente stercore indicatur ^{kkk} i. ruptas esse membra-

^{hhh} Confer DCLXXXII.

ⁱⁱⁱ Contraria experimenta protuli DCLXXXIII.

^{kkk} Ib.

branas, aquas effluxisse, infantem jam respirasse. 2. Eum in apertura uteri haerere, ita, ut per eam aperturam faeces exire possint. Tunc fetus in summo periculo versatur, & inter viginti fetus, quibus alvus ante partum solvitur, vix unus vitalis est. Si enim aer, qui semel in thoracem irrupit, suppressus fuerit vel per exiguum tempus, neque infans inspirare potuerit, continuo ipsi pereundum est. Non ideo certum est perisse ¹¹¹ fetus, saepe enim, cum huic unī signo

- 111 Ex prioribus, sed ruptas membranas esse, & fetu undique compresso in his viarum angustis, elisas fuisse faeces *Dionis des accouch.* p. 234. *la MOTTE obs.* 223. Duodecim horis ante partum editum meconium *MAURICEAU* p. 324. Caeterum signa mortui fetus omnino difficilia sunt. Plerique pulsus in fonte lincipitis, & in funiculo deficientem adducunt *DIONIS des accouch.* p. 298. 320. *Ruy/chapud Erndl.* p. 90 &c. Verum hoc signum debilitatem summam perinde ac mortem demonstrat, monente *J. van Horne*, & saepe fallit *la MOTTE* L. II. c. 5. *Idem obs.* 228. funiculo non pulsanti frigus ejusdem funiculi addit pro certissimo signo. Sed *J. von Horne* (*schwedische Wehmutter* p. 25) epidermidis secessum; alii, quos refutat *SAVIARD obs.* 97. putridum liquorem ex ore fetus exeuntem pro certo leti indicio habent. Verum hic humor putredinem subponit, quod idem de secedente cuticula & fetore verum est. *D. Sala* tangebatur fetum frigida, & mortuum aje-
- bat

figno fiderent chirurgi, milerum fetum spirantem & viventem hamis & uncis dilaniatum extraxerunt ^{mmm}, quale exemplum habet MAURICEAU ⁿⁿⁿ, in l. *observations sur la grosseſſe*, quem longe praefero alteri operi la *pratique de accouchemens*. (1732. Optabile certe foret, ut vel bonas obstetrices haberemus, vel omnino nullas. Quando famam aliquam habent, semper festinant, & rumpunt aquas, ut cito fetum extrahant; cum contrarium bonae obstetricis officium sit, aquas, quantum fieri potest, diutissime servare clausas ^{ooo}; Si invitae contigerit, ut meconium effluat, manu fetui liberum aërem procuret, ne suffocetur: diducto digitis uteri ostio.

16. *Superfoetatio*) Non credo hanc fieri posse,

bat, quando se non retraheret BARTHOL. *hiſt.* 78. Cent. V. P. BARBETTE fontem minime tensum. Verum haec signa etiam pejora sunt.

^{mmm} Nimis frequentes sunt dirissimae historiae. Vivo fetui resectum brachium habet la MOTTE *obs.* 265. & totum laniatum *obs.* 185, 187. infensus unco MAURICAEI ob has funestas operationes, & SAVIARD *obs.* 84. Unicum casum admittit la MOTTE, in quo caput aperiri debeat, fetusque violari, capitis nempe crassi, & intransitu per os uteri inpaſti & haerentis vitium L. III. c. 20. 21. In eo casu ipse coactus unco usus est *obs.* 456. forfice vero *obs.* 221. aliisque violentis remediis.

ⁿⁿⁿ *Obs.* DCLXXXIV. vivi fetus uncolaniati, & occisi, cum pro mortuo haberetur. ^{ooo} DCLXXXV. not. y.

posse, nisi eo tempore, quo ovum in uterum receptum, adeo parvum est, ut nondum undique accreverit PPP uteri cavæ super.

PPP Superfetationem in homine admittit HIPPOCRATES, quando os uteri non clauditur *περί επιχυνσ.* n. 2. pro raro vero casu ARISTOTELES *hisl. anim.* L. VII. c. 4. *de gener.* L. IV. c. 5. & in lepore *de gener. anim.* l. c. *de hist.* l. c. Deinde PLINIUS exempla habet L. VII. c. 2. & magna series est historiarum, quæ adducuntur. Veram ergo superfetationem primo necesse est distinguere. Eam dicimus, quando, post secundam venerem, aliquot elapsis diebus, altera secunda venus lucet, & post ovum in uterum jam receptum, alterum ovum in uterum serius devolvitur. Hujusmodi superfetatio omnino fieri potest, (etsi raram esse CL. GOELIKIO non negaverim), non solum a die sexto ad trigésimum, MANNINGHAM p. 41. MAURICEAU p. 107. GOELICKE &c. quod prius secundum semen primo se admisceat, serius uterus plenus sit & clausus. Nam etiam satis maturo fetu, eoque mortuo, & in utero haerente, concipi potest. Experimenta non in vaccis solum facta sunt, quæ, præter marcidos, quos gerebant utero fetus, vivos alios conceperunt RUYSCH *Adv.* ll. n. 10. *de musc.* ut. p. 14. Sed in homine similia exempla lego. Ita PROSOCER meus TEICHMEYERUS, fetu loco partus retento, post faetida elapsa lochia, vidit feminam, post aliquod tempus concepisse, peperisse fetum vivum, post quem demum prior ille

superficie. Quae alio tempore contingunt superfoetationes, nomen non merentur, neque enim sunt, duae inpraegnationes, quarum secunda aliquo tempore post primam facta est. Quando enim ovum totum uterum replet, tunc non video, quomodo semen ingredi possit uterum, nisi HARVEIVM sequaris,

& marcidus incisione facta excessit, in *epistola propria*. Ita HARVEIUS in femina, post graviditatem veram aliquot mensibus elapsis ossa prioris fetus edi vidit *de partu* p. 264. & *Albucasis*, & *Marcellus Donatus* L. IV. c. 22. & *Schenk ex Gabelchewero*, & *Bonnetus sepulchr.* III. S. 37. *app.* p. 99. & *Matth. Cornax*, & *Bartholinus hist.* 14. L. IV. & *de insol. part. viis* c. 18. *Leeuwenhoeckius* penitus similem observationem adducit *exper. & cont.* p. 406. Manifestum est adeo, tetum, etiam magnum, qui osseus sit, in utero haerentem, novam conceptionem non impedire. Sic etiam *Rouffetus* vidit pessarium in uterum insertum conceptum non impedivisse *Seet.* VI. c. 8. (nisi forte non satis certum est, pessum in utero fuisse). Non ideo repugno *Cl.* & humanissimo *D. Grauel* superfetationem facilius fieri, si uterus forte duplex fuerit. Verum superfetatio vera, mihi per exempla paulum difficilis videtur cognitu. Ea quidem egregia nota est, si fetus alter parenti, alter adultero similis fuerit, quale exemplum *Hercules* praestitit & *Iphiclus*, & aliud *Aristoteles* habet *hist. anim.* L. VII. c. 4. & *Plinius* L. VII. c. 2. & *Gordonus*: sed hoc rarum est. Superest, ut ex tempore aestimetur superfeta-

sequaris, statuentem feminis vim fecundantem non per cavum uteri tubum, sed per massam sanguineam in ovarium venire; ea vero hypothefi admissa, non video, quare non perpetuo contingant superfoetationes, nisi

fetatio, quando nempe,, post vivum, perfectum puerum, aliquot septimanis, & mensibus elapsis, alter vivus & sanus puer partu editur. Tribus septimanis a priori partus *Roussel* S. VI. & aliquot septimanis *Salmuth Centur.* III. obs. 33. Quatuor septimanis *Francus* p. 227. Viginti novem diebus a priori, vivus uterque *Venette* p. 71. Post debilem octimestrem sanus fetus novimestris editus *Zacchias* L.X. c. 66. Quadraginta diebus a sana puella filius sanus C. B. app. ROUSSET p. 222. Ex PAULO I. C. video citari quintum fetum quadragesimo die post quadrimellos editum, ostensum HADRIANO AUGUSTO. Sex septimanis post priorem filius BLANCAARDO observante apud FRANCUM *satur.* p. 227. Sex septimanis ab altero fetus, vivus uterque C. B. post ROUSSET p. 222. *Aristoteles* partum alium septimo, alium nono mense vidit successisse *hist. anim.* L. VII. c. 4. Tribus mensibus secundus a priori partus *Nicolus, Waldschmid progr. de valet. med.* Partus octodecim septimanis post priorem partum *Comm. Nor.* 1732. n. 27. Septembre & Decembre *Harveius* p. 261. Quarto & octavo mense *Kerkring obs.* 2. Ex *Pereda* citari lego, alium fetum quarto, alium nono mense editum fuisse. Septembre & Aprile eandem feminam

nisi forte, liberali certe adsumptione, uterum post fetum conceptum nullis venis bibulis praeditum esse ajas, aut nullum semen genitale resorbere. Si vero tertio mense post editum fetum, alius partus sequatur, ut aliquando contigit, & ipse vidi, is macter erit, miser, & semimarcidus qqq. Nempe

minam peperisse *T. Bartholinus Cent. IV. ep. 56. Valisnerius* recenset tres partus, qui inciderint in 13. mensis diem Junii, 24. ejusdem, 10 vero Julii c. 17. n. 14. sed iste propinquos nimis terminos habet. Conf. alia exempla *Bresl. 1721. M. Aug. & collectionem apud Francum, Schurigium S. III. c. 2. & Waldschmidium in app. ad E. N. C. Vol. II. tum apud Cl. Grauel.* Hi omnino partus, quoties uterque sanus & perfectus est, demonstrant superfetationem. Qui vero paucis diebus distant, quales citat *Francus l. c. & E. N. C. Cent. X. obs. 16.* aut horis, ut *Saviardi trigemini obs. 82.* ii possunt ad simplices gemellos, peculiaribus placentis praeditos referri, neque necesse est diverso tempore conceptos fuisse.

qqq Nempe hae historiae vulgo, sed praeter meritum, ad superfetationes trahuntur, in quibus cum maturo fetu alter immaturus & minor editur. Fetus alter maturus, abortivus alter *E. N. C. Vol. 4. obs. 98.* Gemelli non aequè perfecti *Trew. Comm. Lit. 1738. hebdom. 13.* Alter gemellorum perexiguus *Zod. Gall. ann. I. M. Jan.* Cum maturo fetu alter minimus *E. N. C. Dec. II. ann. V. obs. 243.* & manui aequalis marcidus, durusque *Journal des*

Nempe gemelli fuerunt, sed alter vixit eximie, & excluditur maturus, alter in utero squaluit, uti placentae exsiccantur, quae per aliquot menses in utero retinentur.

17. *Uni*

des *Savans* 1679. Cum fetu maturo alter induratus digitalis *Stalpart Cent. I. n. 74. Schurig embryolog. p. 260. sylleps p. 298.* & paulo ante maturum fetum digitalis puellus c. B. l. c. p. 226. Post embryonem postridie perfectus fetus editus *Hist. de l'Acad. 1729. obs. 3.* Fetus duorum alter minor & tenerior E. N. C. *Vol. IV. obs. 108.* Cum perfecto fetu alter quadrimestri vel quinquimestri non major *Dodonaeus, Mauriceau p. 108. obs. post. 123.* Gemellorum alter faba non major ZOD. GALL. II. p. 133. Porro sex horis a sano puero abortivus cum hydatidibus RUYSCH in *obs.* Biduo post sanam filiam fetus mortuus integro ovo LENTIL *miscell.* Nono die a partu fetus parvi digiti longitudine editus E. N. C. *vol. 2. obs. 124.* & WELSCH, septimo vero E. N. C. *Dec. II. ann. 7. obs. 166.* Tres pueri eadem septimana editi BIERLING. BARTHOLIN *hist. 62. Cent. III.* Post partum legitimum alter minimus emaciatus BRESL 1723. p. 553. Fetus fescunce non longior post maturum fetum natus *Ruyfch Thes. VI. n. 120.* & denuo post maturum fetum sex elapsis horis embryonuci aequalis *obs. 14.* Huc etiam pertinent fetus inaequali perfectione reperti in leporibus HARDER *apiar. obs. 9.* & pro frequenti observatione relati apud LEIGH *Lancashire L. II. p. 5.* (quae causa veteris famae est, a PAULINO renovatae, lepores plurimum superfetare) & in cuniculo COSMOP. p.

17. *Uni placentae*) Hoc perpetuo in historia naturali germinum hoc modo reperitur, & confirmatur per RUYSCHIANAM fetuum collectionem. Quando nempe gemelli concipiuntur, tunc primo graviditatis mense semper duas orbiculares ^{rrr} placentas habent: eae vero sensim semiorbiculares fiunt, donec fere in unam coeant, non tamen unquam unicam, sed duas coaptatas, & si tres ^{rrr*} fetus fuerint, tres erunt ^{sss} placentae.

58. & in porca E. N. C. *De*, II. ann VII. obs 31. Canis septem catellos perfectos & totidem imperfectos edidit *Lauthier* in collectione *Mussipontana* p. 43. Verum in his casibus omnino nihil demonstratur, nisi duos fetus non aequè feliciter a nutrimento simili adolevisse, uti minime rarum est cum vivo fetu alterum gemellum mortuum utero geri not. ^{sss} Vide fatentem *Mauricaeum* p 108. & consentientem *Bergerum* ad observationem *Ruychianum*.

^{rrr} Ex amici procul dubio relatione. In *Ruychianis* enim non reperio

^{rrr*} Homo naturaliter animal uniparum est. Gemelli tamen non rari sunt. Tergeminos etiam in patria, & adfinitate mea novi editos. Habent etiam T. *Bartholinus hist.* 83. *Cent* IV. de insol. partus viis c. 18. *Rhodium Cent.* III. obs. 56. *Mauriceau obs.* 146. *Lanzonus obs.* 18. *Dionis des accouch.* p. 135. *Brendel in obs. Bresl.* 1721. M. Febr. 1723. p. 554. 652. *Comm. Nor.* 1731. h. 6. *Schurig embryol.* p. 602. Quadrigemini rari sunt. Exempla

placentae, quae cum tempore eodem modo
in

pla tamen reperio apud *Solinum*, *Borellum*
Cent. II. *obs.* 44. *Rhodium* I. c. *Mauri-*
ceau p. 103. qui addit vitales fuisse, E. N. C.
Dec. II. *ann.* 4. *obs.* 69. *ann.* 2. *obs.* 9.
ann. 3. *obs.* 201. *Dec.* III. *ann.* 5. 6 *obs.*
198. 157. I. M. *Hofmann* E. N. C. *Cent.* X.
app. *obs.* 30. *Scheuchzer* *Berol. Miscell.*
Cont. II. *Bresl.* 1722. M. *Sept.* 1723.
M. *Jun.* & p. 197. A. *Suecic.* 1725. p.
82. Collectionem habet *Marc. Donatus* p.
448. & *Schurig syllepf.* p. 203. & in *Ae-*
gypto trigeminos & quadrigeminos fre-
quentes esse *Aristoteles* auctor est *hist.*
anim. L. VII. c. 4. *Quinquegemini* ab *Ari-*
stotele pro re in *Aegypto* non rara exhibiti
sunt I c. Habet etiam *Herophilus* apud
Paulum L. 3. c. 76. & *A. Gellius* L. X.
& *Serapio* ex relatione. *Albucasis* exemplum
recenset L. V. c. 36. tum pro certa re
sibi que observata *Carpus* in *Mundinum*
p. CCXXI. Exemplum etiam *Bartho-*
linus refert de *insol. partus* c. 18.
Lanzonus pro re sibi bene nota
proposuit *obs.* 132. E. N. C. *Dec.*
ann. 9. *obs.* 50. & denuo *obs.* 8 *Nigris*
solus & *Welsch* similia repetunt p. 35. tum exem-
plum profert *Schwalbe* E. N. C. *Dec.* III. *ann.* 2.
obs. 175. sed ex alio & exstat aliud in
Comm. Nor. 1731. *spec.* 6. pariter ex re-
latione, ut & ibi n. 19. tum *Bresl.* 1721.
M. *Febr.* 1723. p. 554. Certam denique
fidem facit *Mauriceau obs.* 329. Hic nu-
merus videtur ultimus terminus esse hu-
manae fecunditatis. Sexgemini dicti
Bresl. *Apr.* 1723. & septemgeminia *Carmo*
M m 5 consi-

in unam massam concreſcunt. Non ideo
verum

confidenter propoſiti l.c. tum a *Breſl.* 1718. *M. Jan. & Welschio*, & a *Biancho de generat.* p. 249. octimelli denique *Borelli* l.c. *Breſl.* 1723. p. 652. & farrago *SCHENKIANA* p. 589. ex conſiderata paucitate corporum luteorum, uteri rotunditate, & conſtantia in numero fetuum, quos bruta edunt, mihi ſuſpecti ſunt.

Cauſa vero gemellorum procul dubio eſt, quoties plus uno luteum corpus una maturum eſt, & rari ſunt, quia plerumque haec maturitas unico horum corporum contingit. Hinc in multiparis multa corpora lutea, ut in porcis, canibus, ovibus apud *Valiſnerium & Graafum* DCLXIX. not m. n.o. Non ergo neceſſe eſt recurrere ad plures uteri ſinus, ut *Hippocrates πεπεουſτος ανθρωπου* II, 44. neque ad ſemen his effuſum in uno coitu ut *Schurig* l.c. p. 195. A duobus ovis una reſorbtis recte *Hartſoeker ſuite des conject.* p. 129.

sss *Praeceptoris* ſententia omnino vera eſt : demonſtrant frequentia exempla gemellorum, quorum alter in utero materno periit, alter vitali partu editus eſt not. ppp. His enim neceſſe eſt, placentas proprias fuiſſe, ſeparatas, &, ſi eae quam maxime coaluerint, levem fuiſſe coalitum, neque vaſa communia fuiſſe utrique: manifeſtum enim eſt, mortui ſanguinem, ad vitalem fetum adlatum cito vitae finem fuiſſe fa-cturum miſero. Ita fetum aliquae unum abegerunt, alterum pepererunt *Ariſtoteles hiſt. anim.* L. VII. c. 4. Poſt ſanam filiam bi-duo fetus mortuus, ſeparatis ſecundis

verum est, quod vulgo recipitur, gemellis
unam

Lentil. in miscell. Post mortuum fetum vivus *Comm. Nor. 1732. hebd. 21.* Gemellorum unum dudum ante partum sodalis vitalis extinctum *Roussetus* habet *hystero-tomotok. S. VI. p. 149.* & per quatuor mentes *E. N. C. Dec. I. ann. 9. 10. obs. 162.* & similia exempla sunt apud *L. Bourgeois L. I. p. 190. Dionis l. c. p. 234. Chapmann c. 27. Zod. Gall. ann. I. p. 173. Mauriceau obs. 528. & Drake, & Manningham p. 27. & Schurig sylleps. p. 286.* in agno vero in *Hist. de l'Acad. 1703.* Trigeminorum denique duo lucem adspexerunt, tertius in tuba conputruit, & in ea post quindecim annos repertus est, *Hist. de l'Acad. 1722. obs. 3.* atque simile exemplum habet *Ill. Superville Ph, trans. n. 456.* Porro placentas geminorum, quae simplices videntur, duplices omnino esse, neque vasculis communicare *Ruyschius* auctor est *Thes. IX n. 21. & Graaf p. 293. & Mauriceau p. 225. 226. & Tauvry p. 109.* etiam experimento facto, aquam in unum funiculum injectam per alterum non exire, tum *Cel. Heister not. 36.* & demonstrant historiae, in quibus, cum una placenta esset, gemellorum tamen alter solus periit *E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 45. Mauriceau obs. 528.* Huc etiam refero trigeminos cum duabus placentis la *Motte obs. 297.* & tribus pene integre sejunctis *Saviard obs. 82.* Ita septo separatas placentas *Riva* pinxit in *iconn. anat. & in E. N. C. Dec. I. ann. I. obs. 39.* & futura *Collins p. 630.* & propria linea dividi
ubi.

unam placentam ^{ut} esse, duos funiculos. Sed duae verae placentae sunt. Singula vero placenta suum funiculum habet, neque unquam aliter visum est, licet veteres,

ubique plures fetus sunt *Whartonus* docet p. 238. & conjunctas sed vere duas refert *Stalpart Cent 1. obs. 75. Deventer ic. 5 p. 50. contiguas vero Edimb. Soc. IV. p. 180. MAURICEAU L. 11. n. 3. f. 3. Denique duplices gemellorum placentas lego apud MASSAM p. 43. b. in E. N. C. Dec. I. ann. 4. obs. 59. Dec. II. ann. 5. obs. 233. apud BLANCAARD anat. pract. n. 80. SIEGMUNDIN p. 320. MAURICEAU obs. 166. la MOTTE obs. 106. VIARDEL, CHAPMAN I c & case 18. BRESL. 1717. M Jul. COMM. NOR. 1732. hebdom. 21. Cl. SCHAAR-SCHMID Berl. nachr. 1. n. 17. & utrumque casum, hic & not. ttt propositum, obtrudere exemplis demonstrat Cl. BEHRENS E. N. C. Cent. IV. obs. 159 & ROUHAULT obs. p. 6. & RUYSCH adv. II. n. 10. Ter geminos denique distinctis placentis vidit MAURICEAU obs. 146. & RIVA, & in E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 45. ut non bene MAURICAEUS a separatis placentis ad superfetationem concluderet p. 225. 226.*

ttt Plerique veterum pro unica gemellorum placenta militant, ut HIPPOCRATES de superfetat. n. 7. Ea ratione se habere vidit COLLINS II. p. 630. SENNERT I. c. p. 296. DRELINCOURT de umbil. n. 17. E. N. C. vol. I. obs. 77. MAURICEAU

CEAU *obs.* 143 179. 259. 646. la MOTTE *obs.* 83 etc *Comm. Nor.* 1732. *hebd.* 37. inque cane BUCHNER *misc.* 1731. p. 10-13. etiam in trigeminis BESLER, DRELINCOURT l. c. BARTHOLINVS *anat.* p. 304. BRESL. 1721. M. Febr. la Motte *obs.* 298. Brendel E. N. C. Cent. III. *obs.* 65. Vieuss de uter. & plac. Saviard l. c. & quadrigeminis Scheuchzer *Misc. Berol. Cent.* II. Iple Ruyschius fateatur, duas aliquando gemellis placentas esse *adv.* II. n. 10. & Rouhaulti eadem observatio est l. c. idemque demonstrant observationes a Cl. Behrens collectae l. c. & Schurigii compilatio, hancque fabricam frequentem esse l. von Hoorne *wehmutter* p. 60. & perinde frequentem ut prior E. N. C. Cent. 3. ann 7. 8. *obs.* 45. frequentiore demum esse adfirmat Siegmundin p. 220. Chapman case 18. Drelincourt l. c. Ita etiam in brutis, chorion & allantois duabus ovibus communis dicta est Cl. Langley p. 164. & in vaccinis chorion & cotyledones Cheselden p. 281. Hinc, cum rarius duae placentae reperirentur, factum est, ut priores, & Needhamus negarent unquam duas reperiri c. 2. Neque dissimulari debet, aliquando vasa utriusque placentae per pollicem intricata fuisse, etiam Ruyschio fatente *adv.* II. n. 10. funiculos denique conjunctos in unum BRENDDEL E. N. C. Cent. III. *obs.* 65. & unicum funiculum BRESL. 1721 M. Oct. atque I. PER. NUVOLETTI apud VOGLI II p. 69. 70. & trilocularem unum funiculum pro trigeminis BRESL. 1724. p. 633. atque hoc ipsum argumentum contra ova urgeri a Cl. VOGLI. Qui

res, minus in minutiis curiosi, ita crediderint fieri. Et nunquam in eodem ovo ^{uuu} duo fetus visi sunt. MAURICAEI observatio-

Qui enim, inquit „ distincta in ovis totidem germina ponuntur, cum placentae geminorum, & trigeminorum minime distinctae sint? ll. p. 68. Verum adeo rara sunt exempla verae conjunctionis & unius funiculi, ut ad monstra referri queant, & conserventiam adeo familiarem partibus corporis humani absque medio se conjungentibus, ut omnino pro solita fabrica hominum recipere possimus „ distinctam cuique fetui placentam esse, sed rarius separatam, frequentius contiguam.

^{uuu} Exempla amnii unius utrique fetui communis adeo rara sunt, ut pro nullis haberi possint. Sollicite monent, qui unam placentam pro duobus fetibus viderunt, amnia tamen separata fuisse *Harvei ex. 58. Mauriceau p. 220. Deventer p. 50. Siegmundin p. 220. I. von Hoorne, Chapman case 18. Rouhault p. 6. Handley essays p. 62. Noortwyk p. 177. Manningham p. 6. in trigeminis Brendelius l. c. E. N. C. Cent. IV. obs. 165. & Riedlinus, & in vacca Cheselden p. 281. Aquae unius inter gemellos biduo ante partum eruperunt Mauriceau obs. 481. Et rarissimum esse monet uni caecum geminis amnii I. Siegmundin p. 57. 105. Exemplum tamen habet geminorum in eadem amnio Meryus l. c. & huc videtur referri debere ovum Backii, in quo duo rudes embryones reperti *alloq. p. 42, & forte trigeminorum duo*
apud*

vationes hic audiendae sunt , ditissimae, quia PARISIIS ^{xxx} stipendiis regijs feminis licet parere , ut non alibi chirurgi partus negotium accuratius teneant.

Calyci) Ova gallinacea saepe habent duos vitellos ; si vero duo ^{yyy} vitelli fuerint,

apud *Superville Phil. trans. n. 456. p. 303.* Biloculare amnion describitur *E. N. C. vol. 4. obs. 104.* *Halei* vero non unam , ut credit, sed duas fuisse amnios, earumque alteram hinc viro inposuisse pro allantoide, satis probabile reddidit *Cl. Noortwyck.* Rarum vero esse , ut gemelli in eadem amnio habitent, non mirum est. Ponit enim vel duos vermiculos in unum irrepisse ovum , vel ovum biloculare fuisse, quod conjicit *DIONIS des accouchem p. 130.* vel demum vita superstitie duo ova conflata in unum abiisse.

^{xxx} In nosodochio *l'hotel-dieu* feminae quindecim ante partum diebus admittuntur & ibi parere permittuntur Ibi optima schola obstetricum, quas per tres menses opere defungi permittitur *DIONIS p. 413.* tum Chirurgorum obstetriciorum *p. 446.*

^{yyy} Ova gemellis vitellis non rara sunt *ARISTOTELES hist. anim. L. VI. c. 3:* & habet exempla *Fabricius*, & *Harveius*, tum duobus vitellis, tum connatis *p. 73.* Porro lego in *E. N. C. Dec. I. ann. 2. obs. 241.* apud *Schurig sylleps. p. 189. &c.* Tres demum vitellos vidit *Malpighius de ov. inc. p. 2.* Manifestum est duo vera ova ex vitellario secessisse in hoc casu , & circumfusa esse albumine , & demum com.

rint, duo etiam colliquamenti ^{zzz} sacculi aderunt, & duo pulli, cum duabus utique placentis. Et, si unicus vitellus adfuerit, etiam pullus unicus est.

18. *Nauseae* &c.) A mutata circulatione sanguinis. Nam eadem phaenomena aliquan-

communi cortice obducta fuisse, ob loci angustiam &c. uti ova praegnantia *Valisnerius* explicavit.

^{zzz} Ex ovis gemino vitello nascuntur duo pulli HARVEI p. 41. MALP. *de ov. incub* p. 2. BRENDDEL *de embryone praeexist.* p. 27. habent enim duplicem numerum chalazarum, et sacculorum colliquamenti HARVEI l. c. FABER tamen ex gallina ova vitellis geminis frequenter pariente, simplices pullos edi vidit p. 772.

^{zzza} *Gemelli (aepe concreti)* Monstra concreta in pullis ovium valde frequentia sunt, ut apud VALISNERIUM & ALDROVANDUM videre est. Haec ergo monstra geminis vitellis tribuit ARISTOTELES *de gener.* L. IV. c. 4. & FABRICIUS *de form. fet.* c. 8. & HARVEIUS *exerc.* 24. p. 74 si unum albumen fuerit, & posset huc referri historia THRUSTONI, ubi femina, quae bis pepererat gemellos, tertio partu connatas filias edidit PHIL. TRANS. n. 65. Vide longum gemellum ovum monstro fetum bicipite, semiduplice BRESLAV. 1726. p. 717. Sed recte HALEUS, non videri in medio humore lubrico duos fetus connasci posse; & acute pariter I. C. SCALIGER, ova geminis vitellis monstra dare, quando vitelli confusi sunt, geminos, quando distincti

distincti *de subtil. exerc.* 288. Gemelli in
 eadem placenta contortis funiculis suffo-
 cati, minime vero connati fuerunt, in
 exemplo MERYANO. In eodem peri-
 cardio duo corda vide apud N. MASSAM
Isag. c. 28. & in *Memoir.* de DENIS
 p. 131. &c. Si vero utique evenerit, super-
 ficiales aliquas cohaesiones inde deduce-
 rem. Ita factum credo, ut gemelli ali-
 quando frontem fronte compresserint
 E. N. C. *Cent.* II. *obs.* 172. Hinc fronti-
 bus connatos puellus habet PAREUS
 L. 23. C. GEMMA p. 91. LICETVS,
 CARDANVS *de subtilit.* L. 12. aut dor-
 sis, PAREUS, aut verticibus,
 COMM. NOR. 1724. *bebd.* 41. Alii haec
 monstra coalescentibus ovis tribuunt, ut
 VALISN. c. 17. n. 5. MARCOT l. c.
 Et omnino ova quatuor in unum stipata,
 cum rudimento fetus MALPIGHIVS
 vidit *postb.* p. 88. T. XII. & duo ova con-
 nexa BLAS, *obs.* n. 4. L. V. & quinque
 in femina E. N. C. *Dec.* II. *ann.* 9. *obs.*
 224. Alii vermiculos connatos advocant,
 ut Cl. THUMMIG *versuch* n. 5. SUPER-
 VILLE l. c. *Clar.* BUREGRAV *vom*
erzeugen p. 50. aut conjunctos homun-
 ciones, ut PERRAULT *mecan. des anim.*
 p. 491. & olim DEMOCRITUS duabus
 feminis portionibus, cito se subsequen-
 tibus & coalitis, monstra tribuit, apud
 ARISTOTELEM *de gener.* L. IV. c. 4.
 Verum demonstravi, ni fallor, nimis
 fundas esse hujus coalitus radices, &
 in ipsis radicari primordiis animalis, neque
 casui tribui posse *de monstr.* *Diff.* I. & II.
 & video ILL. WOLFIVM consentien-
 tem, persuasum ex abundantibus non-
 nunquam animalium & plantarum parti-
 bus *Wirkungen der Natur* n. 448.

quando virginibus ^{bbbb} accidunt, unice ob suppressos mentes. Post tres enim septimanas, ovum jam uteri magnitudinem attingit, atque adeo sanguis primorum mensium impeditur, ne effluat. Verum eo tempore fetus vix pendet duas uncias, ergo eo tempore mulieres plus habent sanguinis in

bbbb Non eadem omnium causa est. Nausca carniū, veneris averſio PECHLIN *obs.* 45. L. I. horrores, vomitus, continuo & primo die MAURICEAU p. 129. DIONIS p. 147. sub initia laeviores NENTER *phys.* p. 340. a conceptu succedere solent, ante primam mensium periodum. Sed a mentibus quidem suppressis, & regurgitante ex utero semiputrido sanguine, picas ridiculas, & tensionem lumborum explico, quam distentis ligamentis adſcribit MAURICEAU p. 135. & DIONIS p. 152. Ab utero vero mechanice vaſa nervosque & ventriculum vicinos comprimente oriuntur stupores pedum, impotentia ambulandi, unius inprimis cruris, & oedemata, et femorum tumores DIONIS p. 159. 160. et varices MAURICEAU p. 144. *obs.* 159. venae tumentes in femore, ſignum nonnunquam uteri ſeti PANAKOLVS *Pentec.* V. *obs.* 46. et ecchymoses SALMUTH *Cent.* I. *obs.* 50 et urinae aut moleſta ſtimulatio, aut ſuppreſſio, DCLXXXV. et alvus ſicca, hinc haemorrhoides DIONIS p. 62. MAURIC. p. 147. et dolentiſſimae inflationes colicae, & anhelatio, a conpreſſo diaphragmate MAURIC. p. 147. et vomitus ſub finem graviditatis moleſti MAURICEAU p. 130. conf. la MOTTE *obs.* 47.

in utero, quam pro fetus necessitate. Hinc abortus fere tertio ^{cccc} mense fit, quando tertia vice menses erant redituri, & eo majus abortus periculum est, quo plus sanguinis femina per menses effundere confluxerit. Hinc nausea, anhelitus &c. ab hoc sanguine redeunte in sanguinem maternum. Adde, uterum extensum, & ex piriformi figura in sphaeram mutatum, & adiacentem, atque perfecto incremento, quod sursum fit, etiam deorsum auctum, varices facere, haemorrhoides, siccum alvum, urinam aegre fluentem. Necessarium enim est, vasa majora & viscera vicina comprimi. Inde mulieres, quibus ossa planiora sunt, & venae nudaе, maxime varicibus affliguntur, & inflationibus labiorum vulvae, & tumoribus crurum, femorum. Communis causa est in compressis venis, & sanguinis impedito circuitu: variant autem symptomata, prouti major aut minor femina est, quae huic compressioni exponitur, & felices sunt feminae, quibus pelvis amplissima est. Porro scybala in matre durissima adgeruntur in colo, ut saepe per totam vitam infarctus superlit.

Mammarum) Succus nutritius & sanguis ob contractum uterum sursum repercutitur.

Varices] Venae ipsis saepe pollice majores sunt, & rumpuntur ^{dddd}, eventu lethali, nisi provideatur feminae, facile tamen comprimi possunt. Sed etiam urinae stillidium a compressa vesica molestum est.

Lapsus)

^{cccc} DCLXXVIII. not. i.

^{dddd} Exempla venarum in gravidis sponte ruptarum excitavi ad DCLXVII. not. m.

Lapsus) Quia centrum gravitatis loco motum est, & in anteriora recessit. Hi lapsus periculum pro fetu habent.

19. *Foetus*) Pulcherrimum VESALII ^{ecce} experimentum est, quod constanter verum esse repertum est nuperioribus periculis. Aperitur canis femina, sub ultima gestationis tempora, brevi ante partum, quiescunt haecenus catuli. Quamprimum vero mater penitus mortua est, omnes continuo incipiunt moveri, etsi nihil inter se habeant commune: causa vero est in commercio cum matre sublato. Ita in sue, si amnion unius fetus secueris, quiescet ille, dum reliqui pergunt moveri, donec eorum etiam discindas membranas.

20. *Hora*) Experimentum Parisiis factum est, & ratio est, quod ope patuli haecenus ovalis foraminis duplicem circulationem sustinere possit: vivit adeo, non tamen cum eadem facilitate ^{ffff}.

dddd* *Pica, in textu*) Desiderium ciborum absurdorum, intensissimum. Piperis libram gravida devorat BUCHNER *misc.* 1727. p. 554. Pica linteorum ZOD. GALL. I. p. 107. stercoris E. N. C. Dec. II. ann. V. *obs.* 20. BORELL. *Cent.* III. *obs.* 2. calcis SALMUTH. *Cent.* II. *obs.* 62. corii ID. n. 63. PANAROL. *Pentec.* III. *obs.* 38. Cont. varias historias E. N. C. Dec. II. ann. 9. *obs.* 201. ann. 8. *obs.* 284. BRESL. 1719 M. Maj. et amplissimam compilationem apud SCHURIGIUM in *chylologia*.

eeee DCLXXXII.

ffff DCLXXVIII. not. h. DCXCI.
not k

F I N I S.

